

MORTS MATERNELLES EN FRANCE : LES DONNÉES CLÉS DE L'ENQUÊTE 2013-2015


6^e rapport de l'Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) 2013-2015.

En ligne sur : www.santepubliquefrance.fr / www.epopé-inserm.fr




Le risque de décès est plus élevé pour :

Les femmes
PLUS ÂGÉES



Les femmes
MIGRANTES

RISQUE x 2,8
pour les femmes originaires de certains pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud



Les femmes résidant dans les **DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM)**

RISQUE x 4
par rapport aux femmes de métropole




Les femmes
OBÈSES

RISQUE x 2
par rapport aux femmes de moindre corpulence



Les maladies cardiovasculaires et les suicides sont les causes les plus fréquentes, mais aussi parmi les plus évitables

Principales causes des décès maternels
(de la conception jusqu'à 1 an après l'accouchement)



Pour mieux prévenir les décès par maladies cardiovasculaires

Pendant la grossesse, certains symptômes (difficultés respiratoires, douleurs intenses dans la poitrine ou dans le dos) peuvent être le signe de maladies cardiaques, et doivent être signalés à un médecin ou une sage-femme.



Pour mieux prévenir le suicide



Durant l'année qui suit un accouchement, les femmes sont à risque de dépression. Il ne faut pas hésiter à en parler et consulter.