

Tableau 5 : Pourcentage de cancer de stade TNM inconnu par département pour la période du 14 avril au 31 décembre 2015, pour 97 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal

Départements	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
01 - Ain	44	17	38,6
02 - Aisne	55	7	12,7
03 - Allier	16	7	43,8
04 - Alpes-de-Haute-Provence	8	5	62,5
05 - Hautes-Alpes	3	2	66,7
06 - Alpes-Maritimes	34	24	70,6
07 - Ardèche	ND	ND	ND
08 - Ardennes	28	3	10,7
09 - Ariège	10	7	70
10 - Aube	33	6	18,2
11 - Aude	25	7	28
12 - Aveyron	28	21	75
13 - Bouches-du-Rhône	83	38	45,8
14 - Calvados	10	0	0
15 - Cantal	12	0	0
16 - Charente	12	10	83,3
17 - Charente-Maritime	40	21	52,5
18 - Cher	20	19	95
19 - Corrèze	42	4	9,5
20 - Corse	3	3	100
21 - Côte-d'Or	24	2	8,3
22 - Côtes-d'Armor	47	12	25,5
23 - Creuse	9	2	22,2
24 - Dordogne	19	14	73,7
25 - Doubs	45	14	31,1
26 - Drôme	ND	ND	ND
27 - Eure	53	27	50,9
28 - Eure-et-Loir	20	17	85
29 - Finistère	24	5	20,8
30 - Gard	33	32	97
31 - Haute-Garonne	90	57	63,3
32 - Gers	13	2	15,4
33 - Gironde	103	7	6,8
34 - Hérault	45	36	80
35 - Ille-et-Vilaine	126	52	41,3
36 - Indre	27	0	0
37 - Indre-et-Loire	58	42	72,4
38 - Isère	102	6	5,9
39 - Jura	25	5	20
40 - Landes	14	12	85,7
41 - Loir-et-Cher	29	10	34,5
42 - Loire	79	4	5,1
43 - Haute-Loire	18	1	5,6
44 - Loire-Atlantique	67	53	79,1

Départements	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
45 - Loiret	43	8	18,6
46 - Lot	14	0	0
47 - Lot-et-Garonne	31	0	0
48 - Lozère	2	2	100
49 - Maine-et-Loire	79	4	5,1
50 - Manche	29	1	3,4
51 - Marne	38	13	34,2
52 - Haute-Marne	18	10	55,6
53 - Mayenne	19	10	52,6
54 - Meurthe-et-Moselle	77	4	5,2
55 - Meuse	13	4	30,8
56 - Morbihan	73	36	49,3
57 - Moselle	94	67	71,3
58 - Nièvre	8	6	75
59 - Nord	190	10	5,3
60 - Oise	35	5	14,3
61 - Orne	18	6	33,3
62 - Pas-de-Calais	108	10	9,3
63 - Puy-de-Dôme	42	3	7,1
64 - Pyrénées-Atlantiques	28	26	92,9
65 - Hautes-Pyrénées	15	9	60
66 - Pyrénées-Orientales	39	38	97,4
67 - Bas-Rhin	87	0	0
68 - Haut-Rhin	73	0	0
69 - Rhône	108	4	3,7
70 - Haute-Saône	24	4	16,7
71 - Saône-et-Loire	80	80	100
72 - Sarthe	68	4	5,9
73 - Savoie	20	11	55
74 - Haute-Savoie	18	9	50
75 - Paris	42	40	95,2
76 - Seine-Maritime	66	63	95,5
77 - Seine-et-Marne	111	5	4,5
78 - Yvelines	63	32	50,8
79 - Deux-Sèvres	42	27	64,3
80 - Somme	55	12	21,8
81 - Tarn	32	4	12,5
82 - Tarn-et-Garonne	23	11	47,8
83 - Var	67	49	73,1
84 - Vaucluse	22	14	63,6
85 - Vendée	41	23	56,1
86 - Vienne	18	10	55,6
87 - Haute-Vienne	47	14	29,8
88 - Vosges	43	5	11,6
89 - Yonne	35	30	85,7
90 - Territoire de Belfort	10	4	40
91 - Essonne	31	3	9,7

Départements	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
92 - Hauts-de-Seine	36	0	0
93 - Seine-Saint-Denis	53	19	35,8
94 - Val-de-Marne	54	18	33,3
95 - Val-d'Oise	51	16	31,4
971 - Guadeloupe	7	5	71,4
972 - Martinique	9	0	0
973 - Guyane	0	0	0
974 - La Réunion	12	5	41,7

\* à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire

ND: non disponible