

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/1

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Tableau 2 : Indicateurs de suivi du programme pour la période 2015[#]

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 10 | 8 | 12 | 8 | 13 | 7 | 10 |
| | 55-59 ans | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 7 |
| | 60-64 ans | 8 | 9 | 7 | 12 | 8 | 9 | 6 |
| | 65-69 ans | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| | 70-74 ans | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| | 50-74 ans | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 4 (2-6) | 4 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-6) |
| | 55-59 ans | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 4 (2-7) | 6 (3-7) | 3 (2-6) | 3 (2-6) |
| | 60-64 ans | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 5 (2-8) | 5 (3-6) | 3 (2-6) | 3 (2-6) |
| | 65-69 ans | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-7) | 3 (2-6) | 3 (2-6) |
| | 70-74 ans | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-7) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-6) |
| | 50-74 ans | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 4 (2-7) | 4 (2-6) | 3 (2-6) | 3 (2-6) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 114 | 113 | 116 | 112 | 123 | 113 | 106 |
| | 55-59 ans | 100 | 99 | 101 | 92 | 149 | 101 | 94 |
| | 60-64 ans | 94 | 93 | 95 | 92 | 88 | 94 | 96 |
| | 65-69 ans | 96 | 96 | 96 | 109 | 97 | 94 | 96 |
| | 70-74 ans | 99 | 100 | 97 | 110 | 94 | 99 | 98 |
| | 50-74 ans | 99 | 99 | 100 | 105 | 113 | 97 | 97 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 87 (59-134) | 87 (60-132) | 83 (56-142) | 79 (60-122) | 93 (60-155) | 95 (60-135) | 78 (55-116) |
| | 55-59 ans | 81 (61-115) | 82 (60-112) | 81 (62-123) | 79 (54.5-111) | 129.5 (74-200) | 82.5 (61-113) | 78 (57-107) |
| | 60-64 ans | 79 (57-106) | 80 (59-109) | 76.5 (55-105.5) | 80.5 (56-103) | 75 (50-103.5) | 80 (60-109) | 77.5 (56.5-105.5) |
| | 65-69 ans | 78 (57-112) | 80 (57-112) | 78 (57-109) | 83 (61-132) | 90 (57-118) | 79 (56-110.5) | 77 (57-106.5) |
| | 70-74 ans | 83 (58-112) | 82 (57-117) | 83.5 (58-108) | 93.5 (63-117) | 92 (58-108) | 80.5 (56.5-115.5) | 83 (58-108) |
| | 50-74 ans | 81 (58-113) | 81 (59-113) | 80.5 (58-113) | 81 (61-117) | 90.5 (61-138) | 81 (58-113) | 79 (57-107.5) |

[#] Période du 14 avril au 31 décembre 2015

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Abbréviations : Q1 - 1^{er} quartile / Q3 - 3^{ème} quartile