

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 4 671 | 2 243 | 2 428 | 1 364 | 1 421 | 879 | 1 007 |
| | 55-59 ans | 4 471 | 1 994 | 2 477 | 353 | 386 | 1 641 | 2 091 |
| | 60-64 ans | 5 053 | 2 294 | 2 759 | 327 | 321 | 1 967 | 2 438 |
| | 65-69 ans | 5 249 | 2 407 | 2 842 | 270 | 271 | 2 137 | 2 571 |
| | 70-74 ans | 3 201 | 1 477 | 1 724 | 126 | 132 | 1 351 | 1 592 |
| | 50-74 ans | 22 645 | 10 415 | 12 230 | 2 440 | 2 531 | 7 975 | 9 699 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 201 | 98 | 103 | 63 | 64 | 35 | 39 |
| | 55-59 ans | 204 | 87 | 117 | 13 | 16 | 74 | 101 |
| | 60-64 ans | 226 | 101 | 125 | 13 | 16 | 88 | 109 |
| | 65-69 ans | 246 | 115 | 131 | 7 | 13 | 108 | 118 |
| | 70-74 ans | 214 | 85 | 129 | 9 | 9 | 76 | 120 |
| | 50-74 ans | 1 091 | 486 | 605 | 105 | 118 | 381 | 487 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 153 | 83 | 70 | 53 | 45 | 30 | 25 |
| | 55-59 ans | 164 | 72 | 92 | 6 | 13 | 66 | 79 |
| | 60-64 ans | 187 | 84 | 103 | 9 | 11 | 75 | 92 |
| | 65-69 ans | 208 | 93 | 115 | 3 | 10 | 90 | 105 |
| | 70-74 ans | 153 | 60 | 93 | 4 | 5 | 56 | 88 |
| | 50-74 ans | 865 | 392 | 473 | 75 | 84 | 317 | 389 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 48 | 15 | 33 | 10 | 19 | 5 | 14 |
| | 55-59 ans | 40 | 15 | 25 | 7 | 3 | 8 | 22 |
| | 60-64 ans | 39 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| | 65-69 ans | 38 | 22 | 16 | 4 | 3 | 18 | 13 |
| | 70-74 ans | 61 | 25 | 36 | 5 | 4 | 20 | 32 |
| | 50-74 ans | 226 | 94 | 132 | 30 | 34 | 64 | 98 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 4 623 | 2 228 | 2 395 | 1 354 | 1 402 | 874 | 993 |
| | 55-59 ans | 4 431 | 1 979 | 2 452 | 346 | 383 | 1 633 | 2 069 |
| | 60-64 ans | 5 014 | 2 277 | 2 737 | 323 | 316 | 1 954 | 2 421 |
| | 65-69 ans | 5 211 | 2 385 | 2 826 | 266 | 268 | 2 119 | 2 558 |
| | 70-74 ans | 3 140 | 1 452 | 1 688 | 121 | 128 | 1 331 | 1 560 |
| | 50-74 ans | 22 419 | 10 321 | 12 098 | 2 410 | 2 497 | 7 911 | 9 601 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 176 | 93 | 83 | 61 | 48 | 32 | 35 |
| | 55-59 ans | 204 | 116 | 88 | 29 | 18 | 87 | 70 |
| | 60-64 ans | 238 | 138 | 100 | 35 | 14 | 103 | 86 |
| | 65-69 ans | 282 | 168 | 114 | 21 | 15 | 147 | 99 |
| | 70-74 ans | 198 | 113 | 85 | 15 | 7 | 98 | 78 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 1 098 | 628 | 470 | 161 | 102 | 467 | 368 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 175 | 93 | 82 | 61 | 47 | 32 | 35 |
| | 55-59 ans | 201 | 114 | 87 | 29 | 17 | 85 | 70 |
| | 60-64 ans | 235 | 135 | 100 | 35 | 14 | 100 | 86 |
| | 65-69 ans | 277 | 164 | 113 | 19 | 15 | 145 | 98 |
| | 70-74 ans | 193 | 109 | 84 | 14 | 7 | 95 | 77 |
| | 50-74 ans | 1 081 | 615 | 466 | 158 | 100 | 457 | 366 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 160 | 86 | 74 | 56 | 41 | 30 | 33 |
| | 55-59 ans | 180 | 103 | 77 | 25 | 16 | 78 | 61 |
| | 60-64 ans | 218 | 127 | 91 | 33 | 12 | 94 | 79 |
| | 65-69 ans | 256 | 153 | 103 | 18 | 14 | 135 | 89 |
| | 70-74 ans | 167 | 97 | 70 | 11 | 5 | 86 | 65 |
| | 50-74 ans | 981 | 566 | 415 | 143 | 88 | 423 | 327 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 150 | 79 | 71 | 52 | 40 | 27 | 31 |
| | 55-59 ans | 166 | 94 | 72 | 23 | 14 | 71 | 58 |
| | 60-64 ans | 210 | 122 | 88 | 29 | 12 | 93 | 76 |
| | 65-69 ans | 244 | 147 | 97 | 17 | 12 | 130 | 85 |
| | 70-74 ans | 163 | 96 | 67 | 11 | 4 | 85 | 63 |
| | 50-74 ans | 933 | 538 | 395 | 132 | 82 | 406 | 313 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 158 | 85 | 73 | 55 | 41 | 30 | 32 |
| | 55-59 ans | 175 | 100 | 75 | 25 | 16 | 75 | 59 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| 60-64 ans | 215 | 126 | 89 | 33 | 12 | 93 | 77 | |
| 65-69 ans | 251 | 151 | 100 | 18 | 13 | 133 | 87 | |
| 70-74 ans | 164 | 96 | 68 | 11 | 5 | 85 | 63 | |
| 50-74 ans | 963 | 558 | 405 | 142 | 87 | 416 | 318 | |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 50-74 ans | 18 | 8 | 10 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 50-74 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 160 | 86 | 74 | 56 | 41 | 30 | 33 | |
| 55-59 ans | 178 | 102 | 76 | 24 | 16 | 78 | 60 | |
| 60-64 ans | 218 | 127 | 91 | 33 | 12 | 94 | 79 | |
| 65-69 ans | 256 | 153 | 103 | 18 | 14 | 135 | 89 | |
| 70-74 ans | 167 | 97 | 70 | 11 | 5 | 86 | 65 | |
| 50-74 ans | 979 | 565 | 414 | 142 | 88 | 423 | 326 | |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 161 | 86 | 75 | 56 | 41 | 30 | 34 | |
| 55-59 ans | 181 | 104 | 77 | 25 | 16 | 79 | 61 | |
| 60-64 ans | 220 | 128 | 92 | 33 | 13 | 95 | 79 | |
| 65-69 ans | 257 | 154 | 103 | 18 | 14 | 136 | 89 | |
| 70-74 ans | 171 | 99 | 72 | 11 | 5 | 88 | 67 | |
| 50-74 ans | 990 | 571 | 419 | 143 | 89 | 428 | 330 | |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 77 | 34 | 43 | 27 | 27 | 7 | 16 | |
| 55-59 ans | 75 | 35 | 40 | 4 | 9 | 31 | 31 | |
| 60-64 ans | 68 | 34 | 34 | 5 | 6 | 29 | 28 | |
| 65-69 ans | 90 | 50 | 40 | 5 | 7 | 45 | 33 | |
| 70-74 ans | 62 | 29 | 33 | 4 | 3 | 25 | 30 | |
| 50-74 ans | 372 | 182 | 190 | 45 | 52 | 137 | 138 | |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| | 60-64 ans | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 39 | 24 | 15 | 11 | 2 | 13 | 13 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 22 | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| | 55-59 ans | 24 | 17 | 7 | 3 | 3 | 14 | 4 |
| | 60-64 ans | 23 | 11 | 12 | 2 | 2 | 9 | 10 |
| | 65-69 ans | 42 | 27 | 15 | 5 | 3 | 22 | 12 |
| | 70-74 ans | 29 | 19 | 10 | 3 | 0 | 16 | 10 |
| | 50-74 ans | 140 | 90 | 50 | 19 | 12 | 71 | 38 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 40 | 28 | 12 | 18 | 4 | 10 | 8 |
| | 55-59 ans | 52 | 34 | 18 | 11 | 3 | 23 | 15 |
| | 60-64 ans | 87 | 54 | 33 | 13 | 4 | 41 | 29 |
| | 65-69 ans | 84 | 52 | 32 | 5 | 2 | 47 | 30 |
| | 70-74 ans | 57 | 37 | 20 | 2 | 1 | 35 | 19 |
| | 50-74 ans | 320 | 205 | 115 | 49 | 14 | 156 | 101 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| | 60-64 ans | 21 | 15 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 |
| | 65-69 ans | 22 | 13 | 9 | 2 | 1 | 11 | 8 |
| | 70-74 ans | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| | 50-74 ans | 82 | 53 | 29 | 15 | 7 | 38 | 22 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 50-74 ans | 23 | 12 | 11 | 3 | 0 | 9 | 11 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 62 | 44 | 18 | 24 | 8 | 20 | 10 |
| | 55-59 ans | 76 | 51 | 25 | 14 | 6 | 37 | 19 |
| | 60-64 ans | 110 | 65 | 45 | 15 | 6 | 50 | 39 |
| | 65-69 ans | 126 | 79 | 47 | 10 | 5 | 69 | 42 |
| | 70-74 ans | 86 | 56 | 30 | 5 | 1 | 51 | 29 |
| | 50-74 ans | 460 | 295 | 165 | 68 | 26 | 227 | 139 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 40 | 28 | 12 | 18 | 4 | 10 | 8 |
| | 55-59 ans | 52 | 34 | 18 | 11 | 3 | 23 | 15 |
| | 60-64 ans | 87 | 54 | 33 | 13 | 4 | 41 | 29 |
| | 65-69 ans | 84 | 52 | 32 | 5 | 2 | 47 | 30 |
| | 70-74 ans | 57 | 37 | 20 | 2 | 1 | 35 | 19 |
| | 50-74 ans | 320 | 205 | 115 | 49 | 14 | 156 | 101 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 31 | 22 | 9 | 14 | 4 | 8 | 5 |
| | 55-59 ans | 45 | 30 | 15 | 9 | 3 | 21 | 12 |
| | 60-64 ans | 79 | 47 | 32 | 12 | 4 | 35 | 28 |
| | 65-69 ans | 76 | 47 | 29 | 5 | 2 | 42 | 27 |
| | 70-74 ans | 53 | 33 | 20 | 2 | 1 | 31 | 19 |
| | 50-74 ans | 284 | 179 | 105 | 42 | 14 | 137 | 91 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 40 | 28 | 12 | 17 | 4 | 11 | 8 |
| | 55-59 ans | 48 | 32 | 16 | 11 | 4 | 21 | 12 |
| | 60-64 ans | 84 | 50 | 34 | 14 | 4 | 36 | 30 |
| | 65-69 ans | 85 | 55 | 30 | 5 | 2 | 50 | 28 |
| | 70-74 ans | 64 | 43 | 21 | 4 | 1 | 39 | 20 |
| | 50-74 ans | 321 | 208 | 113 | 51 | 15 | 157 | 98 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| | 60-64 ans | 21 | 15 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 |
| | 65-69 ans | 22 | 13 | 9 | 2 | 1 | 11 | 8 |
| | 70-74 ans | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| | 50-74 ans | 82 | 53 | 29 | 15 | 7 | 38 | 22 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| | 60-64 ans | 20 | 14 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| | 65-69 ans | 19 | 12 | 7 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| | 70-74 ans | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| | 50-74 ans | 77 | 51 | 26 | 15 | 6 | 36 | 20 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 60-64 ans | 20 | 14 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| | 65-69 ans | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| | 70-74 ans | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| | 50-74 ans | 73 | 48 | 25 | 15 | 6 | 33 | 19 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | 55-59 ans | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| | 60-64 ans | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 46 | 30 | 16 | 10 | 2 | 20 | 14 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| | 50-74 ans | 27 | 18 | 9 | 5 | 4 | 13 | 5 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 28 | 19 | 9 | 6 | 0 | 13 | 9 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| | 60-64 ans | 20 | 14 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| | 65-69 ans | 19 | 12 | 7 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| | 70-74 ans | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| | 50-74 ans | 75 | 50 | 25 | 14 | 6 | 36 | 19 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 16 | 11 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4 | 3,9 |
| | 55-59 ans | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,8 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| | 65-69 ans | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 2,6 | 4,8 | 5,1 | 4,6 |
| | 70-74 ans | 6,7 | 5,8 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 5,6 | 7,5 |
| | 50-74 ans | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 5 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 1,4 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 0,8 | 1 | 2 | 0,8 | 0,5 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 4 | 3 | 1,5 | 2 |
| | 50-74 ans | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 76,1 | 84,7 | 68 | 84,1 | 70,3 | 85,7 | 64,1 |
| | 55-59 ans | 80,4 | 82,8 | 78,6 | 46,2 | 81,3 | 89,2 | 78,2 |
| | 60-64 ans | 82,7 | 83,2 | 82,4 | 69,2 | 68,8 | 85,2 | 84,4 |
| | 65-69 ans | 84,6 | 80,9 | 87,8 | 42,9 | 76,9 | 83,3 | 89 |
| | 70-74 ans | 71,5 | 70,6 | 72,1 | 44,4 | 55,6 | 73,7 | 73,3 |
| | 50-74 ans | 79,3 | 80,7 | 78,2 | 71,4 | 71,2 | 83,2 | 79,9 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 3,7 | 3,5 |
| | 55-59 ans | 4,6 | 5,9 | 3,6 | 8,4 | 4,7 | 5,3 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 4,7 | 6,1 | 3,7 | 10,8 | 4,4 | 5,3 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 5,4 | 7 | 4 | 7,9 | 5,6 | 6,9 | 3,9 |
| | 70-74 ans | 6,3 | 7,8 | 5 | 12,4 | 5,5 | 7,4 | 5 |
| | 50-74 ans | 4,9 | 6,1 | 3,9 | 6,7 | 4,1 | 5,9 | 3,8 |
| | 50-74 ans ** | 4,8 | 5,9 | 3,9 | - | - | - | - |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,4 | 100 | 98,8 | 100 | 97,9 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 98,5 | 98,3 | 98,9 | 100 | 94,4 | 97,7 | 100 |
| | 60-64 ans | 98,7 | 97,8 | 100 | 100 | 100 | 97,1 | 100 |
| | 65-69 ans | 98,2 | 97,6 | 99,1 | 90,5 | 100 | 98,6 | 99 |
| | 70-74 ans | 97,5 | 96,5 | 98,8 | 93,3 | 100 | 96,9 | 98,7 |
| | 50-74 ans | 98,5 | 97,9 | 99,1 | 98,1 | 98 | 97,9 | 99,5 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 91,4 | 92,5 | 90,2 | 91,8 | 87,2 | 93,8 | 94,3 |
| | 55-59 ans | 89,6 | 90,4 | 88,5 | 86,2 | 94,1 | 91,8 | 87,1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 92,8 | 94,1 | 91 | 94,3 | 85,7 | 94 | 91,9 |
| | 65-69 ans | 92,4 | 93,3 | 91,2 | 94,7 | 93,3 | 93,1 | 90,8 |
| | 70-74 ans | 86,5 | 89 | 83,3 | 78,6 | 71,4 | 90,5 | 84,4 |
| | 50-74 ans | 90,7 | 92 | 89,1 | 90,5 | 88 | 92,6 | 89,3 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 93,8 | 91,9 | 95,9 | 92,9 | 97,6 | 90 | 93,9 |
| | 55-59 ans | 92,2 | 91,3 | 93,5 | 92 | 87,5 | 91 | 95,1 |
| | 60-64 ans | 96,3 | 96,1 | 96,7 | 87,9 | 100 | 98,9 | 96,2 |
| | 65-69 ans | 95,3 | 96,1 | 94,2 | 94,4 | 85,7 | 96,3 | 95,5 |
| | 70-74 ans | 97,6 | 99 | 95,7 | 100 | 80 | 98,8 | 96,9 |
| | 50-74 ans | 95,1 | 95,1 | 95,2 | 92,3 | 93,2 | 96 | 95,7 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | 50-74 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-4) |
| | 55-59 ans | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 3 (2-5) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 2 (2-4) | 2 (2-5) |
| | 60-64 ans | 2 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 3 (2-5) | 3 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-5) |
| | 65-69 ans | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 3 (2-6) | 3 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-5) |
| | 70-74 ans | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 2 (2-3) | 3 (2-6) | 2 (2-4) | 2 (2-4) |
| | 50-74 ans | 2 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-5) | 3 (2-5) | 3 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-4) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 92 | 95 | 89 | 101 | 92 | 85 | 85 |
| | 55-59 ans | 85 | 88 | 82 | 95 | 95 | 85 | 79 |
| | 60-64 ans | 80 | 83 | 77 | 83 | 92 | 84 | 74 |
| | 65-69 ans | 82 | 88 | 72 | 93 | 97 | 88 | 68 |
| | 70-74 ans | 79 | 79 | 80 | 59 | 69 | 82 | 81 |
| | 50-74 ans | 83 | 87 | 79 | 91 | 92 | 85 | 76 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 71 (52,5-107,5) | 67,5 (54-121) | 76 (51-97) | 69 (57-128,5) | 84 (56-95) | 60 (49-84) | 60 (45-100) |
| | 55-59 ans | 69,5 (51,5-103,5) | 70 (56-108) | 66 (48-99) | 85 (67-100) | 75,5 (57-119) | 68,5 (53-115) | 62 (48-98) |
| | 60-64 ans | 68 (51-94) | 68 (56-94) | 63 (46-96) | 76 (62-91) | 84 (60,5-106) | 68 (55-105) | 61 (46-94) |
| | 65-69 ans | 65 (47-97) | 72 (49-102) | 56 (42-92) | 79 (73-102) | 59 (51-92) | 68 (48-102) | 56 (42-89) |
| | 70-74 ans | 63 (47-90) | 63 (48-89) | 64 (46-92) | 56 (46-72) | 63 (34-77) | 63,5 (48-94) | 64 (46-92) |
| | 50-74 ans | 68 (49-98) | 68 (52-101) | 64 (47-96) | 76 (57-102) | 77 (55-96,5) | 67 (50-101) | 62 (46-96) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 1,7 | 3,2 | 0 | 3,3 | 0 | 3,1 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| 55-59 ans | 3,4 | 5,2 | 1,1 | 6,9 | 0 | 4,6 | 1,4 |
| 60-64 ans | 0,8 | 0,7 | 1 | 0 | 7,1 | 1 | 0 |
| 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-74 ans | 2 | 0,9 | 3,5 | 0 | 28,6 | 1 | 1,3 |
| 50-74 ans | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 2,9 | 1,5 | 0,5 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | | | | | | | |
| 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55-59 ans | 98,9 | 99 | 98,7 | 96 | 100 | 100 | 98,4 |
| 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50-74 ans | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,3 | 100 | 100 | 99,7 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | |
| 50-54 ans | 47,8 | 39,5 | 57,3 | 48,2 | 65,9 | 23,3 | 47,1 |
| 55-59 ans | 41,4 | 33,7 | 51,9 | 16 | 56,3 | 39,2 | 50,8 |
| 60-64 ans | 30,9 | 26,6 | 37 | 15,2 | 46,2 | 30,5 | 35,4 |
| 65-69 ans | 35 | 32,5 | 38,8 | 27,8 | 50 | 33,1 | 37,1 |
| 70-74 ans | 36,3 | 29,3 | 45,8 | 36,4 | 60 | 28,4 | 44,8 |
| 50-74 ans | 37,6 | 31,9 | 45,3 | 31,5 | 58,4 | 32 | 41,8 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | | | | | | | |
| 50-54 ans | 3,7 | 3,5 | 4 | 5,4 | 2,4 | 0 | 5,9 |
| 55-59 ans | 4,4 | 3,8 | 5,2 | 8 | 0 | 2,5 | 6,6 |
| 60-64 ans | 4,5 | 6,3 | 2,2 | 12,1 | 0 | 4,2 | 2,5 |
| 65-69 ans | 4,7 | 5,2 | 3,9 | 5,6 | 7,1 | 5,1 | 3,4 |
| 70-74 ans | 1,8 | 1 | 2,8 | 9,1 | 0 | 0 | 3 |
| 50-74 ans | 3,9 | 4,2 | 3,6 | 7,7 | 2,2 | 3 | 3,9 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | |
| 50-54 ans | 13,7 | 18,6 | 8 | 10,7 | 9,8 | 33,3 | 5,9 |
| 55-59 ans | 13,3 | 16,3 | 9,1 | 12 | 18,8 | 17,7 | 6,6 |
| 60-64 ans | 10,5 | 8,6 | 13 | 6,1 | 15,4 | 9,5 | 12,7 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 16,3 | 17,5 | 14,6 | 27,8 | 21,4 | 16,2 | 13,5 |
| | 70-74 ans | 17 | 19,2 | 13,9 | 27,3 | 0 | 18,2 | 14,9 |
| | 50-74 ans | 14,1 | 15,8 | 11,9 | 13,3 | 13,5 | 16,6 | 11,5 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 24,8 | 32,6 | 16 | 32,1 | 9,8 | 33,3 | 23,5 |
| | 55-59 ans | 28,7 | 32,7 | 23,4 | 44 | 18,8 | 29,1 | 24,6 |
| | 60-64 ans | 39,5 | 42,2 | 35,9 | 39,4 | 30,8 | 43,2 | 36,7 |
| | 65-69 ans | 32,7 | 33,8 | 31,1 | 27,8 | 14,3 | 34,6 | 33,7 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 37,4 | 27,8 | 18,2 | 20 | 39,8 | 28,4 |
| | 50-74 ans | 32,3 | 35,9 | 27,4 | 34,3 | 15,7 | 36,4 | 30,6 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 6,8 | 4,7 | 9,3 | 1,8 | 7,3 | 10 | 11,8 |
| | 55-59 ans | 8,3 | 10,6 | 5,2 | 16 | 6,3 | 8,9 | 4,9 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 11,7 | 6,5 | 21,2 | 7,7 | 8,4 | 6,3 |
| | 65-69 ans | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 11,1 | 7,1 | 8,1 | 9 |
| | 70-74 ans | 7,6 | 10,1 | 4,2 | 9,1 | 20 | 10,2 | 3 |
| | 50-74 ans | 8,3 | 9,3 | 6,9 | 10,5 | 7,9 | 8,9 | 6,7 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,9 | 1,2 | 2,7 | 1,8 | 0 | 0 | 5,9 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 0 | 0 | 2,5 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 2,7 | 3,1 | 2,2 | 6,1 | 0 | 2,1 | 2,5 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 |
| | 70-74 ans | 2,9 | 2 | 4,2 | 0 | 0 | 2,3 | 4,5 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 0 | 2,1 | 3,3 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1 | 1,3 | 4 | 0 | 0 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 0,6 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0 | 0,6 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 13,4 | 19,7 | 7,5 | 17,7 | 5,7 | 22,9 | 10,1 |
| | 55-59 ans | 17,2 | 25,8 | 10,2 | 40,5 | 15,7 | 22,7 | 9,2 |
| | 60-64 ans | 21,9 | 28,5 | 16,4 | 46,4 | 19 | 25,6 | 16,1 |
| | 65-69 ans | 24,2 | 33,1 | 16,6 | 37,6 | 18,7 | 32,6 | 16,4 |
| | 70-74 ans | 27,4 | 38,6 | 17,8 | 41,3 | 7,8 | 38,3 | 18,6 |
| | 50-74 ans | 20,5 | 28,6 | 13,6 | 28,2 | 10,4 | 28,7 | 14,5 |
| | 50-74 ans ** | 20 | 27,7 | 13 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 8,7 | 12,6 | 5 | 13,3 | 2,9 | 11,4 | 8,1 |
| | 55-59 ans | 11,7 | 17,2 | 7,3 | 31,8 | 7,8 | 14,1 | 7,2 |
| | 60-64 ans | 17,4 | 23,7 | 12,1 | 40,2 | 12,7 | 21 | 12 |
| | 65-69 ans | 16,1 | 21,8 | 11,3 | 18,8 | 7,5 | 22,2 | 11,7 |
| | 70-74 ans | 18,2 | 25,5 | 11,8 | 16,5 | 7,8 | 26,3 | 12,2 |
| | 50-74 ans | 14,3 | 19,9 | 9,5 | 20,3 | 5,6 | 19,7 | 10,5 |
| | 50-74 ans ** | 13,9 | 19,2 | 9,1 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 6,7 | 9,9 | 3,8 | 10,3 | 2,9 | 9,2 | 5 |
| | 55-59 ans | 10,2 | 15,2 | 6,1 | 26 | 7,8 | 12,9 | 5,8 |
| | 60-64 ans | 15,8 | 20,6 | 11,7 | 37,2 | 12,7 | 17,9 | 11,6 |
| | 65-69 ans | 14,6 | 19,7 | 10,3 | 18,8 | 7,5 | 19,8 | 10,6 |
| | 70-74 ans | 16,9 | 22,7 | 11,8 | 16,5 | 7,8 | 23,3 | 12,2 |
| | 50-74 ans | 12,7 | 17,3 | 8,7 | 17,4 | 5,6 | 17,3 | 9,5 |
| | 50-74 ans ** | 12,3 | 16,7 | 8,2 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 8,7 | 12,6 | 5 | 12,6 | 2,9 | 12,6 | 8,1 |
| | 55-59 ans | 10,8 | 16,2 | 6,5 | 31,8 | 10,4 | 12,9 | 5,8 |
| | 60-64 ans | 16,8 | 22 | 12,4 | 43,3 | 12,7 | 18,4 | 12,4 |
| | 65-69 ans | 16,3 | 23,1 | 10,6 | 18,8 | 7,5 | 23,6 | 10,9 |
| | 70-74 ans | 20,4 | 29,6 | 12,4 | 33,1 | 7,8 | 29,3 | 12,8 |
| | 50-74 ans | 14,3 | 20,2 | 9,3 | 21,2 | 6 | 19,8 | 10,2 |
| | 50-74 ans ** | 13,9 | 19,3 | 8,9 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 0,7 | 2,1 | 3,4 | 4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 54 - Meurthe et Moselle

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| 55-59 ans | 3,4 | 5,6 | 1,6 | 11,6 | 2,6 | 4,3 | 1,4 |
| 60-64 ans | 4,2 | 6,6 | 2,2 | 21,7 | 3,2 | 4,1 | 2,1 |
| 65-69 ans | 4,2 | 5,5 | 3,2 | 7,5 | 3,7 | 5,2 | 3,1 |
| 70-74 ans | 4,1 | 6,9 | 1,8 | 8,3 | 7,8 | 6,8 | 1,3 |
| 50-74 ans | 3,7 | 5,1 | 2,4 | 6,2 | 2,8 | 4,8 | 2,3 |
| 50-74 ans ** | 3,6 | 5 | 2,3 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 ans | 14,3 | 9,1 | 33,3 | 0 | 0 | 14,3 | 50 |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 ans | 5,3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 70-74 ans | 7,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 0 |
| 50-74 ans | 5,2 | 5,9 | 3,8 | 0 | 0 | 8,3 | 5 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)