

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 415	1 124	1 291	698	764	426	527
	55-59 ans	2 848	1 234	1 614	201	261	1 033	1 353
	60-64 ans	4 040	1 828	2 212	195	188	1 633	2 024
	65-69 ans	3 786	1 794	1 992	89	97	1 705	1 895
	70-74 ans	1 970	925	1 045	47	52	878	993
	50-74 ans	15 059	6 905	8 154	1 230	1 362	5 675	6 792
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	139	65	74	42	46	23	28
	55-59 ans	138	58	80	9	18	49	62
	60-64 ans	230	106	124	15	5	91	119
	65-69 ans	228	105	123	5	5	100	118
	70-74 ans	136	65	71	2	5	63	66
	50-74 ans	871	399	472	73	79	326	393
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	82	41	41	26	24	15	17
	55-59 ans	87	31	56	3	10	28	46
	60-64 ans	154	70	84	6	5	64	79
	65-69 ans	163	80	83	2	2	78	81
	70-74 ans	85	42	43	1	1	41	42
	50-74 ans	571	264	307	38	42	226	265
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	57	24	33	16	22	8	11
	55-59 ans	51	27	24	6	8	21	16
	60-64 ans	76	36	40	9	0	27	40
	65-69 ans	65	25	40	3	3	22	37
	70-74 ans	51	23	28	1	4	22	24
	50-74 ans	300	135	165	35	37	100	128
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 358	1 100	1 258	682	742	418	516
	55-59 ans	2 797	1 207	1 590	195	253	1 012	1 337
	60-64 ans	3 964	1 792	2 172	186	188	1 606	1 984
	65-69 ans	3 721	1 769	1 952	86	94	1 683	1 858
	70-74 ans	1 919	902	1 017	46	48	856	969
	50-74 ans	14 759	6 770	7 989	1 195	1 325	5 575	6 664
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	98	54	44	37	22	17	22
	55-59 ans	109	56	53	10	8	46	45
	60-64 ans	176	99	77	17	6	82	71

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	200	124	76	9	4	115	72
	70-74 ans	119	73	46	2	4	71	42
	50-74 ans	702	406	296	75	44	331	252
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	98	54	44	37	22	17	22
	55-59 ans	108	55	53	10	8	45	45
	60-64 ans	175	98	77	16	6	82	71
	65-69 ans	200	124	76	9	4	115	72
	70-74 ans	119	73	46	2	4	71	42
	50-74 ans	700	404	296	74	44	330	252
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	83	47	36	30	17	17	19
	55-59 ans	98	49	49	6	8	43	41
	60-64 ans	159	89	70	13	5	76	65
	65-69 ans	179	112	67	8	4	104	63
	70-74 ans	109	68	41	2	4	66	37
	50-74 ans	628	365	263	59	38	306	225
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	79	46	33	30	15	16	18
	55-59 ans	96	49	47	6	8	43	39
	60-64 ans	153	84	69	12	5	72	64
	65-69 ans	172	112	60	8	4	104	56
	70-74 ans	102	63	39	2	2	61	37
	50-74 ans	602	354	248	58	34	296	214
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	81	46	35	30	16	16	19
	55-59 ans	98	49	49	6	8	43	41
	60-64 ans	159	89	70	13	5	76	65
	65-69 ans	176	112	64	8	4	104	60
	70-74 ans	108	67	41	2	4	65	37
	50-74 ans	622	363	259	59	37	304	222
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	82	47	35	30	17	17	18
	55-59 ans	98	49	49	6	8	43	41
	60-64 ans	159	89	70	13	5	76	65
	65-69 ans	177	112	65	8	4	104	61
	70-74 ans	108	68	40	2	3	66	37
	50-74 ans	624	365	259	59	37	306	222
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	83	47	36	30	17	17	19
	55-59 ans	98	49	49	6	8	43	41
	60-64 ans	159	89	70	13	5	76	65
	65-69 ans	179	112	67	8	4	104	63
	70-74 ans	109	68	41	2	4	66	37
	50-74 ans	628	365	263	59	38	306	225

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35	18	17	13	10	5	7
	55-59 ans	36	16	20	1	2	15	18
	60-64 ans	55	23	32	4	4	19	28
	65-69 ans	46	26	20	3	2	23	18
	70-74 ans	32	16	16	0	2	16	14
	50-74 ans	204	99	105	21	20	78	85
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	7	2	5	0	1	2	4
	60-64 ans	11	6	5	0	1	6	4
	65-69 ans	10	5	5	0	0	5	5
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	39	20	19	3	4	17	15
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	4	3	3	1	1	2
	55-59 ans	13	8	5	1	1	7	4
	60-64 ans	21	14	7	1	0	13	7
	65-69 ans	32	22	10	3	0	19	10
	70-74 ans	17	9	8	1	1	8	7
	50-74 ans	90	57	33	9	3	48	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26	16	10	9	2	7	8
	55-59 ans	31	20	11	4	2	16	9
	60-64 ans	45	29	16	5	0	24	16
	65-69 ans	63	37	26	2	1	35	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	35	27	8	0	0	27	8
	50-74 ans	200	129	71	20	5	109	66
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	16	11	5	2	0	9	5
	65-69 ans	19	16	3	0	1	16	2
	70-74 ans	16	12	4	1	0	11	4
	50-74 ans	60	41	19	4	4	37	15
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	20	12	8	2	0	10	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	33	20	13	12	3	8	10
	55-59 ans	44	28	16	5	3	23	13
	60-64 ans	66	43	23	6	0	37	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	95	59	36	5	1	54	35
	70-74 ans	52	36	16	1	1	35	15
	50-74 ans	290	186	104	29	8	157	96
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	26	16	10	9	2	7	8
	55-59 ans	31	20	11	4	2	16	9
	60-64 ans	45	29	16	5	0	24	16
	65-69 ans	63	37	26	2	1	35	25
	70-74 ans	35	27	8	0	0	27	8
	50-74 ans	200	129	71	20	5	109	66
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	21	12	9	6	1	6	8
	55-59 ans	27	18	9	4	1	14	8
	60-64 ans	41	28	13	5	0	23	13
	65-69 ans	58	35	23	2	1	33	22
	70-74 ans	33	27	6	0	0	27	6
	50-74 ans	180	120	60	17	3	103	57
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	24	15	9	7	1	8	8
	55-59 ans	30	19	11	4	2	15	9
	60-64 ans	47	32	15	5	0	27	15
	65-69 ans	67	40	27	2	1	38	26
	70-74 ans	36	29	7	0	0	29	7
	50-74 ans	204	135	69	18	4	117	65
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	16	11	5	2	0	9	5
	65-69 ans	19	16	3	0	1	16	2
	70-74 ans	16	12	4	1	0	11	4
	50-74 ans	60	41	19	4	4	37	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	14	10	4	1	0	9	4
	65-69 ans	17	14	3	0	1	14	2
	70-74 ans	15	11	4	1	0	10	4
	50-74 ans	55	37	18	3	4	34	14
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	12	8	4	0	0	8	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	4	0	4	0	2	0	2
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	14	11	3	0	1	11	2
	70-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
	50-74 ans	43	29	14	3	4	26	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	7	6	1	0	0	6	1
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	26	17	9	2	3	15	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	7	5	2	0	1	5	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	17	12	5	1	1	11	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	18	12	6	2	1	10	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	12	8	4	1	0	7	4
	65-69 ans	17	14	3	0	1	14	2
	70-74 ans	15	11	4	1	0	10	4
	50-74 ans	53	35	18	3	4	32	14
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	0	5	0	3	0	2
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	23	8	15	1	4	7	11

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 80 - Somme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	5,8	5,7	6	6	5,4	5,3
	55-59 ans	4,8	4,7	5	4,5	6,9	4,7	4,6
	60-64 ans	5,7	5,8	5,6	7,7	2,7	5,6	5,9
	65-69 ans	6	5,9	6,2	5,6	5,2	5,9	6,2
	70-74 ans	6,9	7	6,8	4,3	9,6	7,2	6,6
	50-74 ans	5,8	5,8	5,8	5,9	5,8	5,7	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,1	2,6	2,3	2,9	1,9	2,1
	55-59 ans	1,8	2,2	1,5	3	3,1	2	1,2
	60-64 ans	1,9	2	1,8	4,6	0	1,7	2
	65-69 ans	1,7	1,4	2	3,4	3,1	1,3	2
	70-74 ans	2,6	2,5	2,7	2,1	7,7	2,5	2,4
	50-74 ans	2	2	2	2,8	2,7	1,8	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59	63,1	55,4	61,9	52,2	65,2	60,7
	55-59 ans	63	53,4	70	33,3	55,6	57,1	74,2
	60-64 ans	67	66	67,7	40	100	70,3	66,4
	65-69 ans	71,5	76,2	67,5	40	40	78	68,6
	70-74 ans	62,5	64,6	60,6	50	20	65,1	63,6
	50-74 ans	65,6	66,2	65	52,1	53,2	69,3	67,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,2	4,9	3,5	5,4	3	4,1	4,3
	55-59 ans	3,9	4,6	3,3	5,1	3,2	4,5	3,4
	60-64 ans	4,4	5,5	3,5	9,1	3,2	5,1	3,6
	65-69 ans	5,4	7	3,9	10,5	4,3	6,8	3,9
	70-74 ans	6,2	8,1	4,5	4,3	8,3	8,3	4,3
	50-74 ans	4,8	6	3,7	6,3	3,3	5,9	3,8
50-74 ans **	4,7	5,7	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,1	98,2	100	100	100	97,8	100
	60-64 ans	99,4	99	100	94,1	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,5	100	98,7	100	99,7	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,7	87	81,8	81,1	77,3	100	86,4
	55-59 ans	90,7	89,1	92,5	60	100	95,6	91,1
	60-64 ans	90,9	90,8	90,9	81,3	83,3	92,7	91,5
	65-69 ans	89,5	90,3	88,2	88,9	100	90,4	87,5
	70-74 ans	91,6	93,2	89,1	100	100	93	88,1
	50-74 ans	89,7	90,3	88,9	79,7	86,4	92,7	89,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,2	97,9	91,7	100	88,2	94,1	94,7
	55-59 ans	98	100	95,9	100	100	100	95,1
	60-64 ans	96,2	94,4	98,6	92,3	100	94,7	98,5
	65-69 ans	96,1	100	89,6	100	100	100	88,9
	70-74 ans	93,6	92,6	95,1	100	50	92,4	100
	50-74 ans	95,9	97	94,3	98,3	89,5	96,7	95,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	3	4	3	5	3
	55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
	60-64 ans	4	4	4	3	7	4	3
	65-69 ans	4	4	3	4	4	4	3
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	3 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88	90	86	84	61	101	109
	55-59 ans	82	91	72	138	98	84	67
	60-64 ans	70	75	64	77	83	75	63
	65-69 ans	74	69	83	69	45	69	85
	70-74 ans	81	75	92	128	111	74	89
	50-74 ans	78	77	78	87	75	75	78

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	65 (46-105)	75 (49-110)	59,5 (43-82,5)	69 (47-109)	53 (41-61)	76 (55-144)	71 (44-123)
	55-59 ans	64 (46-98)	65 (49-104)	63 (46-82)	93,5 (55-130)	80,5 (55-129)	64 (47-104)	56 (46-78)
	60-64 ans	55 (41-85)	59 (44-85)	54 (41-85)	74 (40-89)	64 (47-96)	58 (44,5-84)	53 (35-84)
	65-69 ans	60 (45-89)	57 (46-83)	73 (41-105)	47,5 (44-75,5)	41,5 (36,5-53,5)	57,5 (46-83)	76 (43-106)
	70-74 ans	70 (46-92)	70 (43-92)	74 (48-92)	128 (54-202)	73 (47-175)	70 (43-91)	74 (48-88)
	50-74 ans	62 (45-91)	63 (46-91)	61 (43-92)	68 (47-109)	56,5 (43-82)	62 (46-89)	63 (43-92)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,1	0	11,4	0	13,6	0	9,1
	55-59 ans	2,8	1,8	3,8	10	0	0	4,4
	60-64 ans	2,8	1	5,2	0	16,7	1,2	4,2
	65-69 ans	3,5	4	2,6	0	0	4,3	2,8
	70-74 ans	2,5	1,4	4,3	0	0	1,4	4,8
	50-74 ans	3,3	2	5,1	1,3	9,1	2,1	4,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	100	97,2	100	100	100	94,7
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,9	100	97	100	100	100	96,8
	70-74 ans	99,1	100	97,6	100	75	100	100
	50-74 ans	99,4	100	98,5	100	97,4	100	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,2	38,3	47,2	43,3	58,8	29,4	36,8
	55-59 ans	36,7	32,7	40,8	16,7	25	34,9	43,9
	60-64 ans	34,6	25,8	45,7	30,8	80	25	43,1
	65-69 ans	25,7	23,2	29,9	37,5	50	22,1	28,6
	70-74 ans	29,4	23,5	39	0	50	24,2	37,8
	50-74 ans	32,5	27,1	39,9	35,6	52,6	25,5	37,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,2	8,5	5,6	10	11,8	5,9	0
	55-59 ans	7,1	4,1	10,2	0	12,5	4,7	9,8
	60-64 ans	6,9	6,7	7,1	0	20	7,9	6,2
	65-69 ans	5,6	4,5	7,5	0	0	4,8	7,9
	70-74 ans	4,6	4,4	4,9	0	0	4,5	5,4
	50-74 ans	6,2	5,5	7,2	5,1	10,5	5,6	6,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,4	2,1	2,8	0	5,9	5,9	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,5
	65-69 ans	0,6	0,9	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0,9	1,5	0	0	0	1,5	0
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	0	2,6	1	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,4	8,5	8,3	10	5,9	5,9	10,5
	55-59 ans	13,3	16,3	10,2	16,7	12,5	16,3	9,8
	60-64 ans	13,2	15,7	10	7,7	0	17,1	10,8
	65-69 ans	17,9	19,6	14,9	37,5	0	18,3	15,9
	70-74 ans	15,6	13,2	19,5	50	25	12,1	18,9
	50-74 ans	14,3	15,6	12,5	15,3	7,9	15,7	13,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31,3	34	27,8	30	11,8	41,2	42,1
	55-59 ans	31,6	40,8	22,4	66,7	25	37,2	22
	60-64 ans	28,3	32,6	22,9	38,5	0	31,6	24,6
	65-69 ans	35,2	33	38,8	25	25	33,7	39,7
	70-74 ans	32,1	39,7	19,5	0	0	40,9	21,6
	50-74 ans	31,8	35,3	27	33,9	13,2	35,6	29,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	4,3	5,6	3,3	5,9	5,9	5,3
	55-59 ans	5,1	0	10,2	0	25	0	7,3
	60-64 ans	10,1	12,4	7,1	15,4	0	11,8	7,7
	65-69 ans	10,6	14,3	4,5	0	25	15,4	3,2
	70-74 ans	14,7	17,6	9,8	50	0	16,7	10,8
	50-74 ans	9,6	11,2	7,2	6,8	10,5	12,1	6,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,9	1,1	2,9	0	0	1,3	3,1
	65-69 ans	1,1	0,9	1,5	0	0	1	1,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0,8	0,5	1,1	0	0	0,7	1,3	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
50-54 ans	1,2	2,1	0	3,3	0	0	0	
55-59 ans	6,1	6,1	6,1	0	0	7	7,3	
60-64 ans	3,8	4,5	2,9	7,7	0	3,9	3,1	
65-69 ans	2,8	3,6	1,5	0	0	3,8	1,6	
70-74 ans	1,8	0	4,9	0	0	0	5,4	
50-74 ans	3,2	3,3	3	3,4	0	3,3	3,6	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
50-54 ans	1,2	0	2,8	0	0	0	5,3	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0,6	0	1,5	0	0	0	1,6	
70-74 ans	0,9	0	2,4	0	25	0	0	
50-74 ans	0,5	0	1,1	0	2,6	0	0,9	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	14	18,2	10,3	17,6	4	19,1	19,4	
55-59 ans	15,7	23,2	10,1	25,6	11,9	22,7	9,7	
60-64 ans	16,6	24	10,6	32,3	0	23	11,6	
65-69 ans	25,5	33,4	18,4	58,1	10,6	32,1	18,8	
70-74 ans	27,1	39,9	15,7	21,7	20,8	40,9	15,5	
50-74 ans	19,6	27,5	13	24,3	6	28,2	14,4	
50-74 ans **	18,8	25,9	12,4	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	11	14,5	7,9	13,2	2,7	16,7	15,5	
55-59 ans	11,1	16,6	6,9	20,5	7,9	15,8	6,7	
60-64 ans	11,4	16,2	7,4	26,9	0	14,9	8,1	
65-69 ans	16,9	20,9	13,3	23,3	10,6	20,8	13,5	
70-74 ans	18,2	29,9	7,9	0	0	31,5	8,3	
50-74 ans	13,6	19,1	8,9	16,7	3,8	19,6	9,9	
50-74 ans **	13,2	18,4	8,4	-	-	-	-	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 80 - Somme

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,9	10,9	7,2	8,8	1,3	14,4	15,5
	55-59 ans	9,7	14,9	5,7	20,5	4	13,8	6
	60-64 ans	10,3	15,6	6	26,9	0	14,3	6,6
	65-69 ans	15,6	19,8	11,8	23,3	10,6	19,6	11,8
	70-74 ans	17,2	29,9	5,9	0	0	31,5	6,2
	50-74 ans	12,2	17,7	7,5	14,2	2,3	18,5	8,6
	50-74 ans **	11,7	16,8	7,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,2	13,6	7,2	10,3	1,3	19,1	15,5
	55-59 ans	10,7	15,7	6,9	20,5	7,9	14,8	6,7
	60-64 ans	11,9	17,9	6,9	26,9	0	16,8	7,6
	65-69 ans	18	22,6	13,8	23,3	10,6	22,6	14
	70-74 ans	18,8	32,2	6,9	0	0	33,9	7,2
	50-74 ans	13,8	19,9	8,6	15,1	3	21	9,8
	50-74 ans **	13,2	18,9	8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	1,8	1,6	1,5	1,3	2,4	1,9
	55-59 ans	1,8	0	3,1	0	7,9	0	2,2
	60-64 ans	4	6,1	2,3	10,8	0	5,6	2,5
	65-69 ans	5,1	9	1,5	0	10,6	9,5	1,1
	70-74 ans	8,3	13,3	3,9	21,7	0	12,9	4,1
	50-74 ans	4,1	6,1	2,4	3,3	3	6,6	2,3
	50-74 ans **	3,6	4,9	2,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	20	0	20	0	0	0	33,3
	60-64 ans	35,7	30	50	0	0	33,3	50
	65-69 ans	17,6	21,4	0	0	0	21,4	0
	70-74 ans	20	18,2	25	0	0	20	25
	50-74 ans	21,8	21,6	22,2	0	0	23,5	28,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)