

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	106	46	60	31	38	15	22
	55-59 ans	152	65	87	21	17	44	70
	60-64 ans	257	116	141	28	24	88	117
	65-69 ans	364	131	233	21	28	110	205
	70-74 ans	268	96	172	14	8	82	164
	50-74 ans	1 147	454	693	115	115	339	578
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	13	6	7	3	0	3	7
	60-64 ans	15	7	8	3	0	4	8
	65-69 ans	16	7	9	0	0	7	9
	70-74 ans	13	6	7	0	1	6	6
	50-74 ans	61	29	32	7	2	22	30
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	8	3	5	1	0	2	5
	60-64 ans	12	5	7	2	0	3	7
	65-69 ans	15	6	9	0	0	6	9
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	46	20	26	3	0	17	26
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	15	9	6	4	2	5	4
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	103	44	59	30	37	14	22
	55-59 ans	147	62	85	19	17	43	68
	60-64 ans	254	114	140	27	24	87	116
	65-69 ans	363	130	233	21	28	109	205
	70-74 ans	265	95	170	14	7	81	163
	50-74 ans	1 132	445	687	111	113	334	574
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	15	9	6	3	1	6	5
	65-69 ans	17	6	11	0	2	6	9
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	52	25	27	5	9	20	18
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	15	9	6	3	1	6	5
	65-69 ans	17	6	11	0	2	6	9
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	52	25	27	5	9	20	18
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	10	8	2	3	0	5	2
	65-69 ans	11	5	6	0	1	5	5
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	38	22	16	4	5	18	11
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	10	8	2	3	0	5	2
	65-69 ans	11	5	6	0	1	5	5
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	38	22	16	4	5	18	11
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	10	8	2	3	0	5	2
	65-69 ans	11	5	6	0	1	5	5
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	38	22	16	4	5	18	11
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	10	8	2	3	0	5	2
	65-69 ans	11	5	6	0	1	5	5
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	38	22	16	4	5	18	11
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	10	8	2	3	0	5	2
	65-69 ans	11	5	6	0	1	5	5
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	38	22	16	4	5	18	11
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	18	6	12	1	3	5	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0	
70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	
50-74 ans	8	6	2	0	1	6	1	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	
50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	7	2	1	1	6	1
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	6	2	0	1	6	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,8	6,5	1,7	3,2	2,6	13,3	0
	55-59 ans	8,6	9,2	8	14,3	0	6,8	10
	60-64 ans	5,8	6	5,7	10,7	0	4,5	6,8
	65-69 ans	4,4	5,3	3,9	0	0	6,4	4,4
	70-74 ans	4,9	6,3	4,1	0	12,5	7,3	3,7
	50-74 ans	5,3	6,4	4,6	6,1	1,7	6,5	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,8	4,3	1,7	3,2	2,6	6,7	0
	55-59 ans	3,3	4,6	2,3	9,5	0	2,3	2,9
	60-64 ans	1,2	1,7	0,7	3,6	0	1,1	0,9
	65-69 ans	0,3	0,8	0	0	0	0,9	0
	70-74 ans	1,1	1	1,2	0	12,5	1,2	0,6
	50-74 ans	1,3	2	0,9	3,5	1,7	1,5	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	25	33,3	0	0	0	50	0
	55-59 ans	61,5	50	71,4	33,3	0	66,7	71,4
	60-64 ans	80	71,4	87,5	66,7	0	75	87,5
	65-69 ans	93,8	85,7	100	0	0	85,7	100
	70-74 ans	76,9	83,3	71,4	0	0	83,3	83,3
	50-74 ans	75,4	69	81,3	42,9	0	77,3	86,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	5,8	4,5	6,8	3,3	8,1	7,1	4,5
	55-59 ans	4,1	4,8	3,5	0	11,8	7	1,5
	60-64 ans	5,9	7,9	4,3	11,1	4,2	6,9	4,3
	65-69 ans	4,7	4,6	4,7	0	7,1	5,5	4,4
	70-74 ans	3	5,3	1,8	7,1	14,3	4,9	1,2
	50-74 ans	4,6	5,6	3,9	4,5	8	6	3,1
50-74 ans **	4,9	5,4	4,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	0	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	0	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	66,7	50	75	0	66,7	100	100
	55-59 ans	83,3	100	66,7	0	50	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	66,7	88,9	33,3	100	0	83,3	40	
65-69 ans	64,7	83,3	54,5	0	50	83,3	55,6	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
50-74 ans	73,1	88	59,3	80	55,6	90	61,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	100	100	100	0	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	0	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	0	100	100	
65-69 ans	100	100	100	0	100	100	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	4	4	4	4	4	3	4	
55-59 ans	5	5	4	6	6	5	3	
60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4	
65-69 ans	4	4	4	4	5	4	4	
70-74 ans	4	4	4	4	2	4	4	
50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-4)	
55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-7)	3 (2-6)	2 (2-7)	6 (2-7)	3 (2-7)	2 (2-5)	
60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	4 (2-7)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4,5)	
65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-5)	2,5 (2-6,5)	3 (2-6)	2 (2-4)	
70-74 ans	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4,5)	2 (2-7)	2 (2-2)	3 (2-6)	2 (2-5)	
50-74 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	46	15	56	,	57	15	55	
55-59 ans	60	64	54	,	68	64	39	
60-64 ans	74	64	114	69	,	60	114	
65-69 ans	77	112	47	,	91	112	38	
70-74 ans	52	50	55	56	18	48	74	
50-74 ans	65	69	59	66	58	70	60	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	46 (26-66)	15 (15-15)	55 (37-77)		57 (37-77)	15 (15-15)	55 (55-55)	
55-59 ans	40 (39-68)	40 (27-124)	53,5 (39-68)		68 (68-68)	40 (27-124)	39 (39-39)	
60-64 ans	66,5 (57-79)	61,5 (54,5-75,5)	113,5 (67-160)	72 (52-84)		57 (57-66)	113,5 (67-160)	
65-69 ans	47 (23-119)	119 (47-174)	35 (23-76)		91 (91-91)	119 (47-174)	28 (23-42)	
70-74 ans	46,5 (36-58)	53 (40-56)	33 (18-115)	56 (56-56)	18 (18-18)	46,5 (39,5-56,5)	74 (33-115)	
50-74 ans	55,5 (39-77)	56,5 (40-79)	48,5 (30,5-76,5)	64 (54-78)	68 (37-77)	55 (40-79)	42 (28-76)	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	0	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	0	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	0	100	100	
65-69 ans	100	100	100	0	100	100	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	100	100	100	0	100	100	100	
55-59 ans	60	66,7	50	0	0	66,7	100	
60-64 ans	30	12,5	100	33,3	0	0	100	
65-69 ans	45,5	20	66,7	0	0	20	80	
70-74 ans	37,5	20	66,7	0	100	25	50	
50-74 ans	47,4	27,3	75	25	60	27,8	81,8	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	10	12,5	0	0	0	20	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	12,5	20	0	0	0	25	0	
50-74 ans	5,3	9,1	0	0	0	11,1	0	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	10	12,5	0	33,3	0	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,6	4,5	0	25	0	0	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	20	33,3	0	0	0	33,3	0
	60-64 ans	10	12,5	0	0	0	20	0
	65-69 ans	36,4	60	16,7	0	100	60	0
	70-74 ans	25	20	33,3	0	0	25	50
	50-74 ans	21,1	27,3	12,5	0	20	33,3	9,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	10	12,5	0	0	0	20	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	12,5	20	0	100	0	0	0
	50-74 ans	5,3	9,1	0	25	0	5,6	0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	20	0	50	0	100	0	0
	60-64 ans	10	12,5	0	33,3	0	0	0
	65-69 ans	18,2	20	16,7	0	0	20	20
	70-74 ans	12,5	20	0	0	0	25	0
	50-74 ans	13,2	13,6	12,5	25	20	11,1	9,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,8	16,1	0	0	0	23,3	0
	60-64 ans	7,9	17,5	0	37	0	11,5	0
	65-69 ans	11	23,1	4,3	0	35,7	27,5	0
	70-74 ans	7,5	10,5	5,9	0	0	12,3	6,1
	50-74 ans	8	15,7	2,9	9	8,8	18	1,7
	50-74 ans **	6,9	12,6	1,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,8	16,1	0	0	0	23,3	0
	60-64 ans	3,9	8,8	0	0	0	11,5	0
	65-69 ans	11	23,1	4,3	0	35,7	27,5	0
	70-74 ans	7,5	10,5	5,9	0	0	12,3	6,1
	50-74 ans	7,1	13,5	2,9	0	8,8	18	1,7
	50-74 ans **	6	10,7	1,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,8	16,1	0	0	0	23,3	0
	60-64 ans	3,9	8,8	0	0	0	11,5	0
	65-69 ans	8,3	15,4	4,3	0	35,7	18,3	0
	70-74 ans	7,5	10,5	5,9	0	0	12,3	6,1
	50-74 ans	6,2	11,2	2,9	0	8,8	15	1,7
	50-74 ans **	5,4	9,6	1,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,8	16,1	0	0	0	23,3	0
	60-64 ans	3,9	8,8	0	0	0	11,5	0
	65-69 ans	8,3	15,4	4,3	0	35,7	18,3	0
	70-74 ans	7,5	10,5	5,9	0	0	12,3	6,1
	50-74 ans	6,2	11,2	2,9	0	8,8	15	1,7
	50-74 ans **	5,4	9,6	1,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	3,9	8,8	0	0	0	11,5	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	3,8	10,5	0	71,4	0	0	0
50-74 ans	1,8	4,5	0	9	0	3	0
50-74 ans **	1,6	3,3	0	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	100	100	0	0	0	100	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	100	100	0	100	0	0	0
50-74 ans	100	100	0	100	0	100	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)