

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	22 529	11 310	11 219	7 169	7 492	4 141	3 727
	55-59 ans	20 906	8 964	11 942	1 924	2 240	7 040	9 702
	60-64 ans	22 347	9 241	13 106	1 704	2 265	7 537	10 841
	65-69 ans	21 213	9 491	11 722	1 380	1 644	8 111	10 078
	70-74 ans	15 789	6 965	8 824	842	1 203	6 123	7 621
	50-74 ans	102 784	45 971	56 813	13 019	14 844	32 952	41 969
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 256	624	632	430	465	194	167
	55-59 ans	1 188	492	696	149	184	343	512
	60-64 ans	1 290	519	771	152	193	367	578
	65-69 ans	1 313	594	719	141	152	453	567
	70-74 ans	1 263	575	688	145	140	430	548
	50-74 ans	6 310	2 804	3 506	1 017	1 134	1 787	2 372
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	844	412	432	265	305	147	127
	55-59 ans	828	350	478	96	106	254	372
	60-64 ans	920	383	537	92	109	291	428
	65-69 ans	971	453	518	90	88	363	430
	70-74 ans	918	424	494	85	83	339	411
	50-74 ans	4 481	2 022	2 459	628	691	1 394	1 768
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	412	212	200	165	160	47	40
	55-59 ans	360	142	218	53	78	89	140
	60-64 ans	370	136	234	60	84	76	150
	65-69 ans	342	141	201	51	64	90	137
	70-74 ans	345	151	194	60	57	91	137
	50-74 ans	1 829	782	1 047	389	443	393	604
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	22 117	11 098	11 019	7 004	7 332	4 094	3 687
	55-59 ans	20 546	8 822	11 724	1 871	2 162	6 951	9 562
	60-64 ans	21 977	9 105	12 872	1 644	2 181	7 461	10 691
	65-69 ans	20 871	9 350	11 521	1 329	1 580	8 021	9 941
	70-74 ans	15 444	6 814	8 630	782	1 146	6 032	7 484
	50-74 ans	100 955	45 189	55 766	12 630	14 401	32 559	41 365
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	440	235	205	157	148	78	57
	55-59 ans	470	228	242	56	41	172	201
	60-64 ans	564	265	299	51	56	214	243
	65-69 ans	594	274	320	46	51	228	269
	70-74 ans	437	210	227	27	30	183	197

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 505	1 212	1 293	337	326	875	967
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	439	234	205	157	148	77	57
	55-59 ans	467	227	240	56	41	171	199
	60-64 ans	559	261	298	51	56	210	242
	65-69 ans	591	273	318	46	51	227	267
	70-74 ans	434	207	227	26	30	181	197
	50-74 ans	2 490	1 202	1 288	336	326	866	962
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	379	206	173	139	124	67	49
	55-59 ans	413	203	210	52	36	151	174
	60-64 ans	509	237	272	44	48	193	224
	65-69 ans	542	249	293	41	45	208	248
	70-74 ans	382	183	199	22	18	161	181
	50-74 ans	2 225	1 078	1 147	298	271	780	876
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	374	203	171	136	123	67	48
	55-59 ans	405	199	206	50	34	149	172
	60-64 ans	498	230	268	42	48	188	220
	65-69 ans	528	242	286	39	41	203	245
	70-74 ans	374	176	198	21	18	155	180
	50-74 ans	2 179	1 050	1 129	288	264	762	865
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	12	9	3	3	0	6	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	375	205	170	138	122	67	48
	55-59 ans	407	200	207	51	34	149	173

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	495	229	266	43	48	186	218
	65-69 ans	531	242	289	39	44	203	245
	70-74 ans	373	179	194	22	18	157	176
	50-74 ans	2 181	1 055	1 126	293	266	762	860
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	14	8	6	1	0	7	6
	65-69 ans	11	7	4	2	1	5	3
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	50-74 ans	44	23	21	5	5	18	16
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	50-74 ans	15	9	6	1	2	8	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	377	204	173	137	124	67	49
	55-59 ans	409	202	207	52	34	150	173
	60-64 ans	505	235	270	44	48	191	222
	65-69 ans	535	245	290	39	43	206	247
	70-74 ans	378	180	198	21	18	159	180
	50-74 ans	2 204	1 066	1 138	293	267	773	871
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	382	208	174	140	125	68	49
	55-59 ans	415	204	211	52	36	152	175
	60-64 ans	511	239	272	44	48	195	224
	65-69 ans	544	250	294	41	45	209	249
	70-74 ans	388	186	202	22	19	164	183
	50-74 ans	2 240	1 087	1 153	299	273	788	880
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	208	100	108	65	76	35	32
	55-59 ans	190	75	115	22	24	53	91
	60-64 ans	223	80	143	10	26	70	117
	65-69 ans	240	73	167	14	24	59	143
	70-74 ans	159	63	96	9	7	54	89
	50-74 ans	1 020	391	629	120	157	271	472

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	33	18	15	14	13	4	2
	55-59 ans	29	17	12	2	2	15	10
	60-64 ans	33	16	17	3	3	13	14
	65-69 ans	36	21	15	2	2	19	13
	70-74 ans	18	7	11	0	1	7	10
	50-74 ans	149	79	70	21	21	58	49
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	6	5	6	2	0	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	52	31	21	19	16	12	5
	55-59 ans	67	35	32	6	4	29	28
	60-64 ans	95	49	46	8	5	41	41
	65-69 ans	94	52	42	6	5	46	37
	70-74 ans	77	37	40	7	7	30	33
	50-74 ans	385	204	181	46	37	158	144
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	55	38	17	25	12	13	5
	55-59 ans	77	49	28	15	2	34	26
	60-64 ans	104	61	43	14	7	47	36
	65-69 ans	105	64	41	9	6	55	35
	70-74 ans	70	37	33	2	4	35	29
	50-74 ans	411	249	162	65	31	184	131
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	22	11	11	1	3	10	8
	60-64 ans	25	17	8	5	2	12	6
	65-69 ans	41	25	16	6	5	19	11
	70-74 ans	44	31	13	2	0	29	13
	50-74 ans	141	90	51	19	12	71	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	4	2	4	0	0	2
	55-59 ans	4	2	2	2	0	0	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	21	11	10	7	1	4	9
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	10	5	5	1	1	4	4
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	24	15	9	3	1	12	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	7	4	3	2	1	2	2
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	15	12	3	5	1	7	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	108	70	38	45	28	25	10
	55-59 ans	147	86	61	21	6	65	55
	60-64 ans	205	114	91	23	12	91	79
	65-69 ans	201	117	84	15	11	102	73
	70-74 ans	150	76	74	9	11	67	63
	50-74 ans	811	463	348	113	68	350	280
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	55	38	17	25	12	13	5
	55-59 ans	77	49	28	15	2	34	26
	60-64 ans	104	61	43	14	7	47	36
	65-69 ans	105	64	41	9	6	55	35
	70-74 ans	70	37	33	2	4	35	29
	50-74 ans	411	249	162	65	31	184	131

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	26	9	15	6	11	3
	55-59 ans	52	36	16	11	0	25	16
	60-64 ans	56	37	19	10	2	27	17
	65-69 ans	60	35	25	6	4	29	21
	70-74 ans	40	21	19	1	3	20	16
	50-74 ans	243	155	88	43	15	112	73
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	42	31	11	17	7	14	4
	55-59 ans	63	42	21	12	2	30	19
	60-64 ans	75	49	26	13	3	36	23
	65-69 ans	84	52	32	6	6	46	26
	70-74 ans	64	37	27	2	4	35	23
	50-74 ans	328	211	117	50	22	161	95
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	22	11	11	1	3	10	8
	60-64 ans	25	17	8	5	2	12	6
	65-69 ans	41	25	16	6	5	19	11
	70-74 ans	44	31	13	2	0	29	13
	50-74 ans	141	90	51	19	12	71	39
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	17	8	9	0	3	8	6
	60-64 ans	22	14	8	3	2	11	6
	65-69 ans	37	22	15	5	5	17	10
	70-74 ans	40	28	12	2	0	26	12
	50-74 ans	125	78	47	15	12	63	35
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	17	8	9	0	3	8	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21	13	8	3	2	10	6
	65-69 ans	36	22	14	5	5	17	9
	70-74 ans	40	28	12	2	0	26	12
	50-74 ans	123	77	46	15	12	62	34
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	10	4	6	0	2	4	4
	60-64 ans	12	6	6	1	1	5	5
	65-69 ans	29	18	11	3	4	15	7
	70-74 ans	30	24	6	2	0	22	6
	50-74 ans	86	56	30	9	8	47	22
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	7	4	3	0	1	4	2
	60-64 ans	9	7	2	2	1	5	1
	65-69 ans	7	4	3	2	1	2	2
	70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
	50-74 ans	37	21	16	6	4	15	12
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	7	2	5	0	1	2	4
	60-64 ans	6	2	4	0	0	2	4
	65-69 ans	12	8	4	1	1	7	3
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	34	19	15	4	2	15	13
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	13	10	3	1	0	9	3
	50-74 ans	25	17	8	4	2	13	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	8	6	2	1	1	5	1
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	19	13	6	1	3	12	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	8	7	1	0	1	7	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1
	55-59 ans	16	7	9	0	3	7	6
	60-64 ans	21	13	8	3	2	10	6
	65-69 ans	34	21	13	5	4	16	9
	70-74 ans	38	26	12	2	0	24	12
	50-74 ans	117	72	45	15	11	57	34
A40- Perdus de vue	50-54 ans	29	13	16	10	14	3	2
	55-59 ans	18	11	7	4	2	7	5
	60-64 ans	19	8	11	2	6	6	5
	65-69 ans	12	6	6	3	3	3	3
	70-74 ans	18	7	11	2	6	5	5
	50-74 ans	96	45	51	21	31	24	20

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	5,5	5,6	6	6,2	4,7	4,5
	55-59 ans	5,7	5,5	5,8	7,7	8,2	4,9	5,3
	60-64 ans	5,8	5,6	5,9	8,9	8,5	4,9	5,3
	65-69 ans	6,2	6,3	6,1	10,2	9,2	5,6	5,6
	70-74 ans	8	8,3	7,8	17,2	11,6	7	7,2
	50-74 ans	6,1	6,1	6,2	7,8	7,6	5,4	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,8	2,3	2,1	1,1	1,1
	55-59 ans	1,7	1,6	1,8	2,8	3,5	1,3	1,4
	60-64 ans	1,7	1,5	1,8	3,5	3,7	1	1,4
	65-69 ans	1,6	1,5	1,7	3,7	3,9	1,1	1,4
	70-74 ans	2,2	2,2	2,2	7,1	4,7	1,5	1,8
	50-74 ans	1,8	1,7	1,8	3	3	1,2	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,2	66	68,4	61,6	65,6	75,8	76
	55-59 ans	69,7	71,1	68,7	64,4	57,6	74,1	72,7
	60-64 ans	71,3	73,8	69,6	60,5	56,5	79,3	74
	65-69 ans	74	76,3	72	63,8	57,9	80,1	75,8
	70-74 ans	72,7	73,7	71,8	58,6	59,3	78,8	75
	50-74 ans	71	72,1	70,1	61,8	60,9	78	74,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,1	1,9	2,2	2	1,9	1,5
	55-59 ans	2,3	2,6	2,1	3	1,9	2,5	2,1
	60-64 ans	2,6	2,9	2,3	3,1	2,6	2,9	2,3
	65-69 ans	2,8	2,9	2,8	3,5	3,2	2,8	2,7
	70-74 ans	2,8	3,1	2,6	3,5	2,6	3	2,6
	50-74 ans	2,5	2,7	2,3	2,7	2,3	2,7	2,3
50-74 ans **	2,5	2,7	2,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	99,6	100	100	100	98,7	100
	55-59 ans	99,4	99,6	99,2	100	100	99,4	99
	60-64 ans	99,1	98,5	99,7	100	100	98,1	99,6
	65-69 ans	99,5	99,6	99,4	100	100	99,6	99,3
	70-74 ans	99,3	98,6	100	96,3	100	98,9	100
	50-74 ans	99,4	99,2	99,6	99,7	100	99	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,3	88	84,4	88,5	83,8	87	86
	55-59 ans	88,4	89,4	87,5	92,9	87,8	88,3	87,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91,1	90,8	91,3	86,3	85,7	91,9	92,6
	65-69 ans	91,7	91,2	92,1	89,1	88,2	91,6	92,9
	70-74 ans	88	88,4	87,7	84,6	60	89	91,9
	50-74 ans	89,4	89,7	89,1	88,7	83,1	90,1	91,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,7	98,5	98,8	97,8	99,2	100	98
	55-59 ans	98,1	98	98,1	96,2	94,4	98,7	98,9
	60-64 ans	97,8	97	98,5	95,5	100	97,4	98,2
	65-69 ans	97,4	97,2	97,6	95,1	91,1	97,6	98,8
	70-74 ans	97,9	96,2	99,5	95,5	100	96,3	99,4
	50-74 ans	97,9	97,4	98,4	96,6	97,4	97,7	98,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	90	75	84	73	103	78
	55-59 ans	98	103	93	101	75	103	97
	60-64 ans	86	83	88	83	95	83	86
	65-69 ans	88	96	82	78	76	100	83
	70-74 ans	85	75	93	88	142	74	88
	50-74 ans	88	90	86	86	83	91	87
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61 (41-85)	66 (42-90)	57 (40-79)	63 (42-85)	57 (40,5-77)	74 (41-109)	58,5 (39,5-83,5)
	55-59 ans	68 (47-97)	72 (49-104)	62,5 (45-92)	67,5 (48-94)	58,5 (47,5-77,5)	76 (49-107)	63 (44-95)
	60-64 ans	64 (42-91)	65 (42-89)	64 (43-92)	61 (42-93)	66,5 (43,5-92)	65 (42-88)	63 (43-92)
	65-69 ans	62,5 (41-90)	63 (42-95)	62 (40-85)	51 (40-97)	61 (32-80)	63 (42,5-95)	62 (41,5-86,5)
	70-74 ans	63 (42-92)	59 (39-86)	69 (43-98)	66,5 (45-95)	81 (55-170)	59 (38-83)	68 (42-94)
	50-74 ans	63 (42-91)	65 (43-92)	62 (42-89)	63 (43-91)	60 (41-83)	66,5 (43-94)	63 (42-91)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,6	5,5	7,8	6,4	9,5	3,8	3,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,8	4,8	2,9	7,1	4,9	4,1	2,5
	60-64 ans	3,4	3	3,7	3,9	10,7	2,8	2,1
	65-69 ans	2	2,2	1,9	6,5	5,9	1,3	1,1
	70-74 ans	4,1	3,3	4,8	7,4	20	2,7	2,5
	50-74 ans	3,8	3,7	3,9	6,2	9,5	2,7	2,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	99	100	98,6	100	100	100
	55-59 ans	99	99,5	98,6	100	94,4	99,3	99,4
	60-64 ans	99,2	99,2	99,3	100	100	99	99,1
	65-69 ans	98,7	98,4	99	95,1	95,6	99	99,6
	70-74 ans	99	98,4	99,5	95,5	100	98,8	99,4
	50-74 ans	99,1	98,9	99,2	98,3	98,5	99,1	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,5	48,1	62,1	46,4	60,8	51,5	65,3
	55-59 ans	45,8	36,8	54,5	42,3	66,7	34,9	52
	60-64 ans	43,6	33,5	52,6	22,7	54,2	35,9	52,2
	65-69 ans	44,1	29,2	56,8	34,1	53,3	28,2	57,4
	70-74 ans	41	33,9	47,5	40,9	36,8	32,9	48,6
	50-74 ans	45,5	36	54,6	40,1	57,5	34,4	53,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,6	8,7	8,6	10	10,4	5,9	4,1
	55-59 ans	7	8,3	5,7	3,8	5,6	9,9	5,7
	60-64 ans	6,5	6,7	6,3	6,8	6,3	6,7	6,3
	65-69 ans	6,6	8,4	5,1	4,9	4,4	9,1	5,2
	70-74 ans	4,6	3,8	5,4	0	5,3	4,3	5,5
	50-74 ans	6,7	7,3	6,1	7	7,7	7,4	5,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	1,4	0	2,1	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1	0,5	3,8	0	0	0,6
	60-64 ans	0,4	0,4	0,4	2,3	2,1	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,7	0	2,2	0	0,4
	70-74 ans	0,3	0	0,5	0	0	0	0,5
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	2	0,7	0	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,6	14,9	12,1	13,6	12,8	17,6	10,2
	55-59 ans	16,1	17,2	15,2	11,5	11,1	19,1	16
	60-64 ans	18,6	20,5	16,9	18,2	10,4	21	18,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17,3	20,8	14,3	14,6	11,1	22	14,9
	70-74 ans	19,8	19,9	19,8	31,8	36,8	18,3	18
	50-74 ans	17,2	18,8	15,7	15,4	13,6	20,1	16,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,4	18,3	9,8	17,9	9,6	19,1	10,2
	55-59 ans	18,6	24	13,3	28,8	5,6	22,4	14,9
	60-64 ans	20,4	25,5	15,8	31,8	14,6	24,1	16,1
	65-69 ans	19,3	25,6	13,9	22	13,3	26,3	14,1
	70-74 ans	18	19,9	16,3	9,1	21,1	21,3	15,8
	50-74 ans	18,3	22,9	14,1	21,7	11,4	23,4	14,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,4	2,9	1,7	3,6	1,6	1,5	2
	55-59 ans	5,3	5,4	5,2	1,9	8,3	6,6	4,6
	60-64 ans	4,9	7,1	2,9	11,4	4,2	6,2	2,7
	65-69 ans	7,5	10	5,4	14,6	11,1	9,1	4,4
	70-74 ans	11,3	16,7	6,4	9,1	0	17,7	7,1
	50-74 ans	6,3	8,3	4,4	6,4	4,4	9	4,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	1,9	1,1	2,9	0	0	4,1
	55-59 ans	1	1	0,9	3,8	0	0	1,1
	60-64 ans	0,8	0,8	0,7	0	2,1	1	0,4
	65-69 ans	0,9	1,2	0,7	2,4	0	1	0,8
	70-74 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,1
	50-74 ans	0,9	1	0,9	2,3	0,4	0,5	1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	1	0	1,4	0	0	0
	55-59 ans	1	1,5	0,5	0	0	2	0,6
	60-64 ans	2	2,1	1,8	2,3	2,1	2,1	1,8
	65-69 ans	0,6	0,8	0,3	0	0	1	0,4
	70-74 ans	1,3	1,6	1	0	0	1,8	1,1
	50-74 ans	1,1	1,4	0,8	1	0,4	1,5	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	1	0	1,4	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0,5	0	0	0	0,7	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1,3	1,6	1	4,9	2,2	1	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,8	1,6	0	4,5	0	1,2	0
	50-74 ans	0,7	1,1	0,3	1,7	0,4	0,9	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	6,3	3,4	6,4	3,8	6,1	2,7
	55-59 ans	7,2	9,7	5,2	11,2	2,8	9,4	5,8
	60-64 ans	9,3	12,5	7,1	14	5,5	12,2	7,4
	65-69 ans	9,6	12,5	7,3	11,3	7	12,7	7,3
	70-74 ans	9,7	11,2	8,6	11,5	9,6	11,1	8,4
	50-74 ans	8	10,2	6,2	8,9	4,7	10,7	6,8
	50-74 ans **	7,9	10,1	6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,4	1,5	3,6	1,6	3,2	1,4
	55-59 ans	3,7	5,6	2,4	8	0,9	4,9	2,7
	60-64 ans	4,7	6,7	3,3	8,5	3,2	6,3	3,4
	65-69 ans	5	6,8	3,6	6,8	3,8	6,9	3,5
	70-74 ans	4,5	5,4	3,8	2,6	3,5	5,8	3,9
	50-74 ans	4,1	5,5	2,9	5,1	2,2	5,7	3,2
	50-74 ans **	4,1	5,4	2,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,3	0,8	2,1	0,8	2,7	0,8
	55-59 ans	2,5	4,1	1,4	5,9	0	3,6	1,7
	60-64 ans	2,5	4,1	1,5	6,1	0,9	3,6	1,6
	65-69 ans	2,9	3,7	2,2	4,5	2,5	3,6	2,1
	70-74 ans	2,6	3,1	2,2	1,3	2,6	3,3	2,1
	50-74 ans	2,4	3,4	1,6	3,4	1	3,4	1,8
	50-74 ans **	2,4	3,5	1,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,8	1	2,4	1	3,4	1,1
	55-59 ans	3,1	4,8	1,8	6,4	0,9	4,3	2
	60-64 ans	3,4	5,4	2	7,9	1,4	4,8	2,2
	65-69 ans	4	5,6	2,8	4,5	3,8	5,7	2,6
	70-74 ans	4,1	5,4	3,1	2,6	3,5	5,8	3,1
	50-74 ans	3,2	4,7	2,1	4	1,5	4,9	2,3
	50-74 ans **	3,2	4,6	2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,3	0,7	0,3	0,2	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,1	1,2	0,9	0,5	1,4	1,4	0,8
	60-64 ans	1,1	1,9	0,6	3	0,9	1,6	0,6
	65-69 ans	2	2,7	1,4	4,5	3,2	2,4	1,1
	70-74 ans	2,8	4,5	1,5	2,6	0	4,8	1,7
	50-74 ans	1,4	2	0,9	1,5	0,8	2,2	0,9
	50-74 ans **	1,3	1,9	0,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4,5	7,1	0	0	0	9,1	0
	65-69 ans	2,7	0	6,7	0	0	0	10
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,6	1,3	2,1	0	0	1,6	2,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)