

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 44 - Région: ALSACE_CHAMPAGNE_ARDENNE_LORRAINE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	114 232	53 317	60 915	31 075	33 922	22 242	26 993
	55-59 ans	107 835	49 019	58 816	7 339	8 094	41 680	50 722
	60-64 ans	119 252	54 197	65 055	7 014	7 294	47 183	57 761
	65-69 ans	87 959	40 499	47 460	4 194	4 690	36 305	42 770
	70-74 ans	74 486	33 437	41 049	3 037	3 606	30 400	37 443
	50-74 ans	503 764	230 469	273 295	52 659	57 606	177 810	215 689
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	5 595	2 709	2 886	1 733	1 848	976	1 038
	55-59 ans	5 407	2 471	2 936	542	679	1 929	2 257
	60-64 ans	5 662	2 511	3 151	532	587	1 979	2 564
	65-69 ans	4 336	1 998	2 338	331	370	1 667	1 968
	70-74 ans	4 375	1 871	2 504	312	363	1 559	2 141
	50-74 ans	25 375	11 560	13 815	3 450	3 847	8 110	9 968
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 772	1 859	1 913	1 101	1 127	758	786
	55-59 ans	3 756	1 764	1 992	306	350	1 458	1 642
	60-64 ans	4 070	1 808	2 262	296	311	1 512	1 951
	65-69 ans	3 154	1 449	1 705	176	204	1 273	1 501
	70-74 ans	3 144	1 358	1 786	144	199	1 214	1 587
	50-74 ans	17 896	8 238	9 658	2 023	2 191	6 215	7 467
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 823	850	973	632	721	218	252
	55-59 ans	1 651	707	944	236	329	471	615
	60-64 ans	1 592	703	889	236	276	467	613
	65-69 ans	1 182	549	633	155	166	394	467
	70-74 ans	1 231	513	718	168	164	345	554
	50-74 ans	7 479	3 322	4 157	1 427	1 656	1 895	2 501
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	112 409	52 467	59 942	30 443	33 201	22 024	26 741
	55-59 ans	106 184	48 312	57 872	7 103	7 765	41 209	50 107
	60-64 ans	117 660	53 494	64 166	6 778	7 018	46 716	57 148
	65-69 ans	86 777	39 950	46 827	4 039	4 524	35 911	42 303
	70-74 ans	73 255	32 924	40 331	2 869	3 442	30 055	36 889
	50-74 ans	496 285	227 147	269 138	51 232	55 950	175 915	213 188
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 805	991	814	606	502	385	312
	55-59 ans	1 875	1 024	851	191	129	833	722
	60-64 ans	2 196	1 234	962	184	146	1 050	816

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1 728	944	784	122	96	822	688
	70-74 ans	1 689	925	764	110	80	815	684
	50-74 ans	9 293	5 118	4 175	1 213	953	3 905	3 222
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 780	977	803	598	498	379	305
	55-59 ans	1 833	999	834	185	127	814	707
	60-64 ans	2 158	1 211	947	183	145	1 028	802
	65-69 ans	1 685	921	764	118	93	803	671
	70-74 ans	1 634	892	742	106	78	786	664
	50-74 ans	9 090	5 000	4 090	1 190	941	3 810	3 149
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 603	879	724	531	447	348	277
	55-59 ans	1 699	919	780	160	116	759	664
	60-64 ans	2 035	1 129	906	168	132	961	774
	65-69 ans	1 578	857	721	104	77	753	644
	70-74 ans	1 489	821	668	100	68	721	600
	50-74 ans	8 404	4 605	3 799	1 063	840	3 542	2 959
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 531	840	691	511	429	329	262
	55-59 ans	1 609	869	740	148	106	721	634
	60-64 ans	1 923	1 064	859	151	120	913	739
	65-69 ans	1 477	798	679	94	73	704	606
	70-74 ans	1 396	766	630	94	63	672	567
	50-74 ans	7 936	4 337	3 599	998	791	3 339	2 808
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	10	6	4	3	2	3	2
	55-59 ans	14	11	3	2	0	9	3
	60-64 ans	23	16	7	4	2	12	5
	65-69 ans	17	14	3	1	0	13	3
	70-74 ans	19	14	5	0	0	14	5
	50-74 ans	83	61	22	10	4	51	18
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	15	11	4	1	0	10	4

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 590	877	713	529	439	348	274
	55-59 ans	1 682	911	771	158	113	753	658
	60-64 ans	2 007	1 116	891	166	130	950	761
	65-69 ans	1 555	842	713	104	77	738	636
	70-74 ans	1 458	805	653	97	65	708	588
	50-74 ans	8 292	4 551	3 741	1 054	824	3 497	2 917
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	13	2	11	2	8	0	3
	55-59 ans	17	8	9	2	3	6	6
	60-64 ans	28	13	15	2	2	11	13
	65-69 ans	23	15	8	0	0	15	8
	70-74 ans	31	16	15	3	3	13	12
	50-74 ans	112	54	58	9	16	45	42
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	7	3	4	2	2	1	2
	60-64 ans	8	4	4	0	1	4	3
	65-69 ans	11	7	4	2	1	5	3
	70-74 ans	14	4	10	1	2	3	8
	50-74 ans	44	21	23	7	6	14	17

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 44 - Région: ALSACE_CHAMPAGNE_ARDENNE_LORRAINE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,9	5,1	4,7	5,6	5,4	4,4	3,8
	55-59 ans	5,0	5,0	5,0	7,4	8,4	4,6	4,4
	60-64 ans	4,7	4,6	4,8	7,6	8,0	4,2	4,4
	65-69 ans	4,9	4,9	4,9	7,9	7,9	4,6	4,6
	70-74 ans	5,9	5,6	6,1	10,3	10,1	5,1	5,7
	50-74 ans	5,0	5,0	5,1	6,6	6,7	4,6	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,6	2,0	2,1	1,0	0,9
	55-59 ans	1,5	1,4	1,6	3,2	4,1	1,1	1,2
	60-64 ans	1,3	1,3	1,4	3,4	3,8	1,0	1,1
	65-69 ans	1,3	1,4	1,3	3,7	3,5	1,1	1,1
	70-74 ans	1,7	1,5	1,7	5,5	4,5	1,1	1,5
	50-74 ans	1,5	1,4	1,5	2,7	2,9	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,4	68,6	66,3	63,5	61,0	77,7	75,7
	55-59 ans	69,5	71,4	67,8	56,5	51,5	75,6	72,8
	60-64 ans	71,9	72,0	71,8	55,6	53,0	76,4	76,1
	65-69 ans	72,7	72,5	72,9	53,2	55,1	76,4	76,3
	70-74 ans	71,9	72,6	71,3	46,2	54,8	77,9	74,1
	50-74 ans	70,5	71,3	69,9	58,6	57,0	76,6	74,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,9	1,4	2,0	1,5	1,7	1,2
	55-59 ans	1,8	2,1	1,5	2,7	1,7	2,0	1,4
	60-64 ans	1,9	2,3	1,5	2,7	2,1	2,2	1,4
	65-69 ans	2,0	2,4	1,7	3,0	2,1	2,3	1,6
	70-74 ans	2,3	2,8	1,9	3,8	2,3	2,7	1,9
	50-74 ans	1,9	2,3	1,6	2,4	1,7	2,2	1,5
50-74 ans **	1,9	2,2	1,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,6	98,6	98,7	99,2	98,4	97,8
	55-59 ans	97,8	97,6	98,0	96,9	98,4	97,7	97,9
	60-64 ans	98,3	98,1	98,4	99,5	99,3	97,9	98,3
	65-69 ans	97,5	97,6	97,4	96,7	96,9	97,7	97,5
	70-74 ans	96,7	96,4	97,1	96,4	97,5	96,4	97,1

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	97,8	97,7	98,0	98,1	98,7	97,6	97,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,1	90,0	90,2	88,8	89,8	91,8	90,8
	55-59 ans	92,7	92,0	93,5	86,5	91,3	93,2	93,9
	60-64 ans	94,3	93,2	95,7	91,8	91,0	93,5	96,5
	65-69 ans	93,6	93,1	94,4	88,1	82,8	93,8	96,0
	70-74 ans	91,1	92,0	90,0	94,3	87,2	91,7	90,4
	50-74 ans	92,5	92,1	92,9	89,3	89,3	93,0	94,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,5	95,6	95,4	96,2	96,0	94,5	94,6
	55-59 ans	94,7	94,6	94,9	92,5	91,4	95,0	95,5
	60-64 ans	94,5	94,2	94,8	89,9	90,9	95,0	95,5
	65-69 ans	93,6	93,1	94,2	90,4	94,8	93,5	94,1
	70-74 ans	93,8	93,3	94,3	94,0	92,6	93,2	94,5
	50-74 ans	94,4	94,2	94,7	93,9	94,2	94,3	94,9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)