

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 93 - Région:PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	87 747	41 243	46 504	25 581	28 684	15 662	17 820
	55-59 ans	77 205	35 007	42 198	7 895	8 957	27 112	33 241
	60-64 ans	90 980	40 675	50 305	8 043	9 053	32 632	41 252
	65-69 ans	83 464	37 586	45 878	5 852	6 910	31 734	38 968
	70-74 ans	66 986	30 461	36 525	4 021	4 741	26 440	31 784
	<b>50-74 ans</b>	<b>406 382</b>	<b>184 972</b>	<b>221 410</b>	<b>51 392</b>	<b>58 345</b>	<b>133 580</b>	<b>163 065</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 328	1 590	1 738	1 213	1 320	377	418
	55-59 ans	2 947	1 400	1 547	706	713	694	834
	60-64 ans	3 186	1 469	1 717	693	714	776	1 003
	65-69 ans	2 954	1 301	1 653	533	632	768	1 021
	70-74 ans	3 040	1 290	1 750	452	610	838	1 140
	<b>50-74 ans</b>	<b>15 455</b>	<b>7 050</b>	<b>8 405</b>	<b>3 597</b>	<b>3 989</b>	<b>3 453</b>	<b>4 416</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 588	773	815	517	537	256	278
	55-59 ans	1 496	700	796	210	219	490	577
	60-64 ans	1 732	776	956	225	233	551	723
	65-69 ans	1 713	751	962	205	221	546	741
	70-74 ans	1 794	776	1 018	152	213	624	805
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 323</b>	<b>3 776</b>	<b>4 547</b>	<b>1 309</b>	<b>1 423</b>	<b>2 467</b>	<b>3 124</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 740	817	923	696	783	121	140
	55-59 ans	1 451	700	751	496	494	204	257
	60-64 ans	1 454	693	761	468	481	225	280
	65-69 ans	1 241	550	691	328	411	222	280
	70-74 ans	1 246	514	732	300	397	214	335
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 132</b>	<b>3 274</b>	<b>3 858</b>	<b>2 288</b>	<b>2 566</b>	<b>986</b>	<b>1 292</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	86 007	40 426	45 581	24 885	27 901	15 541	17 680
	55-59 ans	75 754	34 307	41 447	7 399	8 463	26 908	32 984
	60-64 ans	89 526	39 982	49 544	7 575	8 572	32 407	40 972
	65-69 ans	82 223	37 036	45 187	5 524	6 499	31 512	38 688
	70-74 ans	65 740	29 947	35 793	3 721	4 344	26 226	31 449
	<b>50-74 ans</b>	<b>399 250</b>	<b>181 698</b>	<b>217 552</b>	<b>49 104</b>	<b>55 779</b>	<b>132 594</b>	<b>161 773</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 462	771	691	528	441	243	250
	55-59 ans	1 491	769	722	246	197	523	525
	60-64 ans	2 047	1 009	1 038	260	262	749	776

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 93 - Région:PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2 040	1 008	1 032	214	224	794	808
	70-74 ans	1 836	862	974	165	168	697	806
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 876</b>	<b>4 419</b>	<b>4 457</b>	<b>1 413</b>	<b>1 292</b>	<b>3 006</b>	<b>3 165</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 448	766	682	527	434	239	248
	55-59 ans	1 467	760	707	244	190	516	517
	60-64 ans	2 023	999	1 024	254	258	745	766
	65-69 ans	2 010	991	1 019	212	221	779	798
	70-74 ans	1 795	840	955	159	163	681	792
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 743</b>	<b>4 356</b>	<b>4 387</b>	<b>1 396</b>	<b>1 266</b>	<b>2 960</b>	<b>3 121</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 252	662	590	441	369	221	221
	55-59 ans	1 283	665	618	196	155	469	463
	60-64 ans	1 815	897	918	214	220	683	698
	65-69 ans	1 810	892	918	178	192	714	726
	70-74 ans	1 617	754	863	136	148	618	715
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 777</b>	<b>3 870</b>	<b>3 907</b>	<b>1 165</b>	<b>1 084</b>	<b>2 705</b>	<b>2 823</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 169	624	545	413	339	211	206
	55-59 ans	1 159	608	551	176	142	432	409
	60-64 ans	1 678	834	844	198	194	636	650
	65-69 ans	1 642	812	830	155	170	657	660
	70-74 ans	1 468	684	784	123	140	561	644
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 116</b>	<b>3 562</b>	<b>3 554</b>	<b>1 065</b>	<b>985</b>	<b>2 497</b>	<b>2 569</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	7	4	3	0	2	4	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 93 - Région:PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 247	661	586	440	365	221	221
	55-59 ans	1 273	662	611	194	153	468	458
	60-64 ans	1 804	893	911	213	218	680	693
	65-69 ans	1 791	885	906	177	190	708	716
	70-74 ans	1 597	746	851	134	148	612	703
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 712</b>	<b>3 847</b>	<b>3 865</b>	<b>1 158</b>	<b>1 074</b>	<b>2 689</b>	<b>2 791</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	10	3	7	2	2	1	5
	60-64 ans	11	4	7	1	2	3	5
	65-69 ans	19	7	12	1	2	6	10
	70-74 ans	20	8	12	2	0	6	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>32</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	3	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	12	4	8	0	2	4	6
	70-74 ans	16	7	9	2	3	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 93 - Région:PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,8	3,9	3,7	4,7	4,6	2,4	2,3
	55-59 ans	3,8	4,0	3,7	8,9	8,0	2,6	2,5
	60-64 ans	3,5	3,6	3,4	8,6	7,9	2,4	2,4
	65-69 ans	3,5	3,5	3,6	9,1	9,1	2,4	2,6
	70-74 ans	4,5	4,2	4,8	11,2	12,9	3,2	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,0	2,0	2,7	2,7	0,8	0,8
	55-59 ans	1,9	2,0	1,8	6,3	5,5	0,8	0,8
	60-64 ans	1,6	1,7	1,5	5,8	5,3	0,7	0,7
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	5,6	5,9	0,7	0,7
	70-74 ans	1,9	1,7	2,0	7,5	8,4	0,8	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	47,7	48,6	46,9	42,6	40,7	67,9	66,5
	55-59 ans	50,8	50,0	51,5	29,7	30,7	70,6	69,2
	60-64 ans	54,4	52,8	55,7	32,5	32,6	71,0	72,1
	65-69 ans	58,0	57,7	58,2	38,5	35,0	71,1	72,6
	70-74 ans	59,0	60,2	58,2	33,6	34,9	74,5	70,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>53,9</b>	<b>53,6</b>	<b>54,1</b>	<b>36,4</b>	<b>35,7</b>	<b>71,4</b>	<b>70,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	2,1	1,6	1,6	1,4
	55-59 ans	2,0	2,2	1,7	3,3	2,3	1,9	1,6
	60-64 ans	2,3	2,5	2,1	3,4	3,1	2,3	1,9
	65-69 ans	2,5	2,7	2,3	3,9	3,4	2,5	2,1
	70-74 ans	2,8	2,9	2,7	4,4	3,9	2,7	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	99,4	98,7	99,8	98,4	98,4	99,2
	55-59 ans	98,4	98,8	97,9	99,2	96,4	98,7	98,5
	60-64 ans	98,8	99,0	98,7	97,7	98,5	99,5	98,7
	65-69 ans	98,5	98,3	98,7	99,1	98,7	98,1	98,8
	70-74 ans	97,8	97,4	98,0	96,4	97,0	97,7	98,3

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,6</b>	<b>98,4</b>	<b>98,8</b>	<b>98,0</b>	<b>98,5</b>	<b>98,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,5	86,4	86,5	83,7	85,0	92,5	89,1
	55-59 ans	87,5	87,5	87,4	80,3	81,6	90,9	89,6
	60-64 ans	89,7	89,8	89,6	84,3	85,3	91,7	91,1
	65-69 ans	90,0	90,0	90,1	84,0	86,9	91,7	91,0
	70-74 ans	90,1	89,8	90,4	85,5	90,8	90,7	90,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,0</b>	<b>88,8</b>	<b>89,1</b>	<b>83,5</b>	<b>85,6</b>	<b>91,4</b>	<b>90,5</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,4	94,3	92,4	93,7	91,9	95,5	93,2
	55-59 ans	90,3	91,4	89,2	89,8	91,6	92,1	88,3
	60-64 ans	92,5	93,0	91,9	92,5	88,2	93,1	93,1
	65-69 ans	90,7	91,0	90,4	87,1	88,5	92,0	90,9
	70-74 ans	90,8	90,7	90,8	90,4	94,6	90,8	90,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,5</b>	<b>92,0</b>	<b>91,0</b>	<b>91,4</b>	<b>90,9</b>	<b>92,3</b>	<b>91,0</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)