

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 13203 | 6091 | 7112 | 3584 | 4091 | 2507 | 3021 |
| | 55-59 ans | 12580 | 5583 | 6997 | 1349 | 1380 | 4234 | 5617 |
| | 60-64 ans | 14386 | 6440 | 7946 | 1461 | 1467 | 4979 | 6479 |
| | 65-69 ans | 12248 | 5563 | 6685 | 1042 | 1166 | 4521 | 5519 |
| | 70-74 ans | 9318 | 4133 | 5185 | 665 | 799 | 3468 | 4386 |
| | 50-74 ans | 61735 | 27810 | 33925 | 8101 | 8903 | 19709 | 25022 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 908 | 446 | 462 | 288 | 302 | 158 | 160 |
| | 55-59 ans | 816 | 365 | 451 | 113 | 130 | 252 | 321 |
| | 60-64 ans | 928 | 439 | 489 | 123 | 127 | 316 | 362 |
| | 65-69 ans | 876 | 411 | 465 | 112 | 126 | 299 | 339 |
| | 70-74 ans | 818 | 372 | 446 | 91 | 99 | 281 | 347 |
| | 50-74 ans | 4346 | 2033 | 2313 | 727 | 784 | 1306 | 1529 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 623 | 321 | 302 | 197 | 178 | 124 | 124 |
| | 55-59 ans | 591 | 283 | 308 | 72 | 73 | 211 | 235 |
| | 60-64 ans | 708 | 346 | 362 | 82 | 79 | 264 | 283 |
| | 65-69 ans | 622 | 301 | 321 | 66 | 72 | 235 | 249 |
| | 70-74 ans | 622 | 289 | 333 | 58 | 61 | 231 | 272 |
| | 50-74 ans | 3166 | 1540 | 1626 | 475 | 463 | 1065 | 1163 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 285 | 125 | 160 | 91 | 124 | 34 | 36 |
| | 55-59 ans | 225 | 82 | 143 | 41 | 57 | 41 | 86 |
| | 60-64 ans | 220 | 93 | 127 | 41 | 48 | 52 | 79 |
| | 65-69 ans | 254 | 110 | 144 | 46 | 54 | 64 | 90 |
| | 70-74 ans | 196 | 83 | 113 | 33 | 38 | 50 | 75 |
| | 50-74 ans | 1180 | 493 | 687 | 252 | 321 | 241 | 366 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 12918 | 5966 | 6952 | 3493 | 3967 | 2473 | 2985 |
| | 55-59 ans | 12355 | 5501 | 6854 | 1308 | 1323 | 4193 | 5531 |
| | 60-64 ans | 14166 | 6347 | 7819 | 1420 | 1419 | 4927 | 6400 |
| | 65-69 ans | 11994 | 5453 | 6541 | 996 | 1112 | 4457 | 5429 |
| | 70-74 ans | 9122 | 4050 | 5072 | 632 | 761 | 3418 | 4311 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 60555 | 27317 | 33238 | 7849 | 8582 | 19468 | 24656 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 243 | 119 | 124 | 75 | 80 | 44 | 44 |
| | 55-59 ans | 257 | 114 | 143 | 41 | 33 | 73 | 110 |
| | 60-64 ans | 357 | 177 | 180 | 53 | 30 | 124 | 150 |
| | 65-69 ans | 308 | 160 | 148 | 37 | 22 | 123 | 126 |
| | 70-74 ans | 241 | 119 | 122 | 22 | 18 | 97 | 104 |
| | 50-74 ans | 1406 | 689 | 717 | 228 | 183 | 461 | 534 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 240 | 117 | 123 | 75 | 79 | 42 | 44 |
| | 55-59 ans | 256 | 114 | 142 | 41 | 33 | 73 | 109 |
| | 60-64 ans | 351 | 175 | 176 | 52 | 29 | 123 | 147 |
| | 65-69 ans | 300 | 156 | 144 | 37 | 21 | 119 | 123 |
| | 70-74 ans | 240 | 119 | 121 | 22 | 18 | 97 | 103 |
| | 50-74 ans | 1387 | 681 | 706 | 227 | 180 | 454 | 526 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 221 | 105 | 116 | 64 | 74 | 41 | 42 |
| | 55-59 ans | 246 | 112 | 134 | 39 | 31 | 73 | 103 |
| | 60-64 ans | 315 | 155 | 160 | 45 | 26 | 110 | 134 |
| | 65-69 ans | 284 | 149 | 135 | 37 | 19 | 112 | 116 |
| | 70-74 ans | 229 | 113 | 116 | 20 | 17 | 93 | 99 |
| | 50-74 ans | 1295 | 634 | 661 | 205 | 167 | 429 | 494 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 212 | 101 | 111 | 60 | 71 | 41 | 40 |
| | 55-59 ans | 241 | 110 | 131 | 37 | 29 | 73 | 102 |
| | 60-64 ans | 301 | 149 | 152 | 45 | 25 | 104 | 127 |
| | 65-69 ans | 262 | 138 | 124 | 33 | 17 | 105 | 107 |
| | 70-74 ans | 217 | 105 | 112 | 18 | 17 | 87 | 95 |
| | 50-74 ans | 1233 | 603 | 630 | 193 | 159 | 410 | 471 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 219 | 105 | 114 | 64 | 73 | 41 | 41 |
| | 55-59 ans | 246 | 112 | 134 | 39 | 31 | 73 | 103 |
| | 60-64 ans | 313 | 154 | 159 | 45 | 26 | 109 | 133 |
| | 65-69 ans | 280 | 147 | 133 | 35 | 18 | 112 | 115 |
| | 70-74 ans | 225 | 111 | 114 | 20 | 17 | 91 | 97 |
| | 50-74 ans | 1283 | 629 | 654 | 203 | 165 | 426 | 489 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|--|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | 50-54 ans | 221 | 105 | 116 | 64 | 74 | 41 | 42 |
| | | 55-59 ans | 246 | 112 | 134 | 39 | 31 | 73 | 103 |
| | | 60-64 ans | 315 | 155 | 160 | 45 | 26 | 110 | 134 |
| | | 65-69 ans | 283 | 148 | 135 | 36 | 19 | 112 | 116 |
| | | 70-74 ans | 228 | 112 | 116 | 20 | 17 | 92 | 99 |
| | | 50-74 ans | 1293 | 632 | 661 | 204 | 167 | 428 | 494 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | 50-54 ans | 222 | 105 | 117 | 64 | 75 | 41 | 42 |
| | | 55-59 ans | 247 | 112 | 135 | 39 | 31 | 73 | 104 |
| | | 60-64 ans | 316 | 156 | 160 | 46 | 26 | 110 | 134 |
| | | 65-69 ans | 285 | 150 | 135 | 37 | 19 | 113 | 116 |
| | | 70-74 ans | 229 | 113 | 116 | 20 | 17 | 93 | 99 |
| | | 50-74 ans | 1299 | 636 | 663 | 206 | 168 | 430 | 495 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | 50-54 ans | 131 | 56 | 75 | 32 | 48 | 24 | 27 |
| | | 55-59 ans | 131 | 44 | 87 | 16 | 19 | 28 | 68 |
| | | 60-64 ans | 154 | 57 | 97 | 17 | 17 | 40 | 80 |
| | | 65-69 ans | 125 | 49 | 76 | 13 | 15 | 36 | 61 |
| | | 70-74 ans | 110 | 43 | 67 | 11 | 10 | 32 | 57 |
| | | 50-74 ans | 651 | 249 | 402 | 89 | 109 | 160 | 293 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | 50-54 ans | 26 | 12 | 14 | 10 | 7 | 2 | 7 |
| | | 55-59 ans | 28 | 14 | 14 | 7 | 1 | 7 | 13 |
| | | 60-64 ans | 24 | 15 | 9 | 4 | 1 | 11 | 8 |
| | | 65-69 ans | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| | | 70-74 ans | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| | | 50-74 ans | 109 | 62 | 47 | 26 | 11 | 36 | 36 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 23 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| | 55-59 ans | 34 | 24 | 10 | 8 | 4 | 16 | 6 |
| | 60-64 ans | 58 | 33 | 25 | 13 | 4 | 20 | 21 |
| | 65-69 ans | 47 | 30 | 17 | 8 | 0 | 22 | 17 |
| | 70-74 ans | 35 | 18 | 17 | 3 | 3 | 15 | 14 |
| | 50-74 ans | 197 | 118 | 79 | 40 | 17 | 78 | 62 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 29 | 17 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 |
| | 55-59 ans | 36 | 20 | 16 | 6 | 4 | 14 | 12 |
| | 60-64 ans | 51 | 36 | 15 | 8 | 2 | 28 | 13 |
| | 65-69 ans | 56 | 40 | 16 | 7 | 1 | 33 | 15 |
| | 70-74 ans | 37 | 23 | 14 | 3 | 1 | 20 | 13 |
| | 50-74 ans | 209 | 136 | 73 | 35 | 17 | 101 | 56 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 19 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| | 65-69 ans | 28 | 15 | 13 | 5 | 2 | 10 | 11 |
| | 70-74 ans | 26 | 16 | 10 | 1 | 1 | 15 | 9 |
| | 50-74 ans | 92 | 54 | 38 | 15 | 9 | 39 | 29 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 65-69 ans | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 16 | 4 | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 52 | 30 | 22 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| | 55-59 ans | 70 | 44 | 26 | 14 | 8 | 30 | 18 |
| | 60-64 ans | 109 | 69 | 40 | 21 | 6 | 48 | 34 |
| | 65-69 ans | 103 | 70 | 33 | 15 | 1 | 55 | 32 |
| | 70-74 ans | 72 | 41 | 31 | 6 | 4 | 35 | 27 |
| | 50-74 ans | 406 | 254 | 152 | 75 | 34 | 179 | 118 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 29 | 17 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 36 | 20 | 16 | 6 | 4 | 14 | 12 |
| | 60-64 ans | 51 | 36 | 15 | 8 | 2 | 28 | 13 |
| | 65-69 ans | 56 | 40 | 16 | 7 | 1 | 33 | 15 |
| | 70-74 ans | 37 | 23 | 14 | 3 | 1 | 20 | 13 |
| | 50-74 ans | 209 | 136 | 73 | 35 | 17 | 101 | 56 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 20 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| | 55-59 ans | 30 | 18 | 12 | 6 | 4 | 12 | 8 |
| | 60-64 ans | 41 | 30 | 11 | 7 | 1 | 23 | 10 |
| | 65-69 ans | 39 | 31 | 8 | 7 | 1 | 24 | 7 |
| | 70-74 ans | 22 | 14 | 8 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| | 50-74 ans | 152 | 104 | 48 | 28 | 13 | 76 | 35 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 26 | 14 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| | 55-59 ans | 36 | 22 | 14 | 7 | 4 | 15 | 10 |
| | 60-64 ans | 52 | 39 | 13 | 10 | 1 | 29 | 12 |
| | 65-69 ans | 50 | 39 | 11 | 9 | 1 | 30 | 10 |
| | 70-74 ans | 31 | 20 | 11 | 2 | 1 | 18 | 10 |
| | 50-74 ans | 195 | 134 | 61 | 36 | 15 | 98 | 46 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 19 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| | 65-69 ans | 28 | 15 | 13 | 5 | 2 | 10 | 11 |
| | 70-74 ans | 26 | 16 | 10 | 1 | 1 | 15 | 9 |
| | 50-74 ans | 92 | 54 | 38 | 15 | 9 | 39 | 29 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| | 65-69 ans | 26 | 13 | 13 | 5 | 2 | 8 | 11 |
| | 70-74 ans | 25 | 15 | 10 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| | 50-74 ans | 85 | 49 | 36 | 14 | 8 | 35 | 28 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| | 65-69 ans | 24 | 13 | 11 | 5 | 1 | 8 | 10 |
| | 70-74 ans | 24 | 15 | 9 | 1 | 1 | 14 | 8 |
| | 50-74 ans | 80 | 48 | 32 | 13 | 7 | 35 | 25 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| | 65-69 ans | 16 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| | 70-74 ans | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| | 50-74 ans | 59 | 36 | 23 | 9 | 7 | 27 | 16 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| | 50-74 ans | 22 | 16 | 6 | 6 | 3 | 10 | 3 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| | 50-74 ans | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| | 65-69 ans | 25 | 13 | 12 | 5 | 2 | 8 | 10 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 24 | 15 | 9 | 1 | 1 | 14 | 8 |
| | 50-74 ans | 82 | 49 | 33 | 14 | 8 | 35 | 25 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 17 | 11 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | 60-64 ans | 30 | 16 | 14 | 6 | 3 | 10 | 11 |
| | 65-69 ans | 14 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| | 70-74 ans | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 77 | 38 | 39 | 21 | 12 | 17 | 27 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 6,9 | 7,3 | 6,5 | 8 | 7,4 | 6,3 | 5,3 |
| | 55-59 ans | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 8,4 | 9,4 | 6 | 5,7 |
| | 60-64 ans | 6,5 | 6,8 | 6,2 | 8,4 | 8,7 | 6,3 | 5,6 |
| | 65-69 ans | 7,2 | 7,4 | 7 | 10,7 | 10,8 | 6,6 | 6,1 |
| | 70-74 ans | 8,8 | 9 | 8,6 | 13,7 | 12,4 | 8,1 | 7,9 |
| | 50-74 ans | 7 | 7,3 | 6,8 | 9 | 8,8 | 6,6 | 6,1 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 3 | 1,4 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 1,5 | 2 | 3 | 4,1 | 1 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 2,8 | 3,3 | 1 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 2,1 | 2 | 2,2 | 4,4 | 4,6 | 1,4 | 1,6 |
| | 70-74 ans | 2,1 | 2 | 2,2 | 5 | 4,8 | 1,4 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 1,8 | 2 | 3,1 | 3,6 | 1,2 | 1,5 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 68,6 | 72 | 65,4 | 68,4 | 58,9 | 78,5 | 77,5 |
| | 55-59 ans | 72,4 | 77,5 | 68,3 | 63,7 | 56,2 | 83,7 | 73,2 |
| | 60-64 ans | 76,3 | 78,8 | 74 | 66,7 | 62,2 | 83,5 | 78,2 |
| | 65-69 ans | 71 | 73,2 | 69 | 58,9 | 57,1 | 78,6 | 73,5 |
| | 70-74 ans | 76 | 77,7 | 74,7 | 63,7 | 61,6 | 82,2 | 78,4 |
| | 50-74 ans | 72,8 | 75,8 | 70,3 | 65,3 | 59,1 | 81,5 | 76,1 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,9 | 2 | 1,8 | 2,1 | 2 | 1,8 | 1,5 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,5 | 1,7 | 2 |
| | 60-64 ans | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,7 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 3,7 | 2 | 2,8 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 2,4 | 2,8 | 2,4 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
| 50-74 ans ** | 2,3 | 2,5 | 2,1 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 98,8 | 98,3 | 99,2 | 100 | 98,8 | 95,5 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,6 | 100 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 99,1 |
| | 60-64 ans | 98,3 | 98,9 | 97,8 | 98,1 | 96,7 | 99,2 | 98 |
| | 65-69 ans | 97,4 | 97,5 | 97,3 | 100 | 95,5 | 96,7 | 97,6 |
| | 70-74 ans | 99,6 | 100 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| | 50-74 ans | 98,6 | 98,8 | 98,5 | 99,6 | 98,4 | 98,5 | 98,5 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 92,1 | 89,7 | 94,3 | 85,3 | 93,7 | 97,6 | 95,5 |
| | 55-59 ans | 96,1 | 98,2 | 94,4 | 95,1 | 93,9 | 100 | 94,5 |
| | 60-64 ans | 89,7 | 88,6 | 90,9 | 86,5 | 89,7 | 89,4 | 91,2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 94,7 | 95,5 | 93,8 | 100 | 90,5 | 94,1 | 94,3 |
| | 70-74 ans | 95,4 | 95 | 95,9 | 90,9 | 94,4 | 95,9 | 96,1 |
| | 50-74 ans | 93,4 | 93,1 | 93,6 | 90,3 | 92,8 | 94,5 | 93,9 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 95,9 | 96,2 | 95,7 | 93,8 | 95,9 | 100 | 95,2 |
| | 55-59 ans | 98 | 98,2 | 97,8 | 94,9 | 93,5 | 100 | 99 |
| | 60-64 ans | 95,6 | 96,1 | 95 | 100 | 96,2 | 94,5 | 94,8 |
| | 65-69 ans | 92,3 | 92,6 | 91,9 | 89,2 | 89,5 | 93,8 | 92,2 |
| | 70-74 ans | 94,8 | 92,9 | 96,6 | 90 | 100 | 93,5 | 96 |
| | 50-74 ans | 95,2 | 95,1 | 95,3 | 94,1 | 95,2 | 95,6 | 95,3 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 55-59 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 60-64 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 65-69 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 70-74 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 50-74 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 84 | 85 | 83 | 82 | 83 | 90 | 82 |
| | 55-59 ans | 85 | 85 | 86 | 90 | 107 | 82 | 79 |
| | 60-64 ans | 84 | 93 | 76 | 84 | 69 | 96 | 77 |
| | 65-69 ans | 70 | 69 | 72 | 62 | 70 | 71 | 72 |
| | 70-74 ans | 83 | 79 | 86 | 81 | 88 | 79 | 86 |
| | 50-74 ans | 81 | 82 | 80 | 80 | 84 | 83 | 78 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 63 (42-96) | 65 (45-97) | 60.5 (39.5-95.5) | 65.5 (44-103) | 63 (41-96) | 64 (48-92) | 57 (35-94) |
| | 55-59 ans | 60 (41-88) | 60.5 (41-85.5) | 59.5 (38-90) | 65 (52-85) | 60 (31-108) | 55 (37-86) | 59 (40-88) |
| | 60-64 ans | 63 (42-96) | 65 (42-110) | 60.5 (42-92) | 65 (45-86) | 58 (38-84) | 66.5 (37-113) | 61 (42-92) |
| | 65-69 ans | 55 (37-77.5) | 58 (39-77) | 49 (35-80) | 58 (36-65) | 48 (35-86) | 57.5 (42.5-78.5) | 52 (35-78.5) |
| | 70-74 ans | 60 (40-96) | 66 (39-98) | 58 (42-81) | 73.5 (40-100) | 54 (36-68) | 61 (37-98) | 59 (44-83) |
| | 50-74 ans | 60 (41-90) | 63 (41-91) | 58 (40-90) | 64 (43-92) | 58 (38-95) | 63 (39-90) | 58 (41-88) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 7 | 9,2 | 4,8 | 14,7 | 6,3 | 0 | 2,3 |
| | 55-59 ans | 2,7 | 1,8 | 3,5 | 4,9 | 3 | 0 | 3,6 |
| | 60-64 ans | 8,4 | 9 | 7,8 | 11,3 | 10 | 8,1 | 7,3 |
| | 65-69 ans | 4,5 | 3,1 | 6,1 | 0 | 9,1 | 4,1 | 5,6 |
| | 70-74 ans | 3,7 | 3,4 | 4,1 | 9,1 | 5,6 | 2,1 | 3,8 |
| | 50-74 ans | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 9,2 | 6,6 | 3,7 | 5,1 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 99,6 | 99,3 | 100 | 97,3 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 99,6 | 99,1 | 100 | 100 | 100 | 98,9 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,8 | 99,7 | 100 | 99,5 | 100 | 99,8 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 59 | 53,3 | 64,1 | 50 | 64 | 58,5 | 64,3 |
| | 55-59 ans | 53 | 39,3 | 64,4 | 41 | 61,3 | 38,4 | 65,4 |
| | 60-64 ans | 48,7 | 36,5 | 60,6 | 37 | 65,4 | 36,4 | 59,7 |
| | 65-69 ans | 43,9 | 32,7 | 56,3 | 35,1 | 78,9 | 31,9 | 52,6 |
| | 70-74 ans | 48 | 38,1 | 57,8 | 55 | 58,8 | 34,4 | 57,6 |
| | 50-74 ans | 50,1 | 39,2 | 60,6 | 43,2 | 64,9 | 37,2 | 59,2 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 11,7 | 11,4 | 12 | 15,6 | 9,3 | 4,9 | 16,7 |
| | 55-59 ans | 11,3 | 12,5 | 10,4 | 17,9 | 3,2 | 9,6 | 12,5 |
| | 60-64 ans | 7,6 | 9,6 | 5,6 | 8,7 | 3,8 | 10 | 6 |
| | 65-69 ans | 5,6 | 8 | 3 | 8,1 | 0 | 8 | 3,4 |
| | 70-74 ans | 6,6 | 8 | 5,2 | 10 | 11,8 | 7,5 | 4 |
| | 50-74 ans | 8,4 | 9,7 | 7,1 | 12,6 | 6,5 | 8,4 | 7,3 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,9 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0 | 0 | 1,8 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,7 | 0,6 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 10,4 | 12,4 | 8,5 | 12,5 | 8 | 12,2 | 9,5 |
| | 55-59 ans | 13,8 | 21,4 | 7,4 | 20,5 | 12,9 | 21,9 | 5,8 |
| | 60-64 ans | 18,4 | 21,2 | 15,6 | 28,3 | 15,4 | 18,2 | 15,7 |
| | 65-69 ans | 16,5 | 20 | 12,6 | 21,6 | 0 | 19,5 | 14,7 |
| | 70-74 ans | 15,3 | 15,9 | 14,7 | 15 | 17,6 | 16,1 | 14,1 |
| | 50-74 ans | 15,2 | 18,6 | 11,9 | 19,4 | 10,1 | 18,1 | 12,5 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 13,1 | 16,2 | 10,3 | 17,2 | 12 | 14,6 | 7,1 |
| | 55-59 ans | 14,6 | 17,9 | 11,9 | 15,4 | 12,9 | 19,2 | 11,5 |
| | 60-64 ans | 16,1 | 23,1 | 9,4 | 17,4 | 7,7 | 25,5 | 9,7 |
| | 65-69 ans | 19,6 | 26,7 | 11,9 | 18,9 | 5,3 | 29,2 | 12,9 |
| | 70-74 ans | 16,2 | 20,4 | 12,1 | 15 | 5,9 | 21,5 | 13,1 |
| | 50-74 ans | 16,1 | 21,4 | 11 | 17 | 10,1 | 23,5 | 11,3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,2 | 3,8 | 2,6 | 4,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 |
| | 55-59 ans | 4,9 | 6,3 | 3,7 | 5,1 | 6,5 | 6,8 | 2,9 |
| | 60-64 ans | 6 | 7,7 | 4,4 | 8,7 | 7,7 | 7,3 | 3,7 |
| | 65-69 ans | 9,8 | 10 | 9,6 | 13,5 | 10,5 | 8,8 | 9,5 |
| | 70-74 ans | 11,4 | 14,2 | 8,6 | 5 | 5,9 | 16,1 | 9,1 |
| | 50-74 ans | 7,1 | 8,5 | 5,7 | 7,3 | 5,4 | 9,1 | 5,9 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1,4 | 0 | 2,6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 0 | 3,2 | 2,7 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 0 | 0 | 0,9 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| | 70-74 ans | 0,4 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 0 | 2,4 | 0,9 | 1,6 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,9 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,4 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0,5 | 0,2 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 4 | 5 | 3,2 | 5,4 | 3,8 | 4,4 | 2,3 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 8 | 3,8 | 10,7 | 6 | 7,2 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 7,7 | 10,9 | 5,1 | 14,8 | 4,2 | 9,7 | 5,3 |
| | 65-69 ans | 8,6 | 12,8 | 5 | 15,1 | 0,9 | 12,3 | 5,9 |
| | 70-74 ans | 7,9 | 10,1 | 6,1 | 9,5 | 5,3 | 10,2 | 6,3 |
| | 50-74 ans | 6,7 | 9,3 | 4,6 | 9,6 | 4 | 9,2 | 4,8 |
| 50-74 ans ** | 6,6 | 8,9 | 4,5 | . | . | . | . | |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,2 | 2,8 | 1,7 | 3,1 | 2,3 | 2,4 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 42 - Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 2,9 | 3,6 | 2,3 | 4,6 | 3 | 3,3 | 2,2 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 5,7 | 1,9 | 5,6 | 1,4 | 5,7 | 2 |
| | 65-69 ans | 4,7 | 7,3 | 2,4 | 7 | 0,9 | 7,4 | 2,8 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 5,7 | 2,8 | 4,7 | 1,3 | 5,9 | 3 |
| | 50-74 ans | 3,5 | 5 | 2,2 | 4,5 | 2 | 5,2 | 2,3 |
| | 50-74 ans ** | 3,4 | 4,7 | 2,2 | . | . | . | . |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 2 | 1,5 | 1,6 | 1 |
| | 55-59 ans | 2,4 | 3,3 | 1,8 | 4,6 | 3 | 2,9 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 2,9 | 4,7 | 1,4 | 4,9 | 0,7 | 4,7 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 3,3 | 5,7 | 1,2 | 7 | 0,9 | 5,4 | 1,3 |
| | 70-74 ans | 2,4 | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 3,8 | 1,6 |
| | 50-74 ans | 2,5 | 3,8 | 1,4 | 3,6 | 1,5 | 3,9 | 1,4 |
| | 50-74 ans ** | 2,5 | 3,6 | 1,5 | . | . | . | . |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 2 | 2,4 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 2,9 | 4 | 2 | 5,4 | 3 | 3,6 | 1,8 |
| | 60-64 ans | 3,7 | 6,1 | 1,7 | 7 | 0,7 | 5,9 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 4,2 | 7,2 | 1,7 | 9 | 0,9 | 6,7 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 3,4 | 4,9 | 2,2 | 3,2 | 1,3 | 5,3 | 2,3 |
| | 50-74 ans | 3,2 | 4,9 | 1,8 | 4,6 | 1,7 | 5 | 1,9 |
| | 50-74 ans ** | 3,2 | 4,6 | 1,9 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 1 | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,9 | 0,9 | 2,8 | 1,4 | 1,6 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 2,3 | 2,8 | 2 | 5 | 1,8 | 2,2 | 2 |
| | 70-74 ans | 2,9 | 4 | 2 | 1,6 | 1,3 | 4,4 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 2 | 1,1 | 1,9 | 1 | 2 | 1,2 |
| | 50-74 ans ** | 3,2 | 1,8 | 1,1 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009