

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Aquitaine - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	25	14	11	12	9	2	2
	55-59 ans	47	23	24	12	15	11	9
	60-64 ans	91	55	36	28	16	27	20
	65-69 ans	90	65	25	24	9	41	16
	70-74 ans	107	68	39	19	8	49	31
	50-74 ans	360	225	135	95	57	130	78
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	6	2	4	0	3	2	1
	55-59 ans	10	6	4	3	1	3	3
	60-64 ans	17	9	8	4	1	5	7
	65-69 ans	16	16	0	7	0	9	0
	70-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
	50-74 ans	61	41	20	16	5	25	15
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	19	12	7	12	6	0	1
	55-59 ans	37	17	20	9	14	8	6
	60-64 ans	74	46	28	24	15	22	13
	65-69 ans	74	49	25	17	9	32	16
	70-74 ans	95	60	35	17	8	43	27
	50-74 ans	299	184	115	79	52	105	63
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	12	6	6	6	5	0	1
	55-59 ans	29	12	17	7	11	5	6
	60-64 ans	51	32	19	15	11	17	8
	65-69 ans	46	30	16	7	7	23	9
	70-74 ans	73	47	26	14	7	33	19
	50-74 ans	211	127	84	49	41	78	43
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	6	1	6	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	2	3	3	0
	60-64 ans	23	14	9	9	4	5	5
	65-69 ans	28	19	9	10	2	9	7
	70-74 ans	22	13	9	3	1	10	8
	50-74 ans	88	57	31	30	11	27	20
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	6	3	3	2	3	1	0
	60-64 ans	12	9	3	5	1	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
 Région Aquitaine - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	14	11	3	3	3	8	0
	70-74 ans	24	16	8	4	4	12	4
	50-74 ans	62	41	21	16	14	25	7
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	9	2	7	0	5	2	2
	60-64 ans	18	11	7	5	4	6	3
	65-69 ans	13	7	6	1	1	6	5
	70-74 ans	21	13	8	6	1	7	7
	50-74 ans	62	34	28	13	11	21	17
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	12	6	6	5	2	1	4
	60-64 ans	12	6	6	3	4	3	2
	65-69 ans	14	10	4	2	1	8	3
	70-74 ans	18	11	7	2	2	9	5
	50-74 ans	61	36	25	15	11	21	14
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	9	6	3	2	2	4	1
	65-69 ans	5	2	3	1	2	1	1
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	26	16	10	5	5	11	5

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Aquitaine - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	24	14,3	36,4	0	33,3	100	50
	55-59 ans	21,3	26,1	16,7	25	6,7	27,3	33,3
	60-64 ans	18,7	16,4	22,2	14,3	6,3	18,5	35
	65-69 ans	17,8	24,6	0	29,2	0	22	0
	70-74 ans	11,2	11,8	10,3	10,5	0	12,2	12,9
	50-74 ans	16,9	18,2	14,8	16,8	8,8	19,2	19,2
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	36,8	50	14,3	50	16,7	0	0
	55-59 ans	21,6	29,4	15	22,2	21,4	37,5	0
	60-64 ans	31,1	30,4	32,1	37,5	26,7	22,7	38,5
	65-69 ans	37,8	38,8	36	58,8	22,2	28,1	43,8
	70-74 ans	23,2	21,7	25,7	17,6	12,5	23,3	29,6
	50-74 ans	29,4	31	27	38	21,2	25,7	31,7
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	63,2	50	85,7	50	83,3	0	100
	55-59 ans	78,4	70,6	85	77,8	78,6	62,5	100
	60-64 ans	68,9	69,6	67,9	62,5	73,3	77,3	61,5
	65-69 ans	62,2	61,2	64	41,2	77,8	71,9	56,3
	70-74 ans	76,8	78,3	74,3	82,4	87,5	76,7	70,4
	50-74 ans	70,6	69	73	62	78,8	74,3	68,3
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	50	33,3	66,7	33,3	60	0	100
	55-59 ans	20,7	25	17,6	28,6	27,3	20	0
	60-64 ans	23,5	28,1	15,8	33,3	9,1	23,5	25
	65-69 ans	30,4	36,7	18,8	42,9	42,9	34,8	0
	70-74 ans	32,9	34	30,8	28,6	57,1	36,4	21,1
	50-74 ans	29,4	32,3	25	32,7	34,1	32,1	16,3
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	8,3	16,7	0	16,7	0	0	0
	55-59 ans	31	16,7	41,2	0	45,5	40	33,3
	60-64 ans	35,3	34,4	36,8	33,3	36,4	35,3	37,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Aquitaine - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	28,3	23,3	37,5	14,3	14,3	26,1	55,6
	70-74 ans	28,8	27,7	30,8	42,9	14,3	21,2	36,8
	50-74 ans	29,4	26,8	33,3	26,5	26,8	26,9	39,5
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	41,7	50	33,3	50	40	0	0
	55-59 ans	41,4	50	35,3	71,4	18,2	20	66,7
	60-64 ans	23,5	18,8	31,6	20	36,4	17,6	25
	65-69 ans	30,4	33,3	25	28,6	14,3	34,8	33,3
	70-74 ans	24,7	23,4	26,9	14,3	28,6	27,3	26,3
	50-74 ans	28,9	28,3	29,8	30,6	26,8	26,9	32,6
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,9	8,3	5,9	0	9,1	20	0
	60-64 ans	17,6	18,8	15,8	13,3	18,2	23,5	12,5
	65-69 ans	10,9	6,7	18,8	14,3	28,6	4,3	11,1
	70-74 ans	13,7	14,9	11,5	14,3	0	15,2	15,8
	50-74 ans	12,3	12,6	11,9	10,2	12,2	14,1	11,6

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire