

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	29 156	13 114	16 042	8 201	9 256	4 913	6 786
	55-59 ans	28 207	12 321	15 886	3 075	2 893	9 246	12 993
	60-64 ans	32 150	14 030	18 120	2 961	3 033	11 069	15 087
	65-69 ans	23 340	10 422	12 918	1 657	1 656	8 765	11 262
	70-74 ans	20 673	8 928	11 745	1 200	1 380	7 728	10 365
	50-74 ans	133 526	58 815	74 711	17 094	18 218	41 721	56 493
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 014	955	1 059	658	657	297	402
	55-59 ans	1 889	859	1 030	274	250	585	780
	60-64 ans	2 201	985	1 216	292	296	693	920
	65-69 ans	1 728	722	1 006	169	191	553	815
	70-74 ans	1 966	753	1 213	154	207	599	1 006
	50-74 ans	9 798	4 274	5 524	1 547	1 601	2 727	3 923
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 627	755	872	498	516	257	356
	55-59 ans	1 557	709	848	197	171	512	677
	60-64 ans	1 850	822	1 028	206	216	616	812
	65-69 ans	1 480	621	859	129	136	492	723
	70-74 ans	1 651	643	1 008	111	143	532	865
	50-74 ans	8 165	3 550	4 615	1 141	1 182	2 409	3 433
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	387	200	187	160	141	40	46
	55-59 ans	332	150	182	77	79	73	103
	60-64 ans	351	163	188	86	80	77	108
	65-69 ans	248	101	147	40	55	61	92
	70-74 ans	315	110	205	43	64	67	141
	50-74 ans	1 633	724	909	406	419	318	490
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	28 769	12 914	15 855	8 041	9 115	4 873	6 740
	55-59 ans	27 875	12 171	15 704	2 998	2 814	9 173	12 890
	60-64 ans	31 799	13 867	17 932	2 875	2 953	10 992	14 979
	65-69 ans	23 092	10 321	12 771	1 617	1 601	8 704	11 170
	70-74 ans	20 358	8 818	11 540	1 157	1 316	7 661	10 224
	50-74 ans	131 893	58 091	73 802	16 688	17 799	41 403	56 003
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	680	350	330	236	205	114	125
	55-59 ans	685	360	325	128	80	232	245
	60-64 ans	804	415	389	115	69	300	320

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	695	364	331	57	45	307	286
	70-74 ans	655	354	301	48	42	306	259
	50-74 ans	3 519	1 843	1 676	584	441	1 259	1 235
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	666	344	322	233	201	111	121
	55-59 ans	671	352	319	123	80	229	239
	60-64 ans	789	408	381	113	68	295	313
	65-69 ans	678	357	321	57	43	300	278
	70-74 ans	634	344	290	47	41	297	249
	50-74 ans	3 438	1 805	1 633	573	433	1 232	1 200
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	626	320	306	221	187	99	119
	55-59 ans	619	330	289	108	68	222	221
	60-64 ans	732	379	353	103	61	276	292
	65-69 ans	632	328	304	53	41	275	263
	70-74 ans	584	317	267	41	37	276	230
	50-74 ans	3 193	1 674	1 519	526	394	1 148	1 125
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	602	310	292	215	175	95	117
	55-59 ans	598	323	275	102	64	221	211
	60-64 ans	704	370	334	99	59	271	275
	65-69 ans	595	304	291	50	40	254	251
	70-74 ans	558	302	256	38	34	264	222
	50-74 ans	3 057	1 609	1 448	504	372	1 105	1 076
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	614	315	299	218	181	97	118
	55-59 ans	608	327	281	107	66	220	215
	60-64 ans	710	373	337	101	60	272	277
	65-69 ans	608	312	296	51	41	261	255
	70-74 ans	571	308	263	41	36	267	227
	50-74 ans	3 111	1 635	1 476	518	384	1 117	1 092
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	12	5	7	3	6	2	1
	55-59 ans	11	3	8	1	2	2	6
	60-64 ans	22	6	16	2	1	4	15
	65-69 ans	24	16	8	2	0	14	8
	70-74 ans	13	9	4	0	1	9	3
	50-74 ans	82	39	43	8	10	31	33
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	6	1	5	0	0	1	5
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	9	3	6	0	0	3	6
	70-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
	50-74 ans	33	11	22	1	1	10	21

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	7,3	6,6	8,0	7,1	6,0	5,9
	55-59 ans	6,7	7,0	6,5	8,9	8,6	6,3	6,0
	60-64 ans	6,8	7,0	6,7	9,9	9,8	6,3	6,1
	65-69 ans	7,4	6,9	7,8	10,2	11,5	6,3	7,2
	70-74 ans	9,5	8,4	10,3	12,8	15,0	7,8	9,7
	50-74 ans	7,3	7,3	7,4	9,0	8,8	6,5	6,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,5	1,2	2,0	1,5	0,8	0,7
	55-59 ans	1,2	1,2	1,1	2,5	2,7	0,8	0,8
	60-64 ans	1,1	1,2	1,0	2,9	2,6	0,7	0,7
	65-69 ans	1,1	1,0	1,1	2,4	3,3	0,7	0,8
	70-74 ans	1,5	1,2	1,7	3,6	4,6	0,9	1,4
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	2,4	2,3	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80,8	79,1	82,3	75,7	78,5	86,5	88,6
	55-59 ans	82,4	82,5	82,3	71,9	68,4	87,5	86,8
	60-64 ans	84,1	83,5	84,5	70,5	73,0	88,9	88,3
	65-69 ans	85,6	86,0	85,4	76,3	71,2	89,0	88,7
	70-74 ans	84,0	85,4	83,1	72,1	69,1	88,8	86,0
	50-74 ans	83,3	83,1	83,5	73,8	73,8	88,3	87,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,7	2,1	2,9	2,2	2,3	1,9
	55-59 ans	2,5	3,0	2,1	4,3	2,8	2,5	1,9
	60-64 ans	2,5	3,0	2,2	4,0	2,3	2,7	2,1
	65-69 ans	3,0	3,5	2,6	3,5	2,8	3,5	2,6
	70-74 ans	3,2	4,0	2,6	4,1	3,2	4,0	2,5
	50-74 ans	2,7	3,2	2,3	3,5	2,5	3,0	2,2
	50-74 ans **	2,7	3,1	2,3
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,9	98,3	97,6	98,7	98,0	97,4	96,8
	55-59 ans	98,0	97,8	98,2	96,1	100,0	98,7	97,6
	60-64 ans	98,1	98,3	97,9	98,3	98,6	98,3	97,8
	65-69 ans	97,6	98,1	97,0	100,0	95,6	97,7	97,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	96,8	97,2	96,3	97,9	97,6	97,1	96,1
	50-74 ans	97,7	97,9	97,4	98,1	98,2	97,9	97,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,0	93,0	95,0	94,8	93,0	89,2	98,3
	55-59 ans	92,3	93,8	90,6	87,8	85,0	96,9	92,5
	60-64 ans	92,8	92,9	92,7	91,2	89,7	93,6	93,3
	65-69 ans	93,2	91,9	94,7	93,0	95,3	91,7	94,6
	70-74 ans	92,1	92,2	92,1	87,2	90,2	92,9	92,4
	50-74 ans	92,9	92,7	93,0	91,8	91,0	93,2	93,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,2	96,9	95,4	97,3	93,6	96,0	98,3
	55-59 ans	96,6	97,9	95,2	94,4	94,1	99,5	95,5
	60-64 ans	96,2	97,6	94,6	96,1	96,7	98,2	94,2
	65-69 ans	94,1	92,7	95,7	94,3	97,6	92,4	95,4
	70-74 ans	95,5	95,3	95,9	92,7	91,9	95,7	96,5
	50-74 ans	95,7	96,1	95,3	95,8	94,4	96,3	95,6

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)