

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	740	386	354	195	189	191	165
	55-59 ans	1 039	589	450	96	58	493	392
	60-64 ans	1 277	760	517	92	53	668	464
	65-69 ans	1 022	546	476	60	46	486	430
	70-74 ans	883	468	415	62	36	406	379
	50-74 ans	4 961	2 749	2 212	505	382	2 244	1 830
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	743	386	357	195	190	191	167
	55-59 ans	1 040	589	451	96	58	493	393
	60-64 ans	1 281	761	520	92	54	669	466
	65-69 ans	1 024	548	476	60	46	488	430
	70-74 ans	887	469	418	63	36	406	382
	50-74 ans	4 975	2 753	2 222	506	384	2 247	1 838
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	390	169	221	83	122	86	99
	55-59 ans	502	235	267	31	35	204	232
	60-64 ans	573	269	304	33	31	236	273
	65-69 ans	439	181	258	24	26	157	232
	70-74 ans	373	154	219	19	21	135	198
	50-74 ans	2 277	1 008	1 269	190	235	818	1 034
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	52	32	20	16	10	16	10
	55-59 ans	77	49	28	11	0	38	28
	60-64 ans	72	45	27	4	2	41	25
	65-69 ans	47	31	16	0	0	31	16
	70-74 ans	39	17	22	3	3	14	19
	50-74 ans	287	174	113	34	15	140	98
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	9	9	0	1	0	8	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	27	19	8	3	1	16	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	90	58	32	28	16	30	16
	55-59 ans	149	103	46	11	6	92	40

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	182	122	60	9	5	113	55
	65-69 ans	161	99	62	12	7	87	55
	70-74 ans	136	90	46	6	1	84	45
	50-74 ans	718	472	246	66	35	406	211
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	127	77	50	40	22	37	28
	55-59 ans	189	126	63	21	7	105	56
	60-64 ans	282	207	75	25	10	182	65
	65-69 ans	228	147	81	11	5	136	76
	70-74 ans	195	120	75	18	6	102	69
	50-74 ans	1 021	677	344	115	50	562	294
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	30	23	7	12	6	11	1
	55-59 ans	55	30	25	11	5	19	20
	60-64 ans	71	55	16	13	3	42	13
	65-69 ans	87	56	31	12	5	44	26
	70-74 ans	85	51	34	10	5	41	29
	50-74 ans	328	215	113	58	24	157	89
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	14	8	6	0	0	8	6
	65-69 ans	7	2	5	0	0	2	5
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	37	20	17	2	0	18	17
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	25	14	11	7	6	7	5
	55-59 ans	33	24	9	6	3	18	6
	60-64 ans	34	19	15	2	1	17	14
	65-69 ans	30	19	11	1	1	18	10
	70-74 ans	30	20	10	3	0	17	10
	50-74 ans	152	96	56	19	11	77	45
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	217	135	82	68	38	67	44
	55-59 ans	338	229	109	32	13	197	96
	60-64 ans	464	329	135	34	15	295	120
	65-69 ans	390	247	143	23	12	224	131
	70-74 ans	331	210	121	24	7	186	114
	50-74 ans	1 740	1 150	590	181	85	969	505
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	127	77	50	40	22	37	28
	55-59 ans	189	126	63	21	7	105	56
	60-64 ans	282	207	75	25	10	182	65
	65-69 ans	228	147	81	11	5	136	76
	70-74 ans	195	120	75	18	6	102	69
	50-74 ans	1 021	677	344	115	50	562	294
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	112	67	45	37	22	30	23
	55-59 ans	161	108	53	20	6	88	47
	60-64 ans	247	185	62	22	7	163	55
	65-69 ans	186	119	67	7	5	112	62
	70-74 ans	168	108	60	16	5	92	55
	50-74 ans	874	587	287	102	45	485	242
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	30	23	7	12	6	11	1
	55-59 ans	55	30	25	11	5	19	20
	60-64 ans	71	55	16	13	3	42	13
	65-69 ans	87	56	31	12	5	44	26
	70-74 ans	85	51	34	10	5	41	29
	50-74 ans	328	215	113	58	24	157	89

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,9	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	99,7
	60-64 ans	99,8	100,0	99,4	100,0	98,1	100,0	99,6
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,9	100,0	99,8	100,0	99,7	100,0	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,5	43,8	61,9	42,6	64,2	45,0	59,3
	55-59 ans	48,3	39,9	59,2	32,3	60,3	41,4	59,0
	60-64 ans	44,7	35,3	58,5	35,9	57,4	35,3	58,6
	65-69 ans	42,9	33,0	54,2	40,0	56,5	32,2	54,0
	70-74 ans	42,1	32,8	52,4	30,2	58,3	33,3	51,8
	50-74 ans	45,8	36,6	57,1	37,5	61,2	36,4	56,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,0	8,3	5,6	8,2	5,3	8,4	6,0
	55-59 ans	7,4	8,3	6,2	11,5	0,0	7,7	7,1
	60-64 ans	5,6	5,9	5,2	4,3	3,7	6,1	5,4
	65-69 ans	4,6	5,7	3,4	0,0	0,0	6,4	3,7
	70-74 ans	4,4	3,6	5,3	4,8	8,3	3,4	5,0
	50-74 ans	5,8	6,3	5,1	6,7	3,9	6,2	5,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,5	0,6	0,5	0,0	0,5	1,2
	55-59 ans	0,5	0,5	0,4	1,0	0,0	0,4	0,5
	60-64 ans	0,7	1,2	0,0	1,1	0,0	1,2	0,0
	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	0,0	2,2	0,4	0,2
	70-74 ans	0,6	0,6	0,5	0,0	0,0	0,7	0,5
	50-74 ans	0,5	0,7	0,4	0,6	0,3	0,7	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,1	15,0	9,0	14,4	8,4	15,7	9,6
	55-59 ans	14,3	17,5	10,2	11,5	10,3	18,7	10,2
	60-64 ans	14,2	16,0	11,5	9,8	9,3	16,9	11,8
	65-69 ans	15,7	18,1	13,0	20,0	15,2	17,8	12,8
	70-74 ans	15,3	19,2	11,0	9,5	2,8	20,7	11,8
	50-74 ans	14,4	17,1	11,1	13,0	9,1	18,1	11,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	17,1	19,9	14,0	20,5	11,6	19,4	16,8
	55-59 ans	18,2	21,4	14,0	21,9	12,1	21,3	14,2
	60-64 ans	22,0	27,2	14,4	27,2	18,5	27,2	13,9
	65-69 ans	22,3	26,8	17,0	18,3	10,9	27,9	17,7
	70-74 ans	22,0	25,6	17,9	28,6	16,7	25,1	18,1
	50-74 ans	20,5	24,6	15,5	22,7	13,0	25,0	16,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,0	6,0	2,0	6,2	3,2	5,8	0,6
	55-59 ans	5,3	5,1	5,5	11,5	8,6	3,9	5,1
	60-64 ans	5,5	7,2	3,1	14,1	5,6	6,3	2,8
	65-69 ans	8,5	10,2	6,5	20,0	10,9	9,0	6,0
	70-74 ans	9,6	10,9	8,1	15,9	13,9	10,1	7,6
	50-74 ans	6,6	7,8	5,1	11,5	6,3	7,0	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,5	0,3	0,5	0,0	0,5	0,6
	55-59 ans	0,5	0,8	0,0	1,0	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	1,1	1,1	1,2	0,0	0,0	1,2	1,3
	65-69 ans	0,7	0,4	1,1	0,0	0,0	0,4	1,2
	70-74 ans	0,9	0,6	1,2	0,0	0,0	0,7	1,3
	50-74 ans	0,7	0,7	0,8	0,4	0,0	0,8	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,4	3,6	3,1	3,6	3,2	3,7	3,0
	55-59 ans	3,2	4,1	2,0	6,3	5,2	3,7	1,5
	60-64 ans	2,7	2,5	2,9	2,2	1,9	2,5	3,0
	65-69 ans	2,9	3,5	2,3	1,7	2,2	3,7	2,3
	70-74 ans	3,4	4,3	2,4	4,8	0,0	4,2	2,6
	50-74 ans	3,1	3,5	2,5	3,8	2,9	3,4	2,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0
	55-59 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
	60-64 ans	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2
	65-69 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,1	0,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	8,8	4,2	8,5	3,9	9,1	4,5
	55-59 ans	8,4	12,8	4,8	13,2	4,8	12,8	4,8
	60-64 ans	9,9	15,6	5,2	13,6	5,5	15,8	5,2
	65-69 ans	11,0	15,5	7,4	14,6	7,4	15,5	7,4
	70-74 ans	11,5	16,3	7,6	22,8	6,1	15,8	7,7
	50-74 ans	9,3	13,8	5,7	11,6	4,8	14,3	5,9
	50-74 ans **	9,3	13,3	5,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	5,0	2,6	5,0	2,3	5,0	2,9
	55-59 ans	4,7	7,1	2,8	8,7	2,6	6,8	2,8
	60-64 ans	6,0	9,8	2,9	10,0	3,7	9,8	2,8
	65-69 ans	6,5	9,2	4,2	7,0	3,1	9,4	4,3
	70-74 ans	6,8	9,3	4,7	17,1	5,2	8,6	4,6
	50-74 ans	5,5	8,1	3,3	7,4	2,8	8,3	3,4
	50-74 ans **	5,4	7,8	3,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,3	2,3	4,6	2,3	4,1	2,3
	55-59 ans	4,0	6,1	2,3	8,3	2,2	5,7	2,4
	60-64 ans	5,3	8,8	2,4	8,8	2,6	8,8	2,4
	65-69 ans	5,3	7,4	3,5	4,4	3,1	7,8	3,5
	70-74 ans	5,8	8,4	3,7	15,2	4,4	7,8	3,7
	50-74 ans	4,7	7,1	2,8	6,6	2,5	7,2	2,8
	50-74 ans **	4,6	6,7	2,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,5	0,4	1,5	0,6	1,5	0,1
	55-59 ans	1,4	1,7	1,1	4,5	1,8	1,2	1,0
	60-64 ans	1,5	2,6	0,6	5,2	1,1	2,3	0,6
	65-69 ans	2,5	3,5	1,6	7,6	3,1	3,1	1,5
	70-74 ans	2,9	4,0	2,1	9,5	4,4	3,5	1,9
	50-74 ans	1,8	2,6	1,1	3,7	1,3	2,3	1,0
	50-74 ans **	1,7	2,4	1,1

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)