

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Bretagne - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | Tous | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome | 50-54 ans | 33 | 22 | 11 | 14 | 9 | 8 | 2 |
| | 55-59 ans | 62 | 44 | 18 | 14 | 6 | 30 | 12 |
| | 60-64 ans | 89 | 57 | 32 | 21 | 8 | 36 | 24 |
| | 65-69 ans | 90 | 52 | 38 | 17 | 4 | 35 | 34 |
| | 70-74 ans | 90 | 54 | 36 | 6 | 6 | 48 | 30 |
| | 50-74 ans | 364 | 229 | 135 | 72 | 33 | 157 | 102 |
| A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| | 65-69 ans | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| | 70-74 ans | 23 | 11 | 12 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| | 50-74 ans | 72 | 44 | 28 | 12 | 6 | 32 | 22 |
| A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus) | 50-54 ans | 30 | 19 | 11 | 12 | 9 | 7 | 2 |
| | 55-59 ans | 50 | 37 | 13 | 10 | 4 | 27 | 9 |
| | 60-64 ans | 72 | 46 | 26 | 19 | 6 | 27 | 20 |
| | 65-69 ans | 73 | 40 | 33 | 14 | 4 | 26 | 29 |
| | 70-74 ans | 67 | 43 | 24 | 5 | 4 | 38 | 20 |
| | 50-74 ans | 292 | 185 | 107 | 60 | 27 | 125 | 80 |
| A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif | 50-54 ans | 18 | 12 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 36 | 26 | 10 | 6 | 3 | 20 | 7 |
| | 60-64 ans | 49 | 35 | 14 | 15 | 5 | 20 | 9 |
| | 65-69 ans | 51 | 27 | 24 | 11 | 4 | 16 | 20 |
| | 70-74 ans | 51 | 34 | 17 | 4 | 4 | 30 | 13 |
| | 50-74 ans | 205 | 134 | 71 | 45 | 21 | 89 | 50 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| | 55-59 ans | 14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| | 60-64 ans | 23 | 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 |
| | 65-69 ans | 22 | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| | 70-74 ans | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| | 50-74 ans | 87 | 51 | 36 | 15 | 6 | 36 | 30 |
| A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| | 60-64 ans | 22 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Bretagne - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | Tous | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 19 | 10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| | 70-74 ans | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 78 | 49 | 29 | 18 | 9 | 31 | 20 |
| A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| | 60-64 ans | 14 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| | 65-69 ans | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| | 70-74 ans | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| | 50-74 ans | 55 | 42 | 13 | 11 | 4 | 31 | 9 |
| A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| | 70-74 ans | 17 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| | 50-74 ans | 47 | 23 | 24 | 8 | 5 | 15 | 19 |
| A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 25 | 20 | 5 | 8 | 3 | 12 | 2 |

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Bretagne - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Tous | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 9,1 | 13,6 | 0 | 14,3 | 0 | 12,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 19,4 | 15,9 | 27,8 | 28,6 | 33,3 | 10 | 25 |
| | 60-64 ans | 19,1 | 19,3 | 18,8 | 9,5 | 25 | 25 | 16,7 |
| | 65-69 ans | 18,9 | 23,1 | 13,2 | 17,6 | 0 | 25,7 | 14,7 |
| | 70-74 ans | 25,6 | 20,4 | 33,3 | 16,7 | 33,3 | 20,8 | 33,3 |
| | 50-74 ans | 19,8 | 19,2 | 20,7 | 16,7 | 18,2 | 20,4 | 21,6 |
| E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu* | 50-54 ans | 40 | 36,8 | 45,5 | 25 | 44,4 | 57,1 | 50 |
| | 55-59 ans | 28 | 29,7 | 23,1 | 40 | 25 | 25,9 | 22,2 |
| | 60-64 ans | 31,9 | 23,9 | 46,2 | 21,1 | 16,7 | 25,9 | 55 |
| | 65-69 ans | 30,1 | 32,5 | 27,3 | 21,4 | 0 | 38,5 | 31 |
| | 70-74 ans | 23,9 | 20,9 | 29,2 | 20 | 0 | 21,1 | 35 |
| | 50-74 ans | 29,8 | 27,6 | 33,6 | 25 | 22,2 | 28,8 | 37,5 |
| E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu* | 50-54 ans | 60 | 63,2 | 54,5 | 75 | 55,6 | 42,9 | 50 |
| | 55-59 ans | 72 | 70,3 | 76,9 | 60 | 75 | 74,1 | 77,8 |
| | 60-64 ans | 68,1 | 76,1 | 53,8 | 78,9 | 83,3 | 74,1 | 45 |
| | 65-69 ans | 69,9 | 67,5 | 72,7 | 78,6 | 100 | 61,5 | 69 |
| | 70-74 ans | 76,1 | 79,1 | 70,8 | 80 | 100 | 78,9 | 65 |
| | 50-74 ans | 70,2 | 72,4 | 66,4 | 75 | 77,8 | 71,2 | 62,5 |
| E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 55,6 | 41,7 | 83,3 | 33,3 | 80 | 66,7 | 100 |
| | 55-59 ans | 38,9 | 42,3 | 30 | 50 | 0 | 40 | 42,9 |
| | 60-64 ans | 44,9 | 42,9 | 50 | 33,3 | 60 | 50 | 44,4 |
| | 65-69 ans | 37,3 | 37 | 37,5 | 54,5 | 50 | 25 | 35 |
| | 70-74 ans | 25,5 | 23,5 | 29,4 | 25 | 0 | 23,3 | 38,5 |
| | 50-74 ans | 38 | 36,6 | 40,8 | 40 | 42,9 | 34,8 | 40 |
| E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 16,7 | 25 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 34,6 | 30 | 33,3 | 33,3 | 35 | 28,6 |
| | 60-64 ans | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 40 | 20 | 20 | 33,3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Bretagne - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Tous | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 21,6 | 25,9 | 16,7 | 0 | 25 | 43,8 | 15 |
| | 70-74 ans | 29,4 | 38,2 | 11,8 | 0 | 25 | 43,3 | 7,7 |
| | 50-74 ans | 26,8 | 31,3 | 18,3 | 24,4 | 19 | 34,8 | 18 |
| E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 11,1 | 8,3 | 16,7 | 11,1 | 20 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 11,1 | 3,8 | 30 | 0 | 66,7 | 5 | 14,3 |
| | 60-64 ans | 18,4 | 20 | 14,3 | 20 | 0 | 20 | 22,2 |
| | 65-69 ans | 29,4 | 22,2 | 37,5 | 27,3 | 0 | 18,8 | 45 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 23,5 | 52,9 | 25 | 50 | 23,3 | 53,8 |
| | 50-74 ans | 22,9 | 17,2 | 33,8 | 17,8 | 23,8 | 16,9 | 38 |
| E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon* | 50-54 ans | 16,7 | 25 | 0 | 22,2 | 0 | 33,3 | 0 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 19,2 | 10 | 16,7 | 0 | 20 | 14,3 |
| | 60-64 ans | 8,2 | 8,6 | 7,1 | 6,7 | 20 | 10 | 0 |
| | 65-69 ans | 11,8 | 14,8 | 8,3 | 18,2 | 25 | 12,5 | 5 |
| | 70-74 ans | 11,8 | 14,7 | 5,9 | 50 | 25 | 10 | 0 |
| | 50-74 ans | 12,2 | 14,9 | 7 | 17,8 | 14,3 | 13,5 | 4 |

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire