

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	28 359	12 939	15 420	7 636	8 320	5 303	7 100
	55-59 ans	25 070	11 002	14 068	2 192	2 576	8 810	11 492
	60-64 ans	31 192	13 838	17 354	2 427	2 805	11 411	14 549
	65-69 ans	19 498	8 981	10 517	1 329	1 435	7 652	9 082
	70-74 ans	18 480	8 091	10 389	1 073	1 434	7 018	8 955
	<b>50-74 ans</b>	<b>122 599</b>	<b>54 851</b>	<b>67 748</b>	<b>14 657</b>	<b>16 570</b>	<b>40 194</b>	<b>51 178</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 185	548	637	350	409	198	228
	55-59 ans	1 095	475	620	152	185	323	435
	60-64 ans	1 223	535	688	142	167	393	521
	65-69 ans	872	409	463	97	109	312	354
	70-74 ans	997	411	586	91	128	320	458
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 372</b>	<b>2 378</b>	<b>2 994</b>	<b>832</b>	<b>998</b>	<b>1 546</b>	<b>1 996</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	822	380	442	214	265	166	177
	55-59 ans	792	351	441	85	111	266	330
	60-64 ans	930	392	538	87	112	305	426
	65-69 ans	661	315	346	63	68	252	278
	70-74 ans	751	302	449	50	88	252	361
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 956</b>	<b>1 740</b>	<b>2 216</b>	<b>499</b>	<b>644</b>	<b>1 241</b>	<b>1 572</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	363	168	195	136	144	32	51
	55-59 ans	303	124	179	67	74	57	105
	60-64 ans	293	143	150	55	55	88	95
	65-69 ans	211	94	117	34	41	60	76
	70-74 ans	246	109	137	41	40	68	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 416</b>	<b>638</b>	<b>778</b>	<b>333</b>	<b>354</b>	<b>305</b>	<b>424</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	27 996	12 771	15 225	7 500	8 176	5 271	7 049
	55-59 ans	24 767	10 878	13 889	2 125	2 502	8 753	11 387
	60-64 ans	30 899	13 695	17 204	2 372	2 750	11 323	14 454
	65-69 ans	19 287	8 887	10 400	1 295	1 394	7 592	9 006
	70-74 ans	18 234	7 982	10 252	1 032	1 394	6 950	8 858
	<b>50-74 ans</b>	<b>121 183</b>	<b>54 213</b>	<b>66 970</b>	<b>14 324</b>	<b>16 216</b>	<b>39 889</b>	<b>50 754</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	435	236	199	136	134	100	65
	55-59 ans	424	232	192	60	41	172	151

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	535	290	245	68	52	222	193
	65-69 ans	394	220	174	43	32	177	142
	70-74 ans	404	220	184	43	29	177	155
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 192</b>	<b>1 198</b>	<b>994</b>	<b>350</b>	<b>288</b>	<b>848</b>	<b>706</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	434	235	199	136	134	99	65
	55-59 ans	419	228	191	58	41	170	150
	60-64 ans	526	285	241	68	51	217	190
	65-69 ans	391	218	173	43	32	175	141
	70-74 ans	398	216	182	43	28	173	154
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 168</b>	<b>1 182</b>	<b>986</b>	<b>348</b>	<b>286</b>	<b>834</b>	<b>700</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	393	212	181	119	121	93	60
	55-59 ans	385	209	176	52	37	157	139
	60-64 ans	492	265	227	63	46	202	181
	65-69 ans	362	203	159	40	27	163	132
	70-74 ans	358	200	158	39	23	161	135
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 990</b>	<b>1 089</b>	<b>901</b>	<b>313</b>	<b>254</b>	<b>776</b>	<b>647</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	376	202	174	110	119	92	55
	55-59 ans	365	200	165	50	33	150	132
	60-64 ans	466	251	215	59	44	192	171
	65-69 ans	335	187	148	34	26	153	122
	70-74 ans	329	183	146	35	23	148	123
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 871</b>	<b>1 023</b>	<b>848</b>	<b>288</b>	<b>245</b>	<b>735</b>	<b>603</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	392	212	180	119	121	93	59
	55-59 ans	380	208	172	52	36	156	136
	60-64 ans	486	264	222	63	46	201	176
	65-69 ans	352	197	155	40	27	157	128
	70-74 ans	345	191	154	36	22	155	132
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 955</b>	<b>1 072</b>	<b>883</b>	<b>310</b>	<b>252</b>	<b>762</b>	<b>631</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	6	1	5	0	0	1	5
	65-69 ans	10	6	4	0	0	6	4
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,2	4,2	4,1	4,6	4,9	3,7	3,2
	55-59 ans	4,4	4,3	4,4	6,9	7,2	3,7	3,8
	60-64 ans	3,9	3,9	4,0	5,9	6,0	3,4	3,6
	65-69 ans	4,5	4,6	4,4	7,3	7,6	4,1	3,9
	70-74 ans	5,4	5,1	5,6	8,5	8,9	4,6	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>5,7</b>	<b>6,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,8	1,7	0,6	0,7
	55-59 ans	1,2	1,1	1,3	3,1	2,9	0,6	0,9
	60-64 ans	0,9	1,0	0,9	2,3	2,0	0,8	0,7
	65-69 ans	1,1	1,0	1,1	2,6	2,9	0,8	0,8
	70-74 ans	1,3	1,3	1,3	3,8	2,8	1,0	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,4	69,3	69,4	61,1	64,8	83,8	77,6
	55-59 ans	72,3	73,9	71,1	55,9	60,0	82,4	75,9
	60-64 ans	76,0	73,3	78,2	61,3	67,1	77,6	81,8
	65-69 ans	75,8	77,0	74,7	64,9	62,4	80,8	78,5
	70-74 ans	75,3	73,5	76,6	54,9	68,8	78,8	78,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,6</b>	<b>73,2</b>	<b>74,0</b>	<b>60,0</b>	<b>64,5</b>	<b>80,3</b>	<b>78,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,3	1,8	1,6	1,9	0,9
	55-59 ans	1,7	2,1	1,4	2,8	1,6	2,0	1,3
	60-64 ans	1,7	2,1	1,4	2,9	1,9	2,0	1,3
	65-69 ans	2,0	2,5	1,7	3,3	2,3	2,3	1,6
	70-74 ans	2,2	2,8	1,8	4,2	2,1	2,5	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	55-59 ans	98,8	98,3	99,5	96,7	100,0	98,8	99,3
	60-64 ans	98,3	98,3	98,4	100,0	98,1	97,7	98,4
	65-69 ans	99,2	99,1	99,4	100,0	100,0	98,9	99,3
	70-74 ans	98,5	98,2	98,9	100,0	96,6	97,7	99,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,7</b>	<b>99,2</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>	<b>98,3</b>	<b>99,2</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,6	90,2	91,0	87,5	90,3	93,9	92,3
	55-59 ans	91,9	91,7	92,1	89,7	90,2	92,4	92,7
	60-64 ans	93,5	93,0	94,2	92,6	90,2	93,1	95,3
	65-69 ans	92,6	93,1	91,9	93,0	84,4	93,1	93,6
	70-74 ans	89,9	92,6	86,8	90,7	82,1	93,1	87,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,8</b>	<b>92,1</b>	<b>91,4</b>	<b>89,9</b>	<b>88,8</b>	<b>93,0</b>	<b>92,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,7	95,3	96,1	92,4	98,3	98,9	91,7
	55-59 ans	94,8	95,7	93,8	96,2	89,2	95,5	95,0
	60-64 ans	94,7	94,7	94,7	93,7	95,7	95,0	94,5
	65-69 ans	92,5	92,1	93,1	85,0	96,3	93,9	92,4
	70-74 ans	91,9	91,5	92,4	89,7	100,0	91,9	91,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,0</b>	<b>93,9</b>	<b>94,1</b>	<b>92,0</b>	<b>96,5</b>	<b>94,7</b>	<b>93,2</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

<sup>\*\*</sup> standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)