

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	83	25	58	23	40	2	18
	55-59 ans	90	36	54	24	17	12	37
	60-64 ans	107	38	69	11	23	27	46
	65-69 ans	80	27	53	8	12	19	41
	70-74 ans	54	23	31	8	9	15	22
	50-74 ans	414	149	265	74	101	75	164
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	89	27	62	25	44	2	18
	55-59 ans	100	39	61	26	19	13	42
	60-64 ans	118	41	77	14	24	27	53
	65-69 ans	86	29	57	10	15	19	42
	70-74 ans	57	24	33	8	10	16	23
	50-74 ans	450	160	290	83	112	77	178
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	15	44	14	30	1	14
	55-59 ans	66	24	42	16	14	8	28
	60-64 ans	71	23	48	7	16	16	32
	65-69 ans	47	14	33	2	6	12	27
	70-74 ans	36	11	25	5	8	6	17
	50-74 ans	279	87	192	44	74	43	118
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	8	5	2	0	6	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	4	3	3	3	1	0
	55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	2	6	0	2	2	4
	65-69 ans	10	4	6	2	1	2	5
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	50-74 ans	36	14	22	6	8	8	14
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	4	6	4	5	0	1
	55-59 ans	11	6	5	5	1	1	4
	60-64 ans	15	5	10	1	3	4	7
	65-69 ans	10	2	8	2	4	0	4
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	51	22	29	13	13	9	16
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	21	9	12	6	5	3	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	5	6	1	1	4	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	11	4	7	3	2	1	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11	4	7	4	1	0	6
	65-69 ans	6	2	4	2	3	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	36	13	23	11	11	2	12
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	8	9	7	8	1	1
	55-59 ans	15	6	9	5	2	1	7
	60-64 ans	23	7	16	1	5	6	11
	65-69 ans	20	6	14	4	5	2	9
	70-74 ans	12	9	3	2	1	7	2
	50-74 ans	87	36	51	19	21	17	30
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	4	6	4	5	0	1
	55-59 ans	11	6	5	5	1	1	4
	60-64 ans	15	5	10	1	3	4	7
	65-69 ans	10	2	8	2	4	0	4
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	51	22	29	13	13	9	16
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	3	5	3	4	0	1
	55-59 ans	8	3	5	3	1	0	4
	60-64 ans	13	5	8	1	2	4	6
	65-69 ans	5	0	5	0	3	0	2
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	37	14	23	8	10	6	13
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	21	9	12	6	5	3	7

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ⁹		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93,3	92,6	93,5	92,0	90,9	100,0	100,0
	55-59 ans	90,0	92,3	88,5	92,3	89,5	92,3	88,1
	60-64 ans	90,7	92,7	89,6	78,6	95,8	100,0	86,8
	65-69 ans	93,0	93,1	93,0	80,0	80,0	100,0	97,6
	70-74 ans	96,4	100,0	93,9	100,0	90,0	100,0	95,7
	50-74 ans	92,2	93,7	91,4	89,2	90,2	98,7	92,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66,3	55,6	71,0	56,0	68,2	50,0	77,8
	55-59 ans	66,0	61,5	68,9	61,5	73,7	61,5	66,7
	60-64 ans	60,2	56,1	62,3	50,0	66,7	59,3	60,4
	65-69 ans	54,7	48,3	57,9	20,0	40,0	63,2	64,3
	70-74 ans	63,2	45,8	75,8	62,5	80,0	37,5	73,9
	50-74 ans	62,0	54,4	66,2	53,0	66,1	55,8	66,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,1	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	5,6
	55-59 ans	2,0	2,6	1,6	3,8	0,0	0,0	2,4
	60-64 ans	4,2	9,8	1,3	7,1	0,0	11,1	1,9
	65-69 ans	3,5	6,9	1,8	0,0	0,0	10,5	2,4
	70-74 ans	3,5	4,2	3,0	0,0	0,0	6,3	4,3
	50-74 ans	2,9	5,0	1,7	2,4	0,0	7,8	2,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,9	14,8	4,8	12,0	6,8	50,0	0,0
	55-59 ans	4,0	0,0	6,6	0,0	5,3	0,0	7,1
	60-64 ans	6,8	4,9	7,8	0,0	8,3	7,4	7,5
	65-69 ans	11,6	13,8	10,5	20,0	6,7	10,5	11,9
	70-74 ans	12,3	16,7	9,1	12,5	10,0	18,8	8,7
	50-74 ans	8,0	8,8	7,6	7,2	7,1	10,4	7,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	11,2	14,8	9,7	16,0	11,4	0,0	5,6
	55-59 ans	11,0	15,4	8,2	19,2	5,3	7,7	9,5
	60-64 ans	12,7	12,2	13,0	7,1	12,5	14,8	13,2
	65-69 ans	11,6	6,9	14,0	20,0	26,7	0,0	9,5
	70-74 ans	8,8	20,8	0,0	12,5	0,0	25,0	0,0
	50-74 ans	11,3	13,8	10,0	15,7	11,6	11,7	9,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	3,7	3,2	4,0	4,5	0,0	0,0
	55-59 ans	4,0	5,1	3,3	3,8	5,3	7,7	2,4
	60-64 ans	4,2	4,9	3,9	7,1	8,3	3,7	1,9
	65-69 ans	7,0	10,3	5,3	20,0	0,0	5,3	7,1
	70-74 ans	5,3	4,2	6,1	12,5	0,0	0,0	8,7
	50-74 ans	4,7	5,6	4,1	7,2	4,5	3,9	3,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	5,6
	55-59 ans	1,0	2,6	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,2	3,4	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,7	1,3	0,3	0,0	0,0	2,6	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	3,7	1,6	4,0	0,0	0,0	5,6
	55-59 ans	1,0	2,6	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0
	60-64 ans	2,5	2,4	2,6	0,0	0,0	3,7	3,8
	65-69 ans	3,5	3,4	3,5	0,0	6,7	5,3	2,4
	70-74 ans	3,5	4,2	3,0	0,0	0,0	6,3	4,3
	50-74 ans	2,4	3,1	2,1	1,2	0,9	5,2	2,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,7	7,4	6,5	8,0	9,1	0,0	0,0
	55-59 ans	11,0	10,3	11,5	11,5	10,5	7,7	11,9
	60-64 ans	9,3	9,8	9,1	28,6	4,2	0,0	11,3
	65-69 ans	7,0	6,9	7,0	20,0	20,0	0,0	2,4
	70-74 ans	3,5	4,2	3,0	0,0	10,0	6,3	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8,0	8,1	7,9	13,3	9,8	2,6	6,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,2	2,1	3,4	2,5	2,3	0,9
	55-59 ans	2,5	3,0	2,2	5,4	1,5	0,9	2,6
	60-64 ans	3,8	3,4	4,0	1,0	4,1	5,4	4,0
	65-69 ans	4,6	3,9	4,9	6,0	7,1	2,3	4,2
	70-74 ans	3,3	6,9	1,3	3,9	1,5	8,9	1,2
	50-74 ans	3,2	3,8	2,9	3,7	3,0	4,0	2,9
	50-74 ans **	3,3	3,8	2,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	1,9	1,6	0,0	0,9
	55-59 ans	1,8	3,0	1,2	5,4	0,8	0,9	1,5
	60-64 ans	2,5	2,4	2,5	1,0	2,5	3,6	2,5
	65-69 ans	2,3	1,3	2,8	3,0	5,6	0,0	1,9
	70-74 ans	1,4	3,9	0,0	2,0	0,0	5,1	0,0
	50-74 ans	1,9	2,3	1,7	2,5	1,8	2,1	1,5
	50-74 ans **	2,0	2,4	1,6
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,2	1,2	1,4	1,2	0,0	0,9
	55-59 ans	1,3	1,5	1,2	3,2	0,8	0,0	1,5
	60-64 ans	2,1	2,4	2,0	1,0	1,6	3,6	2,2
	65-69 ans	1,1	0,0	1,8	0,0	4,2	0,0	0,9
	70-74 ans	0,8	2,3	0,0	2,0	0,0	2,5	0,0
	50-74 ans	1,4	1,5	1,3	1,6	1,4	1,4	1,3
	50-74 ans **	1,4	1,5	1,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	1,0	0,5	1,1	0,8	0,9	0,4
	60-64 ans	0,8	1,0	0,8	1,0	1,6	0,9	0,4
	65-69 ans	1,4	2,0	1,1	3,0	0,0	1,1	1,4
	70-74 ans	0,8	0,8	0,9	2,0	0,0	0,0	1,2
	50-74 ans	0,8	1,0	0,7	1,2	0,7	0,7	0,7
	50-74 ans **	0,8	0,9	0,7

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)