

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	35 096	15 794	19 302	9 581	10 973	6 213	8 329
	55-59 ans	32 113	14 047	18 066	3 387	3 883	10 660	14 183
	60-64 ans	34 918	15 257	19 661	3 300	3 769	11 957	15 892
	65-69 ans	24 392	11 073	13 319	1 955	2 255	9 118	11 064
	70-74 ans	18 790	8 281	10 509	1 391	1 738	6 890	8 771
	50-74 ans	145 309	64 452	80 857	19 614	22 618	44 838	58 239
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 507	1 190	1 317	776	844	414	473
	55-59 ans	2 230	988	1 242	296	360	692	882
	60-64 ans	2 370	1 009	1 361	284	348	725	1 013
	65-69 ans	1 830	796	1 034	195	232	601	802
	70-74 ans	1 712	681	1 031	160	224	521	807
	50-74 ans	10 649	4 664	5 985	1 711	2 008	2 953	3 977
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 590	750	840	447	499	303	341
	55-59 ans	1 555	681	874	158	206	523	668
	60-64 ans	1 736	729	1 007	162	205	567	802
	65-69 ans	1 320	571	749	109	143	462	606
	70-74 ans	1 171	477	694	91	108	386	586
	50-74 ans	7 372	3 208	4 164	967	1 161	2 241	3 003
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	917	440	477	329	345	111	132
	55-59 ans	675	307	368	138	154	169	214
	60-64 ans	634	280	354	122	143	158	211
	65-69 ans	510	225	285	86	89	139	196
	70-74 ans	541	204	337	69	116	135	221
	50-74 ans	3 277	1 456	1 821	744	847	712	974
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	34 179	15 354	18 825	9 252	10 628	6 102	8 197
	55-59 ans	31 438	13 740	17 698	3 249	3 729	10 491	13 969
	60-64 ans	34 284	14 977	19 307	3 178	3 626	11 799	15 681
	65-69 ans	23 882	10 848	13 034	1 869	2 166	8 979	10 868
	70-74 ans	18 249	8 077	10 172	1 322	1 622	6 755	8 550
	50-74 ans	142 032	62 996	79 036	18 870	21 771	44 126	57 265
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	989	518	471	324	271	194	200
	55-59 ans	1 001	515	486	154	132	361	354
	60-64 ans	1 199	597	602	172	136	425	466

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	908	491	417	105	85	386	332
	70-74 ans	801	387	414	74	66	313	348
	50-74 ans	4 898	2 508	2 390	829	690	1 679	1 700
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	981	516	465	322	268	194	197
	55-59 ans	995	513	482	154	132	359	350
	60-64 ans	1 194	595	599	172	136	423	463
	65-69 ans	896	484	412	102	84	382	328
	70-74 ans	789	377	412	73	66	304	346
	50-74 ans	4 855	2 485	2 370	823	686	1 662	1 684
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	572	286	286	186	159	100	127
	55-59 ans	616	311	305	90	81	221	224
	60-64 ans	721	335	386	100	88	235	298
	65-69 ans	564	291	273	58	56	233	217
	70-74 ans	478	204	274	37	43	167	231
	50-74 ans	2 951	1 427	1 524	471	427	956	1 097
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	530	268	262	173	146	95	116
	55-59 ans	578	292	286	84	79	208	207
	60-64 ans	661	305	356	91	82	214	274
	65-69 ans	527	271	256	53	54	218	202
	70-74 ans	434	185	249	34	37	151	212
	50-74 ans	2 730	1 321	1 409	435	398	886	1 011
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	8	1	5	0	3	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	3	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	570	286	284	186	158	100	126
	55-59 ans	613	309	304	88	80	221	224
	60-64 ans	710	332	378	99	87	233	291
	65-69 ans	558	289	269	58	55	231	214
	70-74 ans	473	201	272	37	43	164	229
	50-74 ans	2 924	1 417	1 507	468	423	949	1 084
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	11	3	8	1	1	2	7
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	27	10	17	3	4	7	13
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	23	12	11	4	3	8	8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	7,5	6,8	8,1	7,7	6,7	5,7
	55-59 ans	6,9	7,0	6,9	8,7	9,3	6,5	6,2
	60-64 ans	6,8	6,6	6,9	8,6	9,2	6,1	6,4
	65-69 ans	7,5	7,2	7,8	10,0	10,3	6,6	7,2
	70-74 ans	9,1	8,2	9,8	11,5	12,9	7,6	9,2
	50-74 ans	7,3	7,2	7,4	8,7	8,9	6,6	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,6	2,8	2,5	3,4	3,1	1,8	1,6
	55-59 ans	2,1	2,2	2,0	4,1	4,0	1,6	1,5
	60-64 ans	1,8	1,8	1,8	3,7	3,8	1,3	1,3
	65-69 ans	2,1	2,0	2,1	4,4	3,9	1,5	1,8
	70-74 ans	2,9	2,5	3,2	5,0	6,7	2,0	2,5
	50-74 ans	2,3	2,3	2,3	3,8	3,7	1,6	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,4	63,0	63,8	57,6	59,1	73,2	72,1
	55-59 ans	69,7	68,9	70,4	53,4	57,2	75,6	75,7
	60-64 ans	73,2	72,2	74,0	57,0	58,9	78,2	79,2
	65-69 ans	72,1	71,7	72,4	55,9	61,6	76,9	75,6
	70-74 ans	68,4	70,0	67,3	56,9	48,2	74,1	72,6
	50-74 ans	69,2	68,8	69,6	56,5	57,8	75,9	75,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,4	2,5	3,5	2,5	3,2	2,4
	55-59 ans	3,2	3,7	2,7	4,7	3,5	3,4	2,5
	60-64 ans	3,5	4,0	3,1	5,4	3,8	3,6	3,0
	65-69 ans	3,8	4,5	3,2	5,6	3,9	4,3	3,1
	70-74 ans	4,4	4,8	4,1	5,6	4,1	4,6	4,1
	50-74 ans	3,4	4,0	3,0	4,4	3,2	3,8	3,0
50-74 ans **	3,5	4,0	3,0	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,6	98,7	99,4	98,9	100,0	98,5
	55-59 ans	99,4	99,6	99,2	100,0	100,0	99,4	98,9
	60-64 ans	99,6	99,7	99,5	100,0	100,0	99,5	99,4
	65-69 ans	98,7	98,6	98,8	97,1	98,8	99,0	98,8
	70-74 ans	98,5	97,4	99,5	98,6	100,0	97,1	99,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,1	99,1	99,2	99,3	99,4	99,0	99,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	58,3	55,4	61,5	57,8	59,3	51,5	64,5
	55-59 ans	61,9	60,6	63,3	58,4	61,4	61,6	64,0
	60-64 ans	60,4	56,3	64,4	58,1	64,7	55,6	64,4
	65-69 ans	62,9	60,1	66,3	56,9	66,7	61,0	66,2
	70-74 ans	60,6	54,1	66,5	50,7	65,2	54,9	66,8
	50-74 ans	60,8	57,4	64,3	57,2	62,2	57,5	65,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,7	93,7	91,6	93,0	91,8	95,0	91,3
	55-59 ans	93,8	93,9	93,8	93,3	97,5	94,1	92,4
	60-64 ans	91,7	91,0	92,2	91,0	93,2	91,1	91,9
	65-69 ans	93,4	93,1	93,8	91,4	96,4	93,6	93,1
	70-74 ans	90,8	90,7	90,9	91,9	86,0	90,4	91,8
	50-74 ans	92,5	92,6	92,5	92,4	93,2	92,7	92,2

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)