

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	570	284	286	185	159	99	127
	55-59 ans	614	310	304	90	81	220	223
	60-64 ans	716	333	383	98	88	235	295
	65-69 ans	557	288	269	58	56	230	213
	70-74 ans	475	204	271	37	42	167	229
	50-74 ans	2 932	1 419	1 513	468	426	951	1 087
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	576	288	288	187	160	101	128
	55-59 ans	617	311	306	90	81	221	225
	60-64 ans	727	338	389	102	88	236	301
	65-69 ans	568	293	275	58	57	235	218
	70-74 ans	486	209	277	38	44	171	233
	50-74 ans	2 974	1 439	1 535	475	430	964	1 105
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	376	169	207	113	113	56	94
	55-59 ans	375	167	208	38	58	129	150
	60-64 ans	412	145	267	35	59	110	208
	65-69 ans	313	137	176	25	36	112	140
	70-74 ans	252	90	162	18	24	72	138
	50-74 ans	1 728	708	1 020	229	290	479	730
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	18	10	8	8	3	2	5
	55-59 ans	15	8	7	5	1	3	6
	60-64 ans	33	20	13	6	7	14	6
	65-69 ans	15	10	5	3	2	7	3
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	50-74 ans	95	56	39	23	13	33	26
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	49	25	24	13	15	12	9
	55-59 ans	74	49	25	15	5	34	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	73	45	28	14	2	31	26
	65-69 ans	75	43	32	9	8	34	24
	70-74 ans	51	22	29	4	7	18	22
	50-74 ans	322	184	138	55	37	129	101
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	61	39	22	24	11	15	11
	55-59 ans	71	48	23	19	8	29	15
	60-64 ans	107	72	35	23	8	49	27
	65-69 ans	85	51	34	11	6	40	28
	70-74 ans	86	48	38	8	3	40	35
	50-74 ans	410	258	152	85	36	173	116
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	15	10	5	8	4	2	1
	55-59 ans	22	12	10	3	5	9	5
	60-64 ans	35	20	15	11	4	9	11
	65-69 ans	29	22	7	6	3	16	4
	70-74 ans	34	18	16	2	4	16	12
	50-74 ans	135	82	53	30	20	52	33
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	16	9	7	3	4	6	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	32	19	13	11	7	8	6
	55-59 ans	31	14	17	6	1	8	16
	60-64 ans	42	25	17	9	3	16	14
	65-69 ans	26	13	13	2	1	11	12
	70-74 ans	32	16	16	3	4	13	12
	50-74 ans	163	87	76	31	16	56	60
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	3	3	2	2	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	21	10	11	4	4	6	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	111	65	46	37	26	28	20
	55-59 ans	145	97	48	34	13	63	35
	60-64 ans	180	117	63	37	10	80	53
	65-69 ans	161	94	67	20	14	74	53
	70-74 ans	137	70	67	12	10	58	57
	50-74 ans	734	443	291	140	73	303	218
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	61	39	22	24	11	15	11
	55-59 ans	71	48	23	19	8	29	15
	60-64 ans	107	72	35	23	8	49	27
	65-69 ans	85	51	34	11	6	40	28
	70-74 ans	86	48	38	8	3	40	35
	50-74 ans	410	258	152	85	36	173	116
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	49	33	16	21	8	12	8
	55-59 ans	60	46	14	19	6	27	8
	60-64 ans	83	56	27	19	6	37	21
	65-69 ans	70	42	28	8	6	34	22
	70-74 ans	68	38	30	7	2	31	28
	50-74 ans	330	215	115	74	28	141	87
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	15	10	5	8	4	2	1
	55-59 ans	22	12	10	3	5	9	5
	60-64 ans	35	20	15	11	4	9	11
	65-69 ans	29	22	7	6	3	16	4
	70-74 ans	34	18	16	2	4	16	12
	50-74 ans	135	82	53	30	20	52	33

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,3	100,0	99,5	100,0	99,0	100,0
	55-59 ans	99,7	99,7	99,7	100,0	100,0	99,5	99,6
	60-64 ans	99,3	99,4	99,2	98,0	100,0	100,0	99,0
	65-69 ans	98,8	99,0	98,5	100,0	100,0	98,7	98,2
	70-74 ans	99,4	100,0	98,9	100,0	97,7	100,0	99,1
	50-74 ans	99,4	99,4	99,3	99,4	99,8	99,5	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65,3	58,7	71,9	60,4	70,6	55,4	73,4
	55-59 ans	60,8	53,7	68,0	42,2	71,6	58,4	66,7
	60-64 ans	56,7	42,9	68,6	34,3	67,0	46,6	69,1
	65-69 ans	55,1	46,8	64,0	43,1	63,2	47,7	64,2
	70-74 ans	51,9	43,1	58,5	47,4	54,5	42,1	59,2
	50-74 ans	58,1	49,2	66,4	48,2	67,4	49,7	66,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,1	3,5	2,8	4,3	1,9	2,0	3,9
	55-59 ans	2,4	2,6	2,3	5,6	1,2	1,4	2,7
	60-64 ans	4,5	5,9	3,3	5,9	8,0	5,9	2,0
	65-69 ans	2,6	3,4	1,8	5,2	3,5	3,0	1,4
	70-74 ans	2,9	3,8	2,2	2,6	0,0	4,1	2,6
	50-74 ans	3,2	3,9	2,5	4,8	3,0	3,4	2,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,8
	55-59 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	60-64 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	1,1	0,4	0,0
	65-69 ans	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5
	70-74 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
	50-74 ans	0,2	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,5	8,7	8,3	7,0	9,4	11,9	7,0
	55-59 ans	12,0	15,8	8,2	16,7	6,2	15,4	8,9
	60-64 ans	10,0	13,3	7,2	13,7	2,3	13,1	8,6
	65-69 ans	13,2	14,7	11,6	15,5	14,0	14,5	11,0
	70-74 ans	10,5	10,5	10,5	10,5	15,9	10,5	9,4
	50-74 ans	10,8	12,8	9,0	11,6	8,6	13,4	9,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10,6	13,5	7,6	12,8	6,9	14,9	8,6
	55-59 ans	11,5	15,4	7,5	21,1	9,9	13,1	6,7
	60-64 ans	14,7	21,3	9,0	22,5	9,1	20,8	9,0
	65-69 ans	15,0	17,4	12,4	19,0	10,5	17,0	12,8
	70-74 ans	17,7	23,0	13,7	21,1	6,8	23,4	15,0
	50-74 ans	13,8	17,9	9,9	17,9	8,4	17,9	10,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	3,5	1,7	4,3	2,5	2,0	0,8
	55-59 ans	3,6	3,9	3,3	3,3	6,2	4,1	2,2
	60-64 ans	4,8	5,9	3,9	10,8	4,5	3,8	3,7
	65-69 ans	5,1	7,5	2,5	10,3	5,3	6,8	1,8
	70-74 ans	7,0	8,6	5,8	5,3	9,1	9,4	5,2
	50-74 ans	4,5	5,7	3,5	6,3	4,7	5,4	3,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,0	0,7	1,4	0,5	1,9	1,0	0,8
	55-59 ans	0,5	0,3	0,7	0,0	1,2	0,5	0,4
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,9	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0
	70-74 ans	0,4	0,5	0,4	2,6	0,0	0,0	0,4
	50-74 ans	0,5	0,6	0,5	0,6	0,9	0,6	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,6	6,6	4,5	5,9	4,4	7,9	4,7
	55-59 ans	5,0	4,5	5,6	6,7	1,2	3,6	7,1
	60-64 ans	5,8	7,4	4,4	8,8	3,4	6,8	4,7
	65-69 ans	4,6	4,4	4,7	3,4	1,8	4,7	5,5
	70-74 ans	6,6	7,7	5,8	7,9	9,1	7,6	5,2
	50-74 ans	5,5	6,0	5,0	6,5	3,7	5,8	5,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,4	0,0	1,1	0,0	2,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,3	1,0	0,0	1,2	0,5	0,9
	60-64 ans	0,8	0,9	0,8	2,0	2,3	0,4	0,3
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,9	0,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,6	0,0	1,1	0,0	2,3	0,0	0,9
	50-74 ans	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,6	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,2	2,4	4,0	2,4	4,6	2,4
	55-59 ans	4,6	7,1	2,7	10,5	3,5	6,0	2,5
	60-64 ans	5,3	7,8	3,3	11,6	2,8	6,8	3,4
	65-69 ans	6,7	8,7	5,1	10,7	6,5	8,2	4,9
	70-74 ans	7,5	8,7	6,6	9,1	6,2	8,6	6,7
	50-74 ans	5,2	7,0	3,7	7,4	3,4	6,9	3,8
	50-74 ans **	5,3	7,0	3,7
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,5	1,2	2,6	1,0	2,5	1,3
	55-59 ans	2,3	3,5	1,3	5,8	2,1	2,8	1,1
	60-64 ans	3,1	4,8	1,8	7,2	2,2	4,2	1,7
	65-69 ans	3,6	4,7	2,6	5,9	2,8	4,5	2,6
	70-74 ans	4,7	5,9	3,7	6,1	1,8	5,9	4,1
	50-74 ans	2,9	4,1	1,9	4,5	1,7	3,9	2,0
	50-74 ans **	3,0	4,0	1,9
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,1	0,8	2,3	0,8	2,0	1,0
	55-59 ans	1,9	3,3	0,8	5,8	1,6	2,6	0,6
	60-64 ans	2,4	3,7	1,4	6,0	1,7	3,1	1,3
	65-69 ans	2,9	3,9	2,1	4,3	2,8	3,8	2,0
	70-74 ans	3,7	4,7	2,9	5,3	1,2	4,6	3,3
	50-74 ans	2,3	3,4	1,5	3,9	1,3	3,2	1,5
	50-74 ans **	2,4	3,4	1,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,3	0,9	0,4	0,3	0,1
	55-59 ans	0,7	0,9	0,6	0,9	1,3	0,9	0,4
	60-64 ans	1,0	1,3	0,8	3,5	1,1	0,8	0,7
	65-69 ans	1,2	2,0	0,5	3,2	1,4	1,8	0,4
	70-74 ans	1,9	2,2	1,6	1,5	2,5	2,4	1,4
	50-74 ans	1,0	1,3	0,7	1,6	0,9	1,2	0,6
	50-74 ans **	1,0	1,3	0,7

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)