

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	111 305	51 846	59 459	34 257	37 111	17 589	22 348
	55-59 ans	103 074	45 423	57 651	13 370	15 346	32 053	42 305
	60-64 ans	116 458	52 111	64 347	13 809	15 068	38 302	49 279
	65-69 ans	87 240	39 867	47 373	8 385	9 329	31 482	38 044
	70-74 ans	71 326	32 084	39 242	5 995	7 060	26 089	32 182
	<b>50-74 ans</b>	<b>489 403</b>	<b>221 331</b>	<b>268 072</b>	<b>75 816</b>	<b>83 914</b>	<b>145 515</b>	<b>184 158</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	5 237	2 548	2 689	1 874	1 888	674	801
	55-59 ans	4 870	2 183	2 687	940	1 038	1 243	1 649
	60-64 ans	5 897	2 634	3 263	953	1 077	1 681	2 186
	65-69 ans	4 970	2 340	2 630	703	787	1 637	1 843
	70-74 ans	4 692	2 063	2 629	591	721	1 472	1 908
	<b>50-74 ans</b>	<b>25 666</b>	<b>11 768</b>	<b>13 898</b>	<b>5 061</b>	<b>5 511</b>	<b>6 707</b>	<b>8 387</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 691	1 810	1 881	1 273	1 249	537	632
	55-59 ans	3 562	1 608	1 954	618	637	990	1 317
	60-64 ans	4 471	2 007	2 464	621	678	1 386	1 786
	65-69 ans	3 712	1 767	1 945	435	480	1 332	1 465
	70-74 ans	3 525	1 567	1 958	370	437	1 197	1 521
	<b>50-74 ans</b>	<b>18 961</b>	<b>8 759</b>	<b>10 202</b>	<b>3 317</b>	<b>3 481</b>	<b>5 442</b>	<b>6 721</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 546	738	808	601	639	137	169
	55-59 ans	1 308	575	733	322	401	253	332
	60-64 ans	1 426	627	799	332	399	295	400
	65-69 ans	1 258	573	685	268	307	305	378
	70-74 ans	1 167	496	671	221	284	275	387
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 705</b>	<b>3 009</b>	<b>3 696</b>	<b>1 744</b>	<b>2 030</b>	<b>1 265</b>	<b>1 666</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	109 759	51 108	58 651	33 656	36 472	17 452	22 179
	55-59 ans	101 766	44 848	56 918	13 048	14 945	31 800	41 973
	60-64 ans	115 031	51 484	63 547	13 477	14 669	38 007	48 878
	65-69 ans	85 982	39 294	46 688	8 117	9 022	31 177	37 666
	70-74 ans	70 159	31 588	38 571	5 774	6 776	25 814	31 795
	<b>50-74 ans</b>	<b>482 697</b>	<b>218 322</b>	<b>264 375</b>	<b>74 072</b>	<b>81 884</b>	<b>144 250</b>	<b>182 491</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 962	1 061	901	712	548	349	353
	55-59 ans	2 048	1 031	1 017	345	282	686	735
	60-64 ans	2 577	1 282	1 295	413	352	869	943

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2 140	1 079	1 061	276	215	803	846
	70-74 ans	1 837	902	935	209	178	693	757
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 564</b>	<b>5 355</b>	<b>5 209</b>	<b>1 955</b>	<b>1 575</b>	<b>3 400</b>	<b>3 634</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 942	1 054	888	708	542	346	346
	55-59 ans	2 015	1 019	996	343	274	676	722
	60-64 ans	2 525	1 262	1 263	408	346	854	917
	65-69 ans	2 103	1 061	1 042	267	210	794	832
	70-74 ans	1 800	882	918	201	174	681	744
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 385</b>	<b>5 278</b>	<b>5 107</b>	<b>1 927</b>	<b>1 546</b>	<b>3 351</b>	<b>3 561</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 707	939	768	616	461	323	307
	55-59 ans	1 808	918	890	299	229	619	661
	60-64 ans	2 283	1 138	1 145	342	301	796	844
	65-69 ans	1 909	967	942	230	185	737	757
	70-74 ans	1 609	791	818	171	145	620	673
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 316</b>	<b>4 753</b>	<b>4 563</b>	<b>1 658</b>	<b>1 321</b>	<b>3 095</b>	<b>3 242</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 567	875	692	565	412	310	280
	55-59 ans	1 655	849	806	272	201	577	605
	60-64 ans	2 092	1 046	1 046	314	271	732	775
	65-69 ans	1 769	900	869	208	163	692	706
	70-74 ans	1 446	713	733	145	119	568	614
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 529</b>	<b>4 383</b>	<b>4 146</b>	<b>1 504</b>	<b>1 166</b>	<b>2 879</b>	<b>2 980</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	12	6	6	3	0	3	6
	65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
	70-74 ans	9	5	4	3	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	5	3	2	3	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 695	933	762	612	459	321	303
	55-59 ans	1 789	910	879	295	225	615	654
	60-64 ans	2 263	1 131	1 132	341	296	790	836
	65-69 ans	1 876	946	930	225	182	721	748
	70-74 ans	1 569	774	795	163	142	611	653
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 192</b>	<b>4 694</b>	<b>4 498</b>	<b>1 636</b>	<b>1 304</b>	<b>3 058</b>	<b>3 194</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	12	6	6	4	2	2	4
	55-59 ans	19	8	11	4	4	4	7
	60-64 ans	20	7	13	1	5	6	8
	65-69 ans	33	21	12	5	3	16	9
	70-74 ans	40	17	23	8	3	9	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>124</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>48</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	9	3	6	1	2	2	4
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	13	5	8	1	1	4	7
	65-69 ans	12	6	6	3	3	3	3
	70-74 ans	22	9	13	2	2	7	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>25</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	4,9	4,5	5,5	5,1	3,8	3,6
	55-59 ans	4,7	4,8	4,7	7,0	6,8	3,9	3,9
	60-64 ans	5,1	5,1	5,1	6,9	7,1	4,4	4,4
	65-69 ans	5,7	5,9	5,6	8,4	8,4	5,2	4,8
	70-74 ans	6,6	6,4	6,7	9,9	10,2	5,6	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,4	1,4	1,8	1,7	0,8	0,8
	55-59 ans	1,3	1,3	1,3	2,4	2,6	0,8	0,8
	60-64 ans	1,2	1,2	1,2	2,4	2,6	0,8	0,8
	65-69 ans	1,4	1,4	1,4	3,2	3,3	1,0	1,0
	70-74 ans	1,6	1,5	1,7	3,7	4,0	1,1	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,5	71,0	70,0	67,9	66,2	79,7	78,9
	55-59 ans	73,1	73,7	72,7	65,7	61,4	79,6	79,9
	60-64 ans	75,8	76,2	75,5	65,2	63,0	82,5	81,7
	65-69 ans	74,7	75,5	74,0	61,9	61,0	81,4	79,5
	70-74 ans	75,1	76,0	74,5	62,6	60,6	81,3	79,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,9</b>	<b>74,4</b>	<b>73,4</b>	<b>65,5</b>	<b>63,2</b>	<b>81,1</b>	<b>80,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,5	2,1	1,5	2,0	1,6
	55-59 ans	2,0	2,3	1,8	2,6	1,9	2,2	1,8
	60-64 ans	2,2	2,5	2,0	3,1	2,4	2,3	1,9
	65-69 ans	2,5	2,7	2,3	3,4	2,4	2,6	2,2
	70-74 ans	2,6	2,9	2,4	3,6	2,6	2,7	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	99,3	98,6	99,4	98,9	99,1	98,0
	55-59 ans	98,4	98,8	97,9	99,4	97,2	98,5	98,2
	60-64 ans	98,0	98,4	97,5	98,8	98,3	98,3	97,2
	65-69 ans	98,3	98,3	98,2	96,7	97,7	98,9	98,3
	70-74 ans	98,0	97,8	98,2	96,2	97,8	98,3	98,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,3</b>	<b>98,6</b>	<b>98,0</b>	<b>98,6</b>	<b>98,2</b>	<b>98,6</b>	<b>98,0</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,9	89,1	86,5	87,0	85,1	93,4	88,7
	55-59 ans	89,7	90,1	89,4	87,2	83,6	91,6	91,6
	60-64 ans	90,4	90,2	90,7	83,8	87,0	93,2	92,0
	65-69 ans	90,8	91,1	90,4	86,1	88,1	92,8	91,0
	70-74 ans	89,4	89,7	89,1	85,1	83,3	91,0	90,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,7</b>	<b>90,1</b>	<b>89,3</b>	<b>86,0</b>	<b>85,4</b>	<b>92,4</b>	<b>91,0</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,8	93,2	90,1	91,7	89,4	96,0	91,2
	55-59 ans	91,5	92,5	90,6	91,0	87,8	93,2	91,5
	60-64 ans	91,6	91,9	91,4	91,8	90,0	92,0	91,8
	65-69 ans	92,7	93,1	92,3	90,4	88,1	93,9	93,3
	70-74 ans	89,9	90,1	89,6	84,8	82,1	91,6	91,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,6</b>	<b>92,2</b>	<b>90,9</b>	<b>90,7</b>	<b>88,3</b>	<b>93,0</b>	<b>91,9</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)