

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7946	3619	4327	2164	2432	1455	1895
	55-59 ans	7536	3415	4121	822	815	2593	3306
	60-64 ans	8518	3823	4695	726	794	3097	3901
	65-69 ans	6012	2789	3223	483	501	2306	2722
	70-74 ans	5418	2552	2866	383	413	2169	2453
	50-74 ans	35430	16198	19232	4578	4955	11620	14277
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	355	171	184	116	114	55	70
	55-59 ans	363	177	186	84	61	93	125
	60-64 ans	375	190	185	63	56	127	129
	65-69 ans	275	123	152	28	41	95	111
	70-74 ans	309	136	173	41	43	95	130
	50-74 ans	1677	797	880	332	315	465	565
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	271	134	137	89	79	45	58
	55-59 ans	270	121	149	46	47	75	102
	60-64 ans	308	157	151	47	39	110	112
	65-69 ans	229	106	123	21	31	85	92
	70-74 ans	236	110	126	32	32	78	94
	50-74 ans	1314	628	686	235	228	393	458
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	84	37	47	27	35	10	12
	55-59 ans	93	56	37	38	14	18	23
	60-64 ans	67	33	34	16	17	17	17
	65-69 ans	46	17	29	7	10	10	19
	70-74 ans	73	26	47	9	11	17	36
	50-74 ans	363	169	194	97	87	72	107
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7862	3582	4280	2137	2397	1445	1883
	55-59 ans	7443	3359	4084	784	801	2575	3283
	60-64 ans	8451	3790	4661	710	777	3080	3884
	65-69 ans	5966	2772	3194	476	491	2296	2703
	70-74 ans	5345	2526	2819	374	402	2152	2417

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	35067	16029	19038	4481	4868	11548	14170
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	274	158	116	104	73	54	43
	55-59 ans	233	131	102	44	27	87	75
	60-64 ans	276	154	122	41	35	113	87
	65-69 ans	234	134	100	26	16	108	84
	70-74 ans	195	103	92	17	11	86	81
	50-74 ans	1212	680	532	232	162	448	370
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	269	154	115	102	73	52	42
	55-59 ans	222	122	100	39	27	83	73
	60-64 ans	272	153	119	40	34	113	85
	65-69 ans	230	133	97	26	14	107	83
	70-74 ans	190	101	89	16	10	85	79
	50-74 ans	1183	663	520	223	158	440	362
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	246	140	106	93	67	47	39
	55-59 ans	197	107	90	29	23	78	67
	60-64 ans	255	142	113	37	31	105	82
	65-69 ans	210	122	88	22	12	100	76
	70-74 ans	179	97	82	14	10	83	72
	50-74 ans	1087	608	479	195	143	413	336
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	235	134	101	90	65	44	36
	55-59 ans	178	96	82	25	20	71	62
	60-64 ans	235	134	101	34	29	100	72
	65-69 ans	185	108	77	19	8	89	69
	70-74 ans	162	89	73	14	9	75	64
	50-74 ans	995	561	434	182	131	379	303
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	246	140	106	93	67	47	39
	55-59 ans	196	107	89	29	23	78	66
	60-64 ans	255	142	113	37	31	105	82
	65-69 ans	209	122	87	22	12	100	75
	70-74 ans	179	97	82	14	10	83	72
	50-74 ans	1085	608	477	195	143	413	334
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	245	140	105	93	67	47	38

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	196	107	89	29	23	78	66
	60-64 ans	251	142	109	37	31	105	78
	65-69 ans	209	121	88	22	12	99	76
	70-74 ans	178	97	81	14	10	83	71
	50-74 ans	1079	607	472	195	143	412	329
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	248	142	106	94	67	48	39
	55-59 ans	198	107	91	29	23	78	68
	60-64 ans	256	142	114	37	31	105	83
	65-69 ans	210	122	88	22	12	100	76
	70-74 ans	179	97	82	14	10	83	72
	50-74 ans	1091	610	481	196	143	414	338
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	123	59	64	39	43	20	21
	55-59 ans	89	40	49	11	12	29	37
	60-64 ans	116	55	61	8	16	47	45
	65-69 ans	99	44	55	6	4	38	51
	70-74 ans	78	34	44	5	3	29	41
	50-74 ans	505	232	273	69	78	163	195
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	20	14	6	9	5	5	1
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	13	7	6	2	0	5	6
	65-69 ans	11	8	3	1	1	7	2
	70-74 ans	10	5	5	0	2	5	3
	50-74 ans	62	38	24	13	9	25	15
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	33	22	11	12	8	10	3
	55-59 ans	23	11	12	3	4	8	8
	60-64 ans	33	16	17	7	3	9	14
	65-69 ans	34	26	8	8	0	18	8
	70-74 ans	18	13	5	1	0	12	5
	50-74 ans	141	88	53	31	15	57	38
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	46	32	14	25	6	7	8
	55-59 ans	55	38	17	12	5	26	12
	60-64 ans	57	41	16	13	9	28	7
	65-69 ans	43	30	13	5	4	25	9
	70-74 ans	43	28	15	4	1	24	14
	50-74 ans	244	169	75	59	25	110	50
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	8	7	1	1	1	6	0
	60-64 ans	21	14	7	4	2	10	5
	65-69 ans	12	8	4	2	2	6	2
	70-74 ans	17	10	7	4	2	6	5
	50-74 ans	66	43	23	14	9	29	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	21	10	11	2	4	8	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	1	6	0	0	1	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	79	54	25	37	14	17	11
	55-59 ans	78	49	29	15	9	34	20
	60-64 ans	90	57	33	20	12	37	21
	65-69 ans	77	56	21	13	4	43	17
	70-74 ans	61	41	20	5	1	36	19
	50-74 ans	385	257	128	90	40	167	88
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	46	32	14	25	6	7	8
	55-59 ans	55	38	17	12	5	26	12
	60-64 ans	57	41	16	13	9	28	7
	65-69 ans	43	30	13	5	4	25	9
	70-74 ans	43	28	15	4	1	24	14
	50-74 ans	244	169	75	59	25	110	50
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	29	20	9	15	6	5	3
	55-59 ans	45	34	11	10	4	24	7
	60-64 ans	42	33	9	11	5	22	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	33	22	11	4	3	18	8
	70-74 ans	30	18	12	1	0	17	12
	50-74 ans	179	127	52	41	18	86	34
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	8	7	1	1	1	6	0
	60-64 ans	21	14	7	4	2	10	5
	65-69 ans	12	8	4	2	2	6	2
	70-74 ans	17	10	7	4	2	6	5
	50-74 ans	66	43	23	14	9	29	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	7	6	1	0	1	6	0
	60-64 ans	21	14	7	4	2	10	5
	65-69 ans	10	6	4	1	2	5	2
	70-74 ans	16	10	6	4	2	6	4
	50-74 ans	61	39	22	11	9	28	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	0	1	4	0
	60-64 ans	12	9	3	3	1	6	2
	65-69 ans	6	3	3	0	2	3	1
	70-74 ans	11	6	5	1	2	5	3
	50-74 ans	39	24	15	6	8	18	7
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
	50-74 ans	22	15	7	5	1	10	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	18	11	7	3	1	8	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	14	9	5	2	2	7	3
	65-69 ans	9	5	4	1	2	4	2
	70-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
	50-74 ans	37	23	14	6	5	17	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	10	6	8	5	2	1
	55-59 ans	18	11	7	8	2	3	5
	60-64 ans	13	10	3	3	1	7	2
	65-69 ans	11	6	5	4	1	2	4
	70-74 ans	7	3	4	2	0	1	4
	50-74 ans	65	40	25	25	9	15	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,5	4,7	4,3	5,4	4,7	3,8	3,7
	55-59 ans	4,8	5,2	4,5	10,2	7,5	3,6	3,8
	60-64 ans	4,4	5	3,9	8,7	7,1	4,1	3,3
	65-69 ans	4,6	4,4	4,7	5,8	8,2	4,1	4,1
	70-74 ans	5,7	5,3	6	10,7	10,4	4,4	5,3
	50-74 ans	4,7	4,9	4,6	7,3	6,4	4	4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1	1,1	1,2	1,4	0,7	0,6
	55-59 ans	1,2	1,6	0,9	4,6	1,7	0,7	0,7
	60-64 ans	0,8	0,9	0,7	2,2	2,1	0,5	0,4
	65-69 ans	0,8	0,6	0,9	1,4	2	0,4	0,7
	70-74 ans	1,3	1	1,6	2,3	2,7	0,8	1,5
	50-74 ans	1	1	1	2,1	1,8	0,6	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,3	78,4	74,5	76,7	69,3	81,8	82,9
	55-59 ans	74,4	68,4	80,1	54,8	77	80,6	81,6
	60-64 ans	82,1	82,6	81,6	74,6	69,6	86,6	86,8
	65-69 ans	83,3	86,2	80,9	75	75,6	89,5	82,9
	70-74 ans	76,4	80,9	72,8	78	74,4	82,1	72,3
	50-74 ans	78,4	78,8	78	70,8	72,4	84,5	81,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,4	2,7	4,9	3	3,7	2,3
	55-59 ans	3,1	3,9	2,5	5,6	3,4	3,4	2,3
	60-64 ans	3,3	4,1	2,6	5,8	4,5	3,7	2,2
	65-69 ans	3,9	4,8	3,1	5,5	3,3	4,7	3,1
	70-74 ans	3,6	4,1	3,3	4,5	2,7	4	3,4
	50-74 ans	3,5	4,2	2,8	5,2	3,3	3,9	2,6
50-74 ans **	3,5	4,2	2,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	97,5	99,1	98,1	100	96,3	97,7
	55-59 ans	95,3	93,1	98	88,6	100	95,4	97,3
	60-64 ans	98,6	99,4	97,5	97,6	97,1	100	97,7
	65-69 ans	98,3	99,3	97	100	87,5	99,1	98,8
	70-74 ans	97,4	98,1	96,7	94,1	90,9	98,8	97,5
	50-74 ans	97,6	97,5	97,7	96,1	97,5	98,2	97,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,4	90,9	92,2	91,2	91,8	90,4	92,9
	55-59 ans	88,7	87,7	90	74,4	85,2	94	91,8
	60-64 ans	93,8	92,8	95	92,5	91,2	92,9	96,5
	65-69 ans	91,3	91,7	90,7	84,6	85,7	93,5	91,6
	70-74 ans	94,2	96	92,1	87,5	100	97,6	91,1
	50-74 ans	91,9	91,7	92,1	87,4	90,5	93,9	92,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,5	95,7	95,3	96,8	97	93,6	92,3
	55-59 ans	90,4	89,7	91,1	86,2	87	91	92,5
	60-64 ans	92,2	94,4	89,4	91,9	93,5	95,2	87,8
	65-69 ans	88,1	88,5	87,5	86,4	66,7	89	90,8
	70-74 ans	90,5	91,8	89	100	90	90,4	88,9
	50-74 ans	91,5	92,3	90,6	93,3	91,6	91,8	90,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	2	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	118	131	101	129	100	134	104
	55-59 ans	122	119	126	134	126	114	126
	60-64 ans	111	109	114	123	121	103	111
	65-69 ans	104	99	110	121	96	95	112
	70-74 ans	113	107	119	155	140	99	116
	50-74 ans	114	114	114	130	111	106	115
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89 (62-128)	96.5 (64-141)	78 (59-109)	91 (62-139)	84 (62-109)	99 (74-164)	77 (56-109)
	55-59 ans	88 (60.5-129.5)	88 (57-140)	88 (63-125)	80 (49-173)	77 (59-127)	89 (64-133)	88.5 (66-125)
	60-64 ans	83 (62-117)	84 (64-109)	81 (59-128)	73 (67-130)	94 (53-162)	84 (63-109)	80.5 (66-118)
	65-69 ans	84 (63-108)	84 (63.5-105.5)	84.5 (62-112)	85 (72-98)	94.5 (59.5-123.5)	84 (62-106)	84 (62-112)
	70-74 ans	90 (67-113)	88 (59-112)	93 (71-115)	79.5 (55-174)	74 (42-119)	88 (59-112)	94 (75-115)
	50-74 ans	86 (62-119)	86 (62-119)	84 (63-118)	86 (62-139)	84 (57-123)	86.5 (62-115)	85 (65.5-114)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,8	6,3	5,2	7,7	6,8	3,7	2,3
	55-59 ans	7,7	8,4	6,9	18,2	7,4	3,4	6,7
	60-64 ans	4,7	6,5	2,5	7,3	2,9	6,2	2,3
	65-69 ans	4,7	4,5	5	15,4	6,3	1,9	4,8
	70-74 ans	3,6	2,9	4,3	11,8	0	1,2	4,9
	50-74 ans	5,4	5,9	4,7	10,8	5,6	3,3	4,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	97,4
	55-59 ans	99,5	100	98,9	100	100	100	98,5
	60-64 ans	98,4	100	96,5	100	100	100	95,1
	65-69 ans	99,5	99,2	100	100	100	99	100
	70-74 ans	99,4	100	98,8	100	100	100	98,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,3	99,8	98,5	100	100	99,8	97,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,6	41,5	60,4	41,5	64,2	41,7	53,8
	55-59 ans	44,9	37,4	53,8	37,9	52,2	37,2	54,4
	60-64 ans	45,3	38,7	53,5	21,6	51,6	44,8	54,2
	65-69 ans	47,1	36,1	62,5	27,3	33,3	38	67,1
	70-74 ans	43,6	35,1	53,7	35,7	30	34,9	56,9
	50-74 ans	46,3	38	56,8	35,2	54,5	39,4	57,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,1	9,9	5,7	9,6	7,5	10,4	2,6
	55-59 ans	4	3,7	4,4	3,4	4,3	3,8	4,4
	60-64 ans	5,1	4,9	5,3	5,4	0	4,8	7,2
	65-69 ans	5,2	6,6	3,4	4,5	8,3	7	2,6
	70-74 ans	5,6	5,2	6,1	0	20	6	4,2
	50-74 ans	5,7	6,2	5	6,6	6,3	6	4,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	2,1	0	2,1	0	2,1	0
	55-59 ans	1,5	1,9	1,1	0	0	2,6	1,5
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,1	1	1,2	0	0	1,2	1,4
	50-74 ans	0,8	1	0,6	1	0	1	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,3	15,5	10,4	12,8	11,9	20,8	7,7
	55-59 ans	11,6	10,3	13,2	10,3	17,4	10,3	11,8
	60-64 ans	12,9	11,3	14,9	18,9	9,7	8,6	16,9
	65-69 ans	16,2	21,3	9,1	36,4	0	18	10,5
	70-74 ans	10,1	13,4	6,1	7,1	0	14,5	6,9
	50-74 ans	12,9	14,4	11	15,8	10,5	13,8	11,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,5	22,5	13,2	26,6	9	14,6	20,5
	55-59 ans	27,8	35,5	18,7	41,4	21,7	33,3	17,6
	60-64 ans	22,3	28,9	14	35,1	29	26,7	8,4
	65-69 ans	20,5	24,6	14,8	22,7	33,3	25	11,8
	70-74 ans	24	28,9	18,3	28,6	10	28,9	19,4
	50-74 ans	22,4	27,7	15,6	30,1	17,5	26,6	14,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	2,8	3,8	3,2	3	2,1	5,1
	55-59 ans	4	6,5	1,1	3,4	4,3	7,7	0
	60-64 ans	8,2	9,9	6,1	10,8	6,5	9,5	6
	65-69 ans	5,7	6,6	4,5	9,1	16,7	6	2,6
	70-74 ans	9,5	10,3	8,5	28,6	20	7,2	6,9
	50-74 ans	6	7	4,8	7,1	6,3	7	4,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	2,7	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0,5	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	2,1	0,9	1,1	1,5	4,2	0
	55-59 ans	1,5	0,9	2,2	0	0	1,3	2,9
	60-64 ans	1,6	1,4	1,8	2,7	3,2	1	1,2
	65-69 ans	2,9	2,5	3,4	0	8,3	3	2,6
	70-74 ans	2,2	1	3,7	0	10	1,2	2,8
	50-74 ans	1,9	1,6	2,3	1	2,8	1,9	2,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	2,6
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,6	0	3,5	0	0	0	4,8
	65-69 ans	0,5	0,8	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,4
	50-74 ans	0,6	0,2	1,2	0	0	0,2	1,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10	15,1	5,8	17,3	5,8	11,8	5,8
	55-59 ans	10,5	14,6	7,1	19,1	11,2	13,2	6,1
	60-64 ans	10,6	15	7,1	28,2	15,4	12	5,4
	65-69 ans	12,9	20,2	6,6	27,3	8,1	18,7	6,3
	70-74 ans	11,4	16,2	7,1	13,4	2,5	16,7	7,9
	50-74 ans	11	16	6,7	20,1	8,2	14,5	6,2
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	8,9	3,3	11,7	2,5	4,8	4,2
	55-59 ans	7,4	11,3	4,2	15,3	6,2	10,1	3,7
	60-64 ans	6,7	10,8	3,4	18,3	11,6	9,1	1,8
	65-69 ans	7,2	10,8	4,1	10,5	8,1	10,9	3,3
	70-74 ans	8	11,1	5,3	10,7	2,5	11,2	5,8
	50-74 ans	7	10,5	3,9	13,2	5,1	9,5	3,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,6	2,1	7	2,5	3,5	1,6
	55-59 ans	6	10,1	2,7	12,8	5	9,3	2,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	5	8,7	1,9	15,5	6,4	7,1	1
		65-69 ans	5,5	7,9	3,4	8,4	6,1	7,8	3
		70-74 ans	5,6	7,1	4,3	2,7	0	7,9	5
		50-74 ans	5,1	7,9	2,7	9,1	3,7	7,4	2,4
		50-74 ans **	5,2	7,9	2,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	1	1,1	0,9	1,4	0,8	0,7	1,1
		55-59 ans	1,1	2,1	0,2	1,3	1,2	2,3	0
		60-64 ans	2,5	3,7	1,5	5,6	2,6	3,2	1,3
		65-69 ans	2	2,9	1,3	4,2	4,1	2,6	0,7
		70-74 ans	3,2	4	2,5	10,7	5	2,8	2,1
		50-74 ans	1,9	2,7	1,2	3,1	1,8	2,5	1
		50-74 ans **	1,8	2,6	1,2
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	71,4	66,7	75	100	100	0	50
		55-59 ans	71,4	66,7	100	0	100	66,7	0
		60-64 ans	57,1	64,3	42,9	75	50	60	40
		65-69 ans	60	50	75	0	100	60	50
		70-74 ans	68,8	60	83,3	25	100	83,3	75
		50-74 ans	63,9	61,5	68,2	54,5	88,9	64,3	53,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009