

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages Subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 1049        | 447         | 602         | 342               | 416         | 105                    | 186         |
|   | 55-59 ans        | 1135        | 473         | 662         | 191               | 212         | 282                    | 450         |
|   | 60-64 ans        | 1329        | 598         | 731         | 187               | 177         | 411                    | 554         |
|   | 65-69 ans        | 972         | 433         | 539         | 115               | 127         | 318                    | 412         |
|   | 70-74 ans        | 776         | 332         | 444         | 92                | 109         | 240                    | 335         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>5261</b> | <b>2283</b> | <b>2978</b> | <b>927</b>        | <b>1041</b> | <b>1356</b>            | <b>1937</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 52          | 25          | 27          | 19                | 26          | 6                      | 1           |
|   | 55-59 ans        | 53          | 15          | 38          | 9                 | 22          | 6                      | 16          |
|   | 60-64 ans        | 58          | 25          | 33          | 9                 | 7           | 16                     | 26          |
|   | 65-69 ans        | 62          | 25          | 37          | 4                 | 9           | 21                     | 28          |
|   | 70-74 ans        | 61          | 19          | 42          | 5                 | 15          | 14                     | 27          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>286</b>  | <b>109</b>  | <b>177</b>  | <b>46</b>         | <b>79</b>   | <b>63</b>              | <b>98</b>   |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 32          | 16          | 16          | 10                | 15          | 6                      | 1           |
|   | 55-59 ans        | 36          | 10          | 26          | 4                 | 15          | 6                      | 11          |
|   | 60-64 ans        | 35          | 16          | 19          | 5                 | 2           | 11                     | 17          |
|   | 65-69 ans        | 44          | 18          | 26          | 2                 | 6           | 16                     | 20          |
|   | 70-74 ans        | 40          | 12          | 28          | 3                 | 6           | 9                      | 22          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>187</b>  | <b>72</b>   | <b>115</b>  | <b>24</b>         | <b>44</b>   | <b>48</b>              | <b>71</b>   |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 20          | 9           | 11          | 9                 | 11          | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 17          | 5           | 12          | 5                 | 7           | 0                      | 5           |
|   | 60-64 ans        | 23          | 9           | 14          | 4                 | 5           | 5                      | 9           |
|   | 65-69 ans        | 18          | 7           | 11          | 2                 | 3           | 5                      | 8           |
|   | 70-74 ans        | 21          | 7           | 14          | 2                 | 9           | 5                      | 5           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>99</b>   | <b>37</b>   | <b>62</b>   | <b>22</b>         | <b>35</b>   | <b>15</b>              | <b>27</b>   |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 1029        | 438         | 591         | 333               | 405         | 105                    | 186         |
|   | 55-59 ans        | 1118        | 468         | 650         | 186               | 205         | 282                    | 445         |
|   | 60-64 ans        | 1306        | 589         | 717         | 183               | 172         | 406                    | 545         |
|   | 65-69 ans        | 954         | 426         | 528         | 113               | 124         | 313                    | 404         |
|   | 70-74 ans        | 755         | 325         | 430         | 90                | 100         | 235                    | 330         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012   | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages Subséquents |             |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|  |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>5162</b> | <b>2246</b> | <b>2916</b> | <b>905</b>        | <b>1006</b> | <b>1341</b>            | <b>1910</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif   | 50-54 ans        | 29          | 15          | 14          | 10                | 11          | 5                      | 3           |
|  | 55-59 ans        | 23          | 14          | 9           | 5                 | 3           | 9                      | 6           |
|  | 60-64 ans        | 34          | 14          | 20          | 6                 | 8           | 8                      | 12          |
|  | 65-69 ans        | 25          | 10          | 15          | 5                 | 5           | 5                      | 10          |
|  | 70-74 ans        | 19          | 11          | 8           | 2                 | 5           | 9                      | 3           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>130</b>  | <b>64</b>   | <b>66</b>   | <b>28</b>         | <b>32</b>   | <b>36</b>              | <b>34</b>   |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie  | 50-54 ans        | 29          | 15          | 14          | 10                | 11          | 5                      | 3           |
|  | 55-59 ans        | 23          | 14          | 9           | 5                 | 3           | 9                      | 6           |
|  | 60-64 ans        | 33          | 14          | 19          | 6                 | 8           | 8                      | 11          |
|  | 65-69 ans        | 25          | 10          | 15          | 5                 | 5           | 5                      | 10          |
|  | 70-74 ans        | 19          | 11          | 8           | 2                 | 5           | 9                      | 3           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>129</b>  | <b>64</b>   | <b>65</b>   | <b>28</b>         | <b>32</b>   | <b>36</b>              | <b>33</b>   |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie  | 50-54 ans        | 15          | 8           | 7           | 5                 | 6           | 3                      | 1           |
|  | 55-59 ans        | 14          | 9           | 5           | 2                 | 1           | 7                      | 4           |
|  | 60-64 ans        | 18          | 10          | 8           | 5                 | 3           | 5                      | 5           |
|  | 65-69 ans        | 18          | 7           | 11          | 2                 | 3           | 5                      | 8           |
|  | 70-74 ans        | 14          | 9           | 5           | 2                 | 3           | 7                      | 2           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>79</b>   | <b>43</b>   | <b>36</b>   | <b>16</b>         | <b>16</b>   | <b>27</b>              | <b>20</b>   |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète   | 50-54 ans        | 13          | 7           | 6           | 4                 | 5           | 3                      | 1           |
|  | 55-59 ans        | 14          | 9           | 5           | 2                 | 1           | 7                      | 4           |
|  | 60-64 ans        | 15          | 9           | 6           | 4                 | 1           | 5                      | 5           |
|  | 65-69 ans        | 16          | 5           | 11          | 1                 | 3           | 4                      | 8           |
|  | 70-74 ans        | 13          | 8           | 5           | 2                 | 3           | 6                      | 2           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>71</b>   | <b>38</b>   | <b>33</b>   | <b>13</b>         | <b>13</b>   | <b>25</b>              | <b>20</b>   |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|  | 60-64 ans        | 1           | 1           | 0           | 0                 | 0           | 1                      | 0           |
|  | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>1</b>               | <b>0</b>  |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>1</b>               | <b>0</b>  |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)  | 50-54 ans        | 14         | 7         | 7         | 4                 | 6         | 3                      | 1         |
|   | 55-59 ans        | 14         | 9         | 5         | 2                 | 1         | 7                      | 4         |
|   | 60-64 ans        | 18         | 10        | 8         | 5                 | 3         | 5                      | 5         |
|   | 65-69 ans        | 18         | 7         | 11        | 2                 | 3         | 5                      | 8         |
|   | 70-74 ans        | 14         | 9         | 5         | 2                 | 3         | 7                      | 2         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>78</b>  | <b>42</b> | <b>36</b> | <b>15</b>         | <b>16</b> | <b>27</b>              | <b>20</b> |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique  | 50-54 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)  | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu  | 50-54 ans        | 14         | 7         | 7         | 4                 | 6         | 3                      | 1         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|   | 55-59 ans        | 14         | 9         | 5         | 2                 | 1         | 7                      | 4         |
|   | 60-64 ans        | 18         | 10        | 8         | 5                 | 3         | 5                      | 5         |
|   | 65-69 ans        | 18         | 7         | 11        | 2                 | 3         | 5                      | 8         |
|   | 70-74 ans        | 14         | 9         | 5         | 2                 | 3         | 7                      | 2         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>78</b>  | <b>42</b> | <b>36</b> | <b>15</b>         | <b>16</b> | <b>27</b>              | <b>20</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)  | 50-54 ans        | 15         | 8         | 7         | 5                 | 6         | 3                      | 1         |
|   | 55-59 ans        | 14         | 9         | 5         | 2                 | 1         | 7                      | 4         |
|   | 60-64 ans        | 18         | 10        | 8         | 5                 | 3         | 5                      | 5         |
|   | 65-69 ans        | 18         | 7         | 11        | 2                 | 3         | 5                      | 8         |
|   | 70-74 ans        | 14         | 9         | 5         | 2                 | 3         | 7                      | 2         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>79</b>  | <b>43</b> | <b>36</b> | <b>16</b>         | <b>16</b> | <b>27</b>              | <b>20</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal  | 50-54 ans        | 12         | 6         | 6         | 4                 | 5         | 2                      | 1         |
|   | 55-59 ans        | 9          | 5         | 4         | 1                 | 1         | 4                      | 3         |
|   | 60-64 ans        | 11         | 6         | 5         | 2                 | 2         | 4                      | 3         |
|   | 65-69 ans        | 11         | 4         | 7         | 1                 | 2         | 3                      | 5         |
|   | 70-74 ans        | 7          | 3         | 4         | 0                 | 2         | 3                      | 2         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>50</b>  | <b>24</b> | <b>26</b> | <b>8</b>          | <b>12</b> | <b>16</b>              | <b>14</b> |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>1</b>               | <b>1</b>  |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes | Total    |          | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|---|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|   |                  |            | Hommes   | Femmes   | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>1</b> |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   | 50-54 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>   | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>1</b>          | <b>0</b> | <b>1</b>               | <b>0</b> |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   | 50-54 ans        | 1          | 0        | 1        | 0                 | 1        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 2          | 0        | 2        | 0                 | 0        | 0                      | 2        |
|   | 65-69 ans        | 3          | 2        | 1        | 1                 | 0        | 1                      | 1        |
|   | 70-74 ans        | 3          | 3        | 0        | 1                 | 0        | 2                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>9</b>   | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>2</b>          | <b>1</b> | <b>3</b>               | <b>3</b> |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal  | 50-54 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 2          | 2        | 0        | 1                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 2          | 1        | 1        | 0                 | 1        | 1                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>6</b>   | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>2</b>          | <b>1</b> | <b>3</b>               | <b>0</b> |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes | Total    |          | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|---|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|   |                  |            | Hommes   | Femmes   | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)               | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 4          | 3        | 1        | 2                 | 1        | 1                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 2          | 0        | 2        | 0                 | 1        | 0                      | 1        |
|   | 70-74 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>   | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>3</b>          | <b>2</b> | <b>2</b>               | <b>1</b> |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1</b>               | <b>0</b> |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté  | 50-54 ans        | 2          | 1        | 1        | 1                 | 1        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 2          | 0        | 2        | 0                 | 0        | 0                      | 2        |
|   | 65-69 ans        | 4          | 3        | 1        | 1                 | 0        | 2                      | 1        |
|   | 70-74 ans        | 3          | 3        | 0        | 1                 | 0        | 2                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>11</b>  | <b>7</b> | <b>4</b> | <b>3</b>          | <b>1</b> | <b>4</b>               | <b>3</b> |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans        | 1          | 0        | 1        | 0                 | 1        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 2          | 0        | 2        | 0                 | 0        | 0                      | 2        |
|   | 65-69 ans        | 3          | 2        | 1        | 1                 | 0        | 1                      | 1        |
|   | 70-74 ans        | 3          | 3        | 0        | 1                 | 0        | 2                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>9</b>   | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>2</b>          | <b>1</b> | <b>3</b>               | <b>3</b> |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)  | 50-54 ans        | 1          | 0        | 1        | 0                 | 1        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 1          | 0        | 1        | 0                 | 0        | 0                      | 1        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012   | Age              | Tous sexes | Total    |          | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|--|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|  |                  |            | Hommes   | Femmes   | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
|  | 65-69 ans        | 2          | 2        | 0        | 1                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 3          | 3        | 0        | 1                 | 0        | 2                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>7</b>   | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>2</b>          | <b>1</b> | <b>3</b>               | <b>1</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté   | 50-54 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 2          | 2        | 0        | 1                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 2          | 1        | 1        | 0                 | 1        | 1                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>6</b>   | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>2</b>          | <b>1</b> | <b>3</b>               | <b>0</b> |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 2          | 2        | 0        | 1                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 2          | 1        | 1        | 0                 | 1        | 1                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>5</b>   | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>2</b>          | <b>1</b> | <b>2</b>               | <b>0</b> |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu   | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 2          | 1        | 1        | 0                 | 1        | 1                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>   | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>2</b>          | <b>1</b> | <b>1</b>               | <b>0</b> |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)   | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1</b>               | <b>0</b> |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu  | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                             | Age              | Tous sexes | Total    |          | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|--|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|  |                  |            | Hommes   | Femmes   | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ       | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1</b>               | <b>0</b> |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                            | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |          |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
|   |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes   |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                 | 0         | 1                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>1</b>               | <b>0</b> |
| A40- Perdus de vue  | 50-54 ans        | 8          | 4         | 4         | 3                 | 3         | 1                      | 1        |
|   | 55-59 ans        | 6          | 3         | 3         | 2                 | 1         | 1                      | 2        |
|   | 60-64 ans        | 6          | 2         | 4         | 1                 | 3         | 1                      | 1        |
|   | 65-69 ans        | 6          | 2         | 4         | 2                 | 2         | 0                      | 2        |
|   | 70-74 ans        | 3          | 1         | 2         | 0                 | 1         | 1                      | 1        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>29</b>  | <b>12</b> | <b>17</b> | <b>8</b>          | <b>10</b> | <b>4</b>               | <b>7</b> |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)                | 50-54 ans        | 5           | 5,6         | 4,5         | 5,6               | 6,3         | 5,7                    | 0,5         |
|   | 55-59 ans        | 4,7         | 3,2         | 5,7         | 4,7               | 10,4        | 2,1                    | 3,6         |
|   | 60-64 ans        | 4,4         | 4,2         | 4,5         | 4,8               | 4           | 3,9                    | 4,7         |
|   | 65-69 ans        | 6,4         | 5,8         | 6,9         | 3,5               | 7,1         | 6,6                    | 6,8         |
|   | 70-74 ans        | 7,9         | 5,7         | 9,5         | 5,4               | 13,8        | 5,8                    | 8,1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>5,4</b>  | <b>4,8</b>  | <b>5,9</b>  | <b>5</b>          | <b>7,6</b>  | <b>4,6</b>             | <b>5,1</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)        | 50-54 ans        | 1,9         | 2           | 1,8         | 2,6               | 2,6         | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 1,5         | 1,1         | 1,8         | 2,6               | 3,3         | 0                      | 1,1         |
|   | 60-64 ans        | 1,7         | 1,5         | 1,9         | 2,1               | 2,8         | 1,2                    | 1,6         |
|   | 65-69 ans        | 1,9         | 1,6         | 2           | 1,7               | 2,4         | 1,6                    | 1,9         |
|   | 70-74 ans        | 2,7         | 2,1         | 3,2         | 2,2               | 8,3         | 2,1                    | 1,5         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1,9</b>  | <b>1,6</b>  | <b>2,1</b>  | <b>2,4</b>        | <b>3,4</b>  | <b>1,1</b>             | <b>1,4</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                           | 50-54 ans        | 61,5        | 64          | 59,3        | 52,6              | 57,7        | 100                    | 100         |
|   | 55-59 ans        | 67,9        | 66,7        | 68,4        | 44,4              | 68,2        | 100                    | 68,8        |
|   | 60-64 ans        | 60,3        | 64          | 57,6        | 55,6              | 28,6        | 68,8                   | 65,4        |
|   | 65-69 ans        | 71          | 72          | 70,3        | 50                | 66,7        | 76,2                   | 71,4        |
|   | 70-74 ans        | 65,6        | 63,2        | 66,7        | 60                | 64,3        | 64,3                   | 81,5        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>65,4</b> | <b>66,1</b> | <b>65</b>   | <b>52,2</b>       | <b>55,7</b> | <b>76,2</b>            | <b>72,4</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                          | 50-54 ans        | 2,8         | 3,4         | 2,4         | 3                 | 2,7         | 4,8                    | 1,6         |
|   | 55-59 ans        | 2,1         | 3           | 1,4         | 2,7               | 1,5         | 3,2                    | 1,3         |
|   | 60-64 ans        | 2,6         | 2,4         | 2,8         | 3,3               | 4,7         | 2                      | 2,2         |
|   | 65-69 ans        | 2,6         | 2,3         | 2,8         | 4,4               | 4           | 1,6                    | 2,5         |
|   | 70-74 ans        | 2,5         | 3,4         | 1,9         | 2,2               | 5           | 3,8                    | 0,9         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2,5</b>  | <b>2,8</b>  | <b>2,3</b>  | <b>3,1</b>        | <b>3,2</b>  | <b>2,7</b>             | <b>1,8</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>   | <b>2,6</b>       | <b>2,9</b>  | <b>2,2</b>  | .           | .                 | .           | .                      |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                                   | 50-54 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 55-59 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 60-64 ans        | 97,1        | 100         | 95          | 100               | 100         | 100                    | 91,7        |
|   | 65-69 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 70-74 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>99,2</b> | <b>100</b>  | <b>98,5</b> | <b>100</b>        | <b>100</b>  | <b>100</b>             | <b>97,1</b> |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 51,7        | 53,3        | 50          | 50                | 54,5        | 60                     | 33,3        |
|   | 55-59 ans        | 60,9        | 64,3        | 55,6        | 40                | 33,3        | 77,8                   | 66,7        |
|   | 60-64 ans        | 54,5        | 71,4        | 42,1        | 83,3              | 37,5        | 62,5                   | 45,5        |
|   | 65-69 ans        | 72          | 70          | 73,3        | 40                | 60          | 80                     | 80          |
|   | 70-74 ans        | 73,7        | 81,8        | 62,5        | 100               | 60          | 77,8                   | 66,7        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>61,2</b> | <b>67,2</b> | <b>55,4</b> | <b>57,1</b>       | <b>50</b>   | <b>75</b>              | <b>60,6</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012   | Age              | Total             |                   |                     | Dépistage initial     |                     | Dépistages subséquents |                       |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|  |                  | Tous sexes        | Hommes            | Femmes              | Hommes                | Femmes              | Hommes                 | Femmes                |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète                           | 50-54 ans        | 86,7              | 87,5              | 85,7                | 80                    | 83,3                | 100                    | 100                   |
|  | 55-59 ans        | 100               | 100               | 100                 | 100                   | 100                 | 100                    | 100                   |
|  | 60-64 ans        | 83,3              | 90                | 75                  | 80                    | 33,3                | 100                    | 100                   |
|  | 65-69 ans        | 88,9              | 71,4              | 100                 | 50                    | 100                 | 80                     | 100                   |
|  | 70-74 ans        | 92,9              | 88,9              | 100                 | 100                   | 100                 | 85,7                   | 100                   |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>89,9</b>       | <b>88,4</b>       | <b>91,7</b>         | <b>81,3</b>           | <b>81,3</b>         | <b>92,6</b>            | <b>100</b>            |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)            | 50-54 ans        | 1                 | 1                 | 1                   | 1                     | 1                   | 1                      | 1                     |
|  | 55-59 ans        | 1                 | 1                 | 1                   | 1                     | 1                   | 1                      | 1                     |
|  | 60-64 ans        | 1                 | 1                 | 1                   | 1                     | 1                   | 1                      | 1                     |
|  | 65-69 ans        | 1                 | 1                 | 1                   | 1                     | 1                   | 1                      | 1                     |
|  | 70-74 ans        | 1                 | 1                 | 1                   | 1                     | 1                   | 1                      | 1                     |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>            | <b>1</b>              | <b>1</b>            | <b>1</b>               | <b>1</b>              |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans        | 0 (0-1)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)             | 0 (0-1)               | 0 (0-1)             | 0 (0-1)                | 0 (0-1)               |
|  | 55-59 ans        | 0 (0-1)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)             | 1 (0-1)               | 0 (0-1)             | 0 (0-1)                | 0 (0-1)               |
|  | 60-64 ans        | 0 (0-1)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)             | 0 (0-1)               | 1 (0-1)             | 0 (0-1)                | 0 (0-1)               |
|  | 65-69 ans        | 0 (0-1)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)             | 0 (0-1)               | 0 (0-1)             | 0 (0-1)                | 0 (0-1)               |
|  | 70-74 ans        | 0 (0-1)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)             | 0 (0-1)               | 0 (0-1)             | 0 (0-1)                | 0 (0-1)               |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0 (0-1)</b>    | <b>0 (0-1)</b>    | <b>0 (0-1)</b>      | <b>0 (0-1)</b>        | <b>0 (0-1)</b>      | <b>0 (0-1)</b>         | <b>0 (0-1)</b>        |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)                 | 50-54 ans        | 49                | 58                | 40                  | 51                    | 39                  | 69                     | 44                    |
|  | 55-59 ans        | 64                | 52                | 85                  | 54                    | 252                 | 52                     | 43                    |
|  | 60-64 ans        | 81                | 107               | 47                  | 166                   | 41                  | 49                     | 51                    |
|  | 65-69 ans        | 53                | 71                | 41                  | 70                    | 41                  | 72                     | 41                    |
|  | 70-74 ans        | 114               | 72                | 188                 | 70                    | 96                  | 73                     | 327                   |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>71</b>         | <b>73</b>         | <b>69</b>           | <b>92</b>             | <b>64</b>           | <b>62</b>              | <b>73</b>             |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)      | 50-54 ans        | 53 (22-75)        | 58 (45-68.5)      | 28 (21-75)          | 56 (53-60)            | 24.5 (21-75)        | 75 (37-96)             | 44 (44-44)            |
|  | 55-59 ans        | 38 (30-81)        | 34 (30-81)        | 42 (34-76)          | 53.5 (24-83)          | 252 (252-252)       | 34 (30-81)             | 38 (27-59)            |
|  | 60-64 ans        | 37 (31-77)        | 37 (31-84)        | 39 (29.5-69.5)      | 39 (35-315)           | 32 (21-69)          | 34 (31-77)             | 43 (35-70)            |
|  | 65-69 ans        | 37 (23-83)        | 83 (31-86)        | 34 (21-70)          | 69.5 (23-116)         | 37 (15-70)          | 83 (75-85)             | 31 (22-56.5)          |
|  | 70-74 ans        | 86.5 (72-99)      | 83 (66-88)        | 127 (89-237)        | 69.5 (40-99)          | 89 (72-127)         | 83 (66-88)             | 326.5 (237-416)       |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>56 (30-83)</b> | <b>65 (32-85)</b> | <b>39.5 (25-76)</b> | <b>54.5 (29.5-91)</b> | <b>53 (21-75.5)</b> | <b>75 (32-85)</b>      | <b>39.5 (27.5-76)</b> |
| C05- Pourcentage de perdus de vue  | 50-54 ans        | 27,6              | 26,7              | 28,6                | 30                    | 27,3                | 20                     | 33,3                  |
|  | 55-59 ans        | 26,1              | 21,4              | 33,3                | 40                    | 33,3                | 11,1                   | 33,3                  |
|  | 60-64 ans        | 17,6              | 14,3              | 20                  | 16,7                  | 37,5                | 12,5                   | 8,3                   |
|  | 65-69 ans        | 24                | 20                | 26,7                | 40                    | 40                  | 0                      | 20                    |
|  | 70-74 ans        | 15,8              | 9,1               | 25                  | 0                     | 20                  | 11,1                   | 33,3                  |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>22,3</b>       | <b>18,8</b>       | <b>25,8</b>         | <b>28,6</b>           | <b>31,3</b>         | <b>11,1</b>            | <b>20,6</b>           |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu                       | 50-54 ans        | 93,3              | 87,5              | 100                 | 80                    | 100                 | 100                    | 100                   |
|  | 55-59 ans        | 100               | 100               | 100                 | 100                   | 100                 | 100                    | 100                   |
|  | 60-64 ans        | 100               | 100               | 100                 | 100                   | 100                 | 100                    | 100                   |
|  | 65-69 ans        | 100               | 100               | 100                 | 100                   | 100                 | 100                    | 100                   |
|  | 70-74 ans        | 100               | 100               | 100                 | 100                   | 100                 | 100                    | 100                   |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012  | Age              | Total       |             |             | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|   |                  | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>98,7</b> | <b>97,7</b> | <b>100</b>  | <b>93,8</b>       | <b>100</b> | <b>100</b>             | <b>100</b> |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 80          | 75          | 85,7        | 80                | 83,3       | 66,7                   | 100        |
|   | 55-59 ans        | 64,3        | 55,6        | 80          | 50                | 100        | 57,1                   | 75         |
|   | 60-64 ans        | 61,1        | 60          | 62,5        | 40                | 66,7       | 80                     | 60         |
|   | 65-69 ans        | 61,1        | 57,1        | 63,6        | 50                | 66,7       | 60                     | 62,5       |
|   | 70-74 ans        | 50          | 33,3        | 80          | 0                 | 66,7       | 42,9                   | 100        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>63,3</b> | <b>55,8</b> | <b>72,2</b> | <b>50</b>         | <b>75</b>  | <b>59,3</b>            | <b>70</b>  |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 7,1         | 11,1        | 0           | 0                 | 0          | 14,3                   | 0          |
|   | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans        | 5,6         | 0           | 9,1         | 0                 | 0          | 0                      | 12,5       |
|   | 70-74 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2,5</b>  | <b>2,3</b>  | <b>2,8</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>3,7</b>             | <b>5</b>   |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 7,1         | 0           | 20          | 0                 | 0          | 0                      | 25         |
|   | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1,3</b>  | <b>0</b>    | <b>2,8</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>5</b>   |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé            | 50-54 ans        | 6,7         | 12,5        | 0           | 20                | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans        | 5,6         | 14,3        | 0           | 0                 | 0          | 20                     | 0          |
|   | 70-74 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2,5</b>  | <b>4,7</b>  | <b>0</b>    | <b>6,3</b>        | <b>0</b>   | <b>3,7</b>             | <b>0</b>   |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                | 50-54 ans        | 6,7         | 0           | 14,3        | 0                 | 16,7       | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans        | 11,1        | 0           | 25          | 0                 | 0          | 0                      | 40         |
|   | 65-69 ans        | 16,7        | 28,6        | 9,1         | 50                | 0          | 20                     | 12,5       |
|   | 70-74 ans        | 21,4        | 33,3        | 0           | 50                | 0          | 28,6                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>11,4</b> | <b>11,6</b> | <b>11,1</b> | <b>12,5</b>       | <b>6,3</b> | <b>11,1</b>            | <b>15</b>  |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer                                 | 50-54 ans        | 6,7         | 12,5        | 0           | 0                 | 0          | 33,3                   | 0          |
|   | 55-59 ans        | 14,3        | 22,2        | 0           | 50                | 0          | 14,3                   | 0          |
|   | 60-64 ans        | 5,6         | 10          | 0           | 20                | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans        | 14,3        | 11,1        | 20          | 0                 | 33,3       | 14,3                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>7,6</b>  | <b>11,6</b> | <b>2,8</b>  | <b>12,5</b>       | <b>6,3</b> | <b>11,1</b>            | <b>0</b>   |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012   | Age              | Tous sexes  | Total       |            | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |            |
|--|------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|------------|
|  |                  |             | Hommes      | Femmes     | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes     |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                           | 50-54 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)         | 50-54 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans        | 7,1         | 11,1        | 0          | 0                 | 0           | 14,3                   | 0          |
|  | 60-64 ans        | 22,2        | 30          | 12,5       | 40                | 33,3        | 20                     | 0          |
|  | 65-69 ans        | 11,1        | 0           | 18,2       | 0                 | 33,3        | 0                      | 12,5       |
|  | 70-74 ans        | 7,1         | 11,1        | 0          | 50                | 0           | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>10,1</b> | <b>11,6</b> | <b>8,3</b> | <b>18,8</b>       | <b>12,5</b> | <b>7,4</b>             | <b>5</b>   |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans        | 7,1         | 11,1        | 0          | 0                 | 0           | 14,3                   | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1,3</b>  | <b>2,3</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>3,7</b>             | <b>0</b>   |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans        | 1,9         | 2,3         | 1,7        | 3                 | 2,5         | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans        | 1,5         | 0           | 2,8        | 0                 | 0           | 0                      | 3,7        |
|  | 65-69 ans        | 4,2         | 7           | 1,9        | 8,8               | 0           | 6,4                    | 2,5        |
|  | 70-74 ans        | 4           | 9,2         | 0          | 11,1              | 0           | 8,5                    | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>2,1</b>  | <b>3,1</b>  | <b>1,4</b> | <b>3,3</b>        | <b>1</b>    | <b>3</b>               | <b>1,6</b> |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans        | 1           | 0           | 1,7        | 0                 | 2,5         | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans        | 1,5         | 0           | 2,8        | 0                 | 0           | 0                      | 3,7        |
|  | 65-69 ans        | 3,1         | 4,7         | 1,9        | 8,8               | 0           | 3,2                    | 2,5        |
|  | 70-74 ans        | 4           | 9,2         | 0          | 11,1              | 0           | 8,5                    | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1,7</b>  | <b>2,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>2,2</b>        | <b>1</b>    | <b>2,2</b>             | <b>1,6</b> |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées   | 50-74 ans **     | <b>1,6</b>  | <b>1,9</b>  | <b>1,3</b> | .                 | .           | .                      | .          |
|  | 50-54 ans        | 1           | 0           | 1,7        | 0                 | 2,5         | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012                                      | Age                 | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|   |                     |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|   | 60-64 ans           | 0,8        | 0          | 1,4        | 0                 | 0          | 0                      | 1,8        |
|   | 65-69 ans           | 2,1        | 4,7        | 0          | 8,8               | 0          | 3,2                    | 0          |
|   | 70-74 ans           | 4          | 9,2        | 0          | 11,1              | 0          | 8,5                    | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,4</b> | <b>2,2</b> | <b>0,7</b> | <b>2,2</b>        | <b>1</b>   | <b>2,2</b>             | <b>0,5</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,3</b> | <b>1,9</b> | <b>0,7</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées               | 50-54 ans           | 1          | 2,3        | 0          | 0                 | 0          | 9,5                    | 0          |
|   | 55-59 ans           | 1,8        | 4,3        | 0          | 5,4               | 0          | 3,5                    | 0          |
|   | 60-64 ans           | 0,8        | 1,7        | 0          | 5,5               | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans           | 2,6        | 3,1        | 2,3        | 0                 | 10         | 4,3                    | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,2</b> | <b>2,2</b> | <b>0,3</b> | <b>2,2</b>        | <b>1</b>   | <b>2,2</b>             | <b>0</b>   |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,3</b> | <b>2,4</b> | <b>0,4</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans           | 50         | 50         | 0          | 100               | 0          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans           | 100        | 100        | 0          | 100               | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans           | 100        | 100        | 100        | 0                 | 100        | 100                    | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>80</b>  | <b>75</b>  | <b>100</b> | <b>100</b>        | <b>100</b> | <b>50</b>              | <b>0</b>   |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009