

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	15938	7238	8700	6852	8040	386	660	
	55-59 ans	15289	6979	8310	6102	6997	877	1313	
	60-64 ans	14682	6816	7866	5656	6270	1160	1596	
	65-69 ans	9482	4326	5156	3422	3927	904	1229	
	70-74 ans	9686	4256	5430	3339	4188	917	1242	
	50-74 ans	65077	29615	35462	25371	29422	4244	6040	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	386	181	205	171	193	10	12	
	55-59 ans	371	173	198	153	174	20	24	
	60-64 ans	354	176	178	159	143	17	35	
	65-69 ans	257	114	143	98	120	16	23	
	70-74 ans	302	128	174	96	141	32	33	
	50-74 ans	1670	772	898	677	771	95	127	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	257	123	134	114	124	9	10	
	55-59 ans	229	111	118	97	102	14	16	
	60-64 ans	250	123	127	109	98	14	29	
	65-69 ans	169	75	94	63	75	12	19	
	70-74 ans	208	91	117	66	90	25	27	
	50-74 ans	1113	523	590	449	489	74	101	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	129	58	71	57	69	1	2	
	55-59 ans	142	62	80	56	72	6	8	
	60-64 ans	104	53	51	50	45	3	6	
	65-69 ans	88	39	49	35	45	4	4	
	70-74 ans	94	37	57	30	51	7	6	
	50-74 ans	557	249	308	228	282	21	26	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	15809	7180	8629	6795	7971	385	658	
	55-59 ans	15147	6917	8230	6046	6925	871	1305	
	60-64 ans	14578	6763	7815	5606	6225	1157	1590	
	65-69 ans	9394	4287	5107	3387	3882	900	1225	
	70-74 ans	9592	4219	5373	3309	4137	910	1236	
	50-74 ans	64520	29366	35154	25143	29140	4223	6014	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	288	157	131	149	114	8	17	
	55-59 ans	322	179	143	161	124	18	19	
	60-64 ans	343	182	161	147	125	35	36	
	65-69 ans	280	138	142	112	105	26	37	
	70-74 ans	296	160	136	128	103	32	33	
	50-74 ans	1529	816	713	697	571	119	142	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	282	153	129	146	112	7	17	
	55-59 ans	317	175	142	157	123	18	19	
	60-64 ans	329	171	158	137	123	34	35	
	65-69 ans	267	132	135	107	100	25	35	
	70-74 ans	288	153	135	122	102	31	33	
	50-74 ans	1483	784	699	669	560	115	139	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	262	145	117	138	101	7	16	
	55-59 ans	296	165	131	148	114	17	17	
	60-64 ans	308	160	148	130	114	30	34	
	65-69 ans	260	130	130	105	96	25	34	
	70-74 ans	271	145	126	114	93	31	33	
	50-74 ans	1397	745	652	635	518	110	134	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	249	137	112	130	97	7	15	
	55-59 ans	281	155	126	139	111	16	15	
	60-64 ans	284	146	138	121	104	25	34	
	65-69 ans	240	117	123	94	92	23	31	
	70-74 ans	257	137	120	109	87	28	33	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1311	692	619	593	491	99	128
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	9	8	1	6	1	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	260	145	115	138	100	7	15
	55-59 ans	294	164	130	147	113	17	17
	60-64 ans	306	158	148	129	114	29	34
	65-69 ans	255	127	128	104	95	23	33
	70-74 ans	268	143	125	112	92	31	33
	50-74 ans	1383	737	646	630	514	107	132
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	14	8	6	5	4	3	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	262	145	117	138	101	7	16
	55-59 ans	296	165	131	148	114	17	17
	60-64 ans	308	160	148	130	114	30	34
	65-69 ans	260	130	130	105	96	25	34
	70-74 ans	271	145	126	114	93	31	33
	50-74 ans	1397	745	652	635	518	110	134
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	262	145	117	138	101	7	16
	55-59 ans	297	166	131	149	114	17	17
	60-64 ans	309	161	148	131	114	30	34
	65-69 ans	260	130	130	105	96	25	34
	70-74 ans	272	146	126	115	93	31	33
	50-74 ans	1400	748	652	638	518	110	134
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	152	68	84	63	73	5	11
	55-59 ans	155	77	78	67	65	10	13
	60-64 ans	139	57	82	43	60	14	22
	65-69 ans	137	56	81	42	60	14	21
	70-74 ans	114	54	60	36	41	18	19
	50-74 ans	697	312	385	251	299	61	86
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	17	12	5	12	4	0	1
	55-59 ans	22	12	10	12	9	0	1
	60-64 ans	13	10	3	7	3	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	8	4	4	4	2	0	2
	70-74 ans	8	3	5	2	4	1	1
	50-74 ans	68	41	27	37	22	4	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	8	3	5	3	4	0	1
	60-64 ans	19	11	8	11	7	0	1
	65-69 ans	13	4	9	2	7	2	2
	70-74 ans	10	3	7	3	6	0	1
	50-74 ans	59	27	32	25	27	2	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19	11	8	11	6	0	2
	55-59 ans	32	15	17	14	17	1	0
	60-64 ans	31	16	15	9	10	7	5
	65-69 ans	30	20	10	18	8	2	2
	70-74 ans	28	13	15	10	10	3	5
	50-74 ans	140	75	65	62	51	13	14
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	54	41	13	39	11	2	2
	55-59 ans	55	39	16	36	15	3	1
	60-64 ans	70	42	28	38	23	4	5
	65-69 ans	39	27	12	24	10	3	2
	70-74 ans	82	51	31	44	27	7	4
	50-74 ans	300	200	100	181	86	19	14
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	20	15	5	14	4	1	1
	60-64 ans	32	22	10	20	10	2	0
	65-69 ans	30	18	12	14	8	4	4
	70-74 ans	22	16	6	15	4	1	2
	50-74 ans	114	78	36	70	29	8	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	2	0	2	0
	60-64 ans	5	3	2	3	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	7	5	2	4	1	1	1
	50-74 ans	19	13	6	10	3	3	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	73	52	21	50	17	2	4
	55-59 ans	87	54	33	50	32	4	1
	60-64 ans	101	58	43	47	33	11	10
	65-69 ans	69	47	22	42	18	5	4
	70-74 ans	110	64	46	54	37	10	9
	50-74 ans	440	275	165	243	137	32	28
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	54	41	13	39	11	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	55	39	16	36	15	3	1
	60-64 ans	70	42	28	38	23	4	5
	65-69 ans	39	27	12	24	10	3	2
	70-74 ans	82	51	31	44	27	7	4
	50-74 ans	300	200	100	181	86	19	14
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	20	15	5	14	4	1	1
	60-64 ans	32	22	10	20	10	2	0
	65-69 ans	30	18	12	14	8	4	4
	70-74 ans	22	16	6	15	4	1	2
	50-74 ans	114	78	36	70	29	8	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	17	12	5	12	4	0	1
	60-64 ans	30	20	10	18	10	2	0
	65-69 ans	28	16	12	12	8	4	4
	70-74 ans	22	16	6	15	4	1	2
	50-74 ans	104	69	35	62	28	7	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	17	12	5	12	4	0	1
	60-64 ans	28	18	10	16	10	2	0
	65-69 ans	27	15	12	11	8	4	4
	70-74 ans	21	15	6	14	4	1	2
	50-74 ans	100	65	35	58	28	7	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	13	9	4	9	3	0	1
	60-64 ans	20	15	5	14	5	1	0
	65-69 ans	19	11	8	8	5	3	3
	70-74 ans	14	10	4	9	3	1	1
	50-74 ans	72	49	23	44	18	5	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	8	3	5	2	5	1	0
	65-69 ans	8	4	4	3	3	1	1
	70-74 ans	7	5	2	5	1	0	1
	50-74 ans	28	16	12	14	10	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	6	6	0	6	0	0	0
	65-69 ans	8	5	3	2	2	3	1
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	26	19	7	16	6	3	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	9	4	5	4	5	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	14	8	6	7	5	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	8	4	4	4	2	0	2
	70-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
	50-74 ans	21	13	8	13	5	0	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	11	9	2	8	2	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	17	12	5	12	4	0	1
	60-64 ans	27	17	10	16	10	1	0
	65-69 ans	27	15	12	11	8	4	4
	70-74 ans	21	15	6	14	4	1	2
	50-74 ans	99	64	35	58	28	6	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	4	5	4	5	0	0
	55-59 ans	9	6	3	6	3	0	0
	60-64 ans	9	6	3	6	3	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	8	3	5	3	5	0	0
	50-74 ans	37	20	17	20	17	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	2,6	2,6	1,8
	55-59 ans	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,3	2,3	1,8
	60-64 ans	2,4	2,6	2,3	2,8	2,3	1,5	2,2	2,2
	65-69 ans	2,7	2,6	2,8	2,9	3,1	1,8	1,9	1,9
	70-74 ans	3,1	3	3,2	2,9	3,4	3,5	2,7	2,7
	50-74 ans	2,6	2,6	2,5	2,7	2,6	2,2	2,1	2,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,3	0,3	0,3
	55-59 ans	0,9	0,9	1	0,9	1	0,7	0,6	0,6
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	0,9	0,7	0,3	0,4	0,4
	65-69 ans	0,9	0,9	1	1	1,1	0,4	0,3	0,3
	70-74 ans	1	0,9	1	0,9	1,2	0,8	0,5	0,5
	50-74 ans	0,9	0,8	0,9	0,9	1	0,5	0,4	0,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,6	68	65,4	66,7	64,2	90	83,3	83,3
	55-59 ans	61,7	64,2	59,6	63,4	58,6	70	66,7	66,7
	60-64 ans	70,6	69,9	71,3	68,6	68,5	82,4	82,9	82,9
	65-69 ans	65,8	65,8	65,7	64,3	62,5	75	82,6	82,6
	70-74 ans	68,9	71,1	67,2	68,8	63,8	78,1	81,8	81,8
	50-74 ans	66,6	67,7	65,7	66,3	63,4	77,9	79,5	79,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,2	1,5	2,2	1,4	2,1	2,6	2,6
	55-59 ans	2,1	2,6	1,7	2,7	1,8	2,1	1,5	1,5
	60-64 ans	2,4	2,7	2,1	2,6	2	3	2,3	2,3
	65-69 ans	3	3,2	2,8	3,3	2,7	2,9	3	3
	70-74 ans	3,1	3,8	2,5	3,9	2,5	3,5	2,7	2,7
	50-74 ans	2,4	2,8	2	2,8	2	2,8	2,4	2,4
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,9	97,5	98,5	98	98,2	100	100	100
	55-59 ans	98,4	97,8	99,3	97,5	99,2	100	100	100
	60-64 ans	95,9	94	98,1	93,2	98,4	97,1	97,2	97,2
	65-69 ans	95,4	95,7	95,1	95,5	95,2	96,2	94,6	94,6
	70-74 ans	97,3	95,6	99,3	95,3	99	96,9	100	100
	50-74 ans	97	96,1	98	96	98,1	96,6	97,9	97,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,9	94,8	90,7	94,5	90,2	100	94,1	94,1
	55-59 ans	93,4	94,3	92,3	94,3	92,7	94,4	89,5	89,5
	60-64 ans	93,6	93,6	93,7	94,9	92,7	88,2	97,1	97,1
	65-69 ans	97,4	98,5	96,3	98,1	96	100	97,1	97,1
	70-74 ans	94,1	94,8	93,3	93,4	91,2	100	100	100
	50-74 ans	94,2	95	93,3	94,9	92,5	95,7	96,4	96,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95	94,5	95,7	94,2	96	100	93,8	93,8
	55-59 ans	94,9	93,9	96,2	93,9	97,4	94,1	88,2	88,2
	60-64 ans	92,2	91,3	93,2	93,1	91,2	83,3	100	100
	65-69 ans	92,3	90	94,6	89,5	95,8	92	91,2	91,2
	70-74 ans	94,8	94,5	95,2	95,6	93,5	90,3	100	100
	50-74 ans	93,8	92,9	94,9	93,4	94,8	90	95,5	95,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	93	74	94	76	69	60	60
	55-59 ans	84	95	70	98	73	66	50	50
	60-64 ans	71	77	65	80	67	66	58	58
	65-69 ans	79	89	70	96	75	56	56	56

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	75	84	64	91	69	60	52
	50-74 ans	79	88	69	92	72	62	55
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,1	2,5	3,8	2,7	4,4	0	0
	55-59 ans	2,8	3,4	2,1	3,7	2,4	0	0
	60-64 ans	2,6	3,3	1,9	4,1	2,4	0	0
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	0,9	1	0	0
	70-74 ans	2,7	1,9	3,7	2,3	4,9	0	0
	50-74 ans	2,4	2,5	2,4	2,9	3	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58	46,9	71,8	45,7	72,3	71,4	68,8
	55-59 ans	52,2	46,4	59,5	45	57	58,8	76,5
	60-64 ans	45	35,4	55,4	32,8	52,6	46,7	64,7
	65-69 ans	52,7	43,1	62,3	40	62,5	56	61,8
	70-74 ans	41,9	37	47,6	31,3	44,1	58,1	57,6
	50-74 ans	49,8	41,7	59	39,3	57,7	55,5	64,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,5	8,3	4,3	8,7	4	0	6,3
	55-59 ans	7,4	7,2	7,6	8,1	7,9	0	5,9
	60-64 ans	4,2	6,2	2	5,3	2,6	10	0
	65-69 ans	3,1	3,1	3,1	3,8	2,1	0	5,9
	70-74 ans	2,9	2,1	4	1,7	4,3	3,2	3
	50-74 ans	4,9	5,5	4,1	5,8	4,2	3,6	3,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	3,4	4,1	2,6	4,3	3	0	0
	55-59 ans	2,7	1,8	3,8	2	3,5	0	5,9
	60-64 ans	6,1	6,8	5,4	8,4	6,1	0	2,9
	65-69 ans	5	3,1	6,9	1,9	7,3	8	5,9
	70-74 ans	3,7	2,1	5,6	2,6	6,5	0	3
	50-74 ans	4,2	3,6	4,9	3,9	5,2	1,8	3,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,3	7,6	6,8	8	5,9	0	12,5
	55-59 ans	10,8	9	13	9,4	14,9	5,9	0
	60-64 ans	10	9,9	10,1	6,9	8,8	23,3	14,7
	65-69 ans	11,5	15,4	7,7	17,1	8,3	8	5,9
	70-74 ans	10,3	8,9	11,9	8,7	10,8	9,7	15,2
	50-74 ans	10	10	10	9,7	9,8	11,8	10,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,6	28,3	11,1	28,3	10,9	28,6	12,5
	55-59 ans	18,5	23,5	12,2	24,2	13,2	17,6	5,9
	60-64 ans	22,7	26,1	18,9	29	20,2	13,3	14,7
	65-69 ans	15	20,8	9,2	22,9	10,4	12	5,9
	70-74 ans	30,1	34,9	24,6	38,3	29	22,6	12,1
	50-74 ans	21,4	26,7	15,3	28,4	16,6	17,3	10,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	4,8	2,6	5,1	3	0	0
	55-59 ans	6,7	9	3,8	9,4	3,5	5,9	5,9
	60-64 ans	10,4	13,7	6,8	15,3	8,8	6,7	0
	65-69 ans	11,5	13,8	9,2	13,3	8,3	16	11,8
	70-74 ans	8,1	11	4,8	13	4,3	3,2	6,1
	50-74 ans	8,1	10,4	5,5	11	5,6	7,3	5,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0	0,9	0	1	0	0
	55-59 ans	1,3	2,4	0	1,3	0	11,8	0
	60-64 ans	1,6	1,9	1,4	2,3	0,9	0	2,9
	65-69 ans	0,8	0,8	0,8	1	0	0	2,9
	70-74 ans	2,6	3,4	1,6	3,5	1,1	3,2	3
	50-74 ans	1,4	1,7	0,9	1,6	0,6	2,7	2,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0,7	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	1	0	0
	70-74 ans	0,4	0,7	0	0,9	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	7,2	2,4	7,4	2,1	5,2	6,1
	55-59 ans	5,7	7,8	4	8,3	4,6	4,6	0,8
	60-64 ans	6,9	8,6	5,5	8,4	5,3	9,5	6,3
	65-69 ans	7,3	11	4,3	12,4	4,6	5,6	3,3
	70-74 ans	11,5	15,2	8,6	16,3	8,9	11	7,3
	50-74 ans	6,8	9,4	4,7	9,7	4,7	7,6	4,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	6,9	9,3	4,7
	50-54 ans	3,4	5,7	1,5	5,7	1,4	5,2	3
	55-59 ans	3,6	5,6	1,9	6	2,2	3,4	0,8
	60-64 ans	4,8	6,2	3,6	6,8	3,7	3,5	3,1
	65-69 ans	4,2	6,3	2,3	7,1	2,6	3,3	1,6
	70-74 ans	8,5	12,1	5,8	13,3	6,5	7,7	3,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	4,6	6,8	2,8	7,2	3	4,5	2,3
	50-74 ans **	4,7	6,7	2,8
	50-54 ans	0,6	1	0,3	1	0,4	0	0
	55-59 ans	1,3	2,2	0,6	2,3	0,6	1,1	0,8
	60-64 ans	2,2	3,3	1,3	3,6	1,6	1,7	0
	65-69 ans	3,2	4,2	2,3	4,1	2,1	4,4	3,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	2,3	3,8	1,1	4,5	1	1,1	1,6
	50-74 ans	1,8	2,7	1	2,8	1	1,9	1,2
	50-74 ans **	1,8	2,6	1
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6,7	10	0	11,1	0	0	0
65-69 ans	3,6	6,3	0	8,3	0	0	0	
70-74 ans	4,5	6,3	0	6,7	0	0	0	
50-74 ans	3,8	5,8	0	6,5	0	0	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des