

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13190	5757	7433	3427	4311	2330	3122
	55-59 ans	13675	5958	7717	1333	1523	4625	6194
	60-64 ans	13528	5909	7619	1114	1251	4795	6368
	65-69 ans	9587	4324	5263	663	686	3661	4577
	70-74 ans	8909	3988	4921	502	588	3486	4333
	50-74 ans	58889	25936	32953	7039	8359	18897	24594
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	411	182	229	112	146	70	83
	55-59 ans	429	208	221	70	73	138	148
	60-64 ans	422	185	237	57	54	128	183
	65-69 ans	379	183	196	44	30	139	166
	70-74 ans	381	163	218	37	33	126	185
	50-74 ans	2022	921	1101	320	336	601	765
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	264	119	145	69	85	50	60
	55-59 ans	305	144	161	45	43	99	118
	60-64 ans	298	126	172	34	32	92	140
	65-69 ans	262	128	134	26	15	102	119
	70-74 ans	267	112	155	23	16	89	139
	50-74 ans	1396	629	767	197	191	432	576
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	147	63	84	43	61	20	23
	55-59 ans	124	64	60	25	30	39	30
	60-64 ans	124	59	65	23	22	36	43
	65-69 ans	117	55	62	18	15	37	47
	70-74 ans	114	51	63	14	17	37	46
	50-74 ans	626	292	334	123	145	169	189
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13043	5694	7349	3384	4250	2310	3099
	55-59 ans	13551	5894	7657	1308	1493	4586	6164
	60-64 ans	13404	5850	7554	1091	1229	4759	6325
	65-69 ans	9470	4269	5201	645	671	3624	4530
	70-74 ans	8795	3937	4858	488	571	3449	4287
	50-74 ans	58263	25644	32619	6916	8214	18728	24405
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	428	213	215	121	134	92	81
	55-59 ans	425	208	217	48	36	160	181
	60-64 ans	456	229	227	47	59	182	168
	65-69 ans	335	169	166	29	25	140	141
	70-74 ans	330	193	137	30	14	163	123
	50-74 ans	1974	1012	962	275	268	737	694
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	426	211	215	120	134	91	81
	55-59 ans	424	208	216	48	36	160	180
	60-64 ans	452	229	223	47	58	182	165
	65-69 ans	333	169	164	29	25	140	139
	70-74 ans	330	193	137	30	14	163	123
	50-74 ans	1965	1010	955	274	267	736	688
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	403	202	201	117	123	85	78
	55-59 ans	398	194	204	39	33	155	171
	60-64 ans	438	222	216	46	56	176	160
	65-69 ans	319	161	158	27	23	134	135
	70-74 ans	310	180	130	27	12	153	118
	50-74 ans	1868	959	909	256	247	703	662
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	398	200	198	115	122	85	76
	55-59 ans	393	191	202	37	32	154	170
	60-64 ans	434	221	213	45	56	176	157
	65-69 ans	315	160	155	27	23	133	132
	70-74 ans	300	173	127	24	10	149	117

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1840	945	895	248	243	697	652
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	399	201	198	116	122	85	76
	55-59 ans	395	192	203	37	33	155	170
	60-64 ans	436	222	214	46	56	176	158
	65-69 ans	317	160	157	27	23	133	134
	70-74 ans	305	176	129	26	11	150	118
	50-74 ans	1852	951	901	252	245	699	656
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
	50-74 ans	16	8	8	4	2	4	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	0	4	0	1	0	3
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	2	7	1	1	1	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	402	201	201	116	123	85	78
	55-59 ans	398	194	204	39	33	155	171
	60-64 ans	438	222	216	46	56	176	160
	65-69 ans	319	161	158	27	23	134	135
	70-74 ans	310	180	130	27	12	153	118
	50-74 ans	1867	958	909	255	247	703	662
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	405	204	201	118	123	86	78
	55-59 ans	399	194	205	39	33	155	172
	60-64 ans	442	222	220	46	57	176	163
	65-69 ans	321	161	160	27	23	134	137
	70-74 ans	310	180	130	27	12	153	118
	50-74 ans	1877	961	916	257	248	704	668
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	223	98	125	48	81	50	44
	55-59 ans	194	74	120	18	23	56	97
	60-64 ans	188	75	113	15	24	60	89
	65-69 ans	132	47	85	5	17	42	68
	70-74 ans	120	53	67	4	7	49	60
	50-74 ans	857	347	510	90	152	257	358
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	38	21	17	15	9	6	8
	55-59 ans	38	24	14	10	1	14	13
	60-64 ans	46	24	22	3	6	21	16

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	20	11	9	3	0	8	9
	70-74 ans	26	12	14	0	0	12	14
	50-74 ans	168	92	76	31	16	61	60
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	22	9	13	4	7	5	6
	55-59 ans	22	10	12	3	1	7	11
	60-64 ans	20	13	7	2	4	11	3
	65-69 ans	12	7	5	0	0	7	5
	70-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
	50-74 ans	85	42	43	9	13	33	30
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	50	29	21	18	11	11	10
	55-59 ans	57	29	28	2	3	27	25
	60-64 ans	61	32	29	7	12	25	17
	65-69 ans	53	33	20	6	1	27	19
	70-74 ans	52	40	12	10	0	30	12
	50-74 ans	273	163	110	43	27	120	83
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	54	37	17	26	10	11	7
	55-59 ans	53	39	14	5	1	34	13
	60-64 ans	99	62	37	16	7	46	30
	65-69 ans	71	43	28	10	2	33	26
	70-74 ans	68	44	24	8	2	36	22
	50-74 ans	345	225	120	65	22	160	98
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	8	3	5	2	3	1
	55-59 ans	29	17	12	1	4	16	8
	60-64 ans	23	12	11	3	3	9	8
	65-69 ans	30	18	12	2	2	16	10
	70-74 ans	32	25	7	4	2	21	5
	50-74 ans	125	80	45	15	13	65	32
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	15	6	9	3	4	3	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	104	66	38	44	21	22	17
	55-59 ans	110	68	42	7	4	61	38
	60-64 ans	161	95	66	23	19	72	47
	65-69 ans	124	76	48	16	3	60	45
	70-74 ans	120	84	36	18	2	66	34
	50-74 ans	619	389	230	108	49	281	181
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	54	37	17	26	10	11	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	53	39	14	5	1	34	13
	60-64 ans	99	62	37	16	7	46	30
	65-69 ans	71	43	28	10	2	33	26
	70-74 ans	68	44	24	8	2	36	22
	50-74 ans	345	225	120	65	22	160	98
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	8	3	5	2	3	1
	55-59 ans	29	17	12	1	4	16	8
	60-64 ans	23	12	11	3	3	9	8
	65-69 ans	30	18	12	2	2	16	10
	70-74 ans	32	25	7	4	2	21	5
	50-74 ans	125	80	45	15	13	65	32
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	29	17	12	1	4	16	8
	60-64 ans	22	12	10	3	3	9	7
	65-69 ans	29	17	12	2	2	15	10
	70-74 ans	26	20	6	4	2	16	4
	50-74 ans	115	73	42	15	12	58	30
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	29	17	12	1	4	16	8
	60-64 ans	22	12	10	3	3	9	7
	65-69 ans	29	17	12	2	2	15	10
	70-74 ans	26	20	6	4	2	16	4
	50-74 ans	115	73	42	15	12	58	30
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	5	1	3	0	2	1
	55-59 ans	18	10	8	1	2	9	6
	60-64 ans	16	9	7	3	2	6	5
	65-69 ans	24	12	12	1	2	11	10
	70-74 ans	21	17	4	4	1	13	3
	50-74 ans	85	53	32	12	7	41	25
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	11	7	4	0	2	7	2
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	30	20	10	3	5	17	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	10	7	3	1	1	6	2
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	18	10	8	1	1	9	7
	70-74 ans	10	9	1	0	0	9	1
	50-74 ans	46	31	15	4	3	27	12
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	21	13	8	4	1	9	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	4	1	3	1	1	0
	50-74 ans	13	7	6	4	2	3	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	29	17	12	1	4	16	8
	60-64 ans	22	12	10	3	3	9	7
	65-69 ans	29	17	12	2	2	15	10
	70-74 ans	26	20	6	4	2	16	4
	50-74 ans	115	73	42	15	12	58	30
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	5	8	1	6	4	2
	55-59 ans	19	10	9	9	2	1	7
	60-64 ans	12	6	6	1	2	5	4
	65-69 ans	10	7	3	2	1	5	2
	70-74 ans	16	10	6	2	2	8	4
	50-74 ans	70	38	32	15	13	23	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,1	3,2	3,1	3,3	3,4	3	2,7	
	55-59 ans	3,1	3,5	2,9	5,3	4,8	3	2,4	
	60-64 ans	3,1	3,1	3,1	5,1	4,3	2,7	2,9	
	65-69 ans	4	4,2	3,7	6,6	4,4	3,8	3,6	
	70-74 ans	4,3	4,1	4,4	7,4	5,6	3,6	4,3	
	50-74 ans	3,4	3,6	3,3	4,5	4	3,2	3,1	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,1	1,1	1,3	1,4	0,9	0,7	
	55-59 ans	0,9	1,1	0,8	1,9	2	0,8	0,5	
	60-64 ans	0,9	1	0,9	2,1	1,8	0,8	0,7	
	65-69 ans	1,2	1,3	1,2	2,7	2,2	1	1	
	70-74 ans	1,3	1,3	1,3	2,8	2,9	1,1	1,1	
	50-74 ans	1,1	1,1	1	1,7	1,7	0,9	0,8	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,2	65,4	63,3	61,6	58,2	71,4	72,3	
	55-59 ans	71,1	69,2	72,9	64,3	58,9	71,7	79,7	
	60-64 ans	70,6	68,1	72,6	59,6	59,3	71,9	76,5	
	65-69 ans	69,1	69,9	68,4	59,1	50	73,4	71,7	
	70-74 ans	70,1	68,7	71,1	62,2	48,5	70,6	75,1	
	50-74 ans	69	68,3	69,7	61,6	56,8	71,9	75,3	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,7	2,9	3,6	3,2	4	2,6	
	55-59 ans	3,1	3,5	2,8	3,7	2,4	3,5	2,9	
	60-64 ans	3,4	3,9	3	4,3	4,8	3,8	2,7	
	65-69 ans	3,5	4	3,2	4,5	3,7	3,9	3,1	
	70-74 ans	3,8	4,9	2,8	6,1	2,5	4,7	2,9	
	50-74 ans	3,4	3,9	2,9	4	3,3	3,9	2,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,1	100	99,2	100	98,9	100	
	55-59 ans	99,8	100	99,5	100	100	100	99,4	
	60-64 ans	99,1	100	98,2	100	98,3	100	98,2	
	65-69 ans	99,4	100	98,8	100	100	100	98,6	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	99,5	99,8	99,3	99,6	99,6	99,9	99,1	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,6	95,7	93,5	97,5	91,8	93,4	96,3	
	55-59 ans	93,9	93,3	94,4	81,3	91,7	96,9	95	
	60-64 ans	96,9	96,9	96,9	97,9	96,6	96,7	97	
	65-69 ans	95,8	95,3	96,3	93,1	92	95,7	97,1	
	70-74 ans	93,9	93,3	94,9	90	85,7	93,9	95,9	
	50-74 ans	95,1	95	95,2	93,4	92,5	95,5	96,2	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	99	98,5	98,3	99,2	100	97,4	
	55-59 ans	98,7	98,5	99	94,9	97	99,4	99,4	
	60-64 ans	99,1	99,5	98,6	97,8	100	100	98,1	
	65-69 ans	98,7	99,4	98,1	100	100	99,3	97,8	
	70-74 ans	96,8	96,1	97,7	88,9	83,3	97,4	99,2	
	50-74 ans	98,5	98,5	98,5	96,9	98,4	99,1	98,5	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	94	78	96	78	93	79	
	55-59 ans	77	76	77	97	71	71	79	
	60-64 ans	84	79	89	88	93	77	88	
	65-69 ans	80	85	75	88	97	84	72	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	84	81	88	86	51	80	92
	50-74 ans	82	83	82	93	81	79	82
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3	2,3	3,7	0,8	4,5	4,3	2,5
	55-59 ans	4,5	4,8	4,1	18,8	5,6	0,6	3,9
	60-64 ans	2,6	2,6	2,6	2,1	3,4	2,7	2,4
	65-69 ans	3	4,1	1,8	6,9	4	3,6	1,4
	70-74 ans	4,8	5,2	4,4	6,7	14,3	4,9	3,3
	50-74 ans	3,5	3,8	3,3	5,5	4,9	3,1	2,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,8	99,5	100	99,1	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	99,9	100	99,6	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,1	48	62,2	40,7	65,9	58,1	56,4
	55-59 ans	48,6	38,1	58,5	46,2	69,7	36,1	56,4
	60-64 ans	42,5	33,8	51,4	32,6	42,1	34,1	54,6
	65-69 ans	41,1	29,2	53,1	18,5	73,9	31,3	49,6
	70-74 ans	38,7	29,4	51,5	14,8	58,3	32	50,8
	50-74 ans	45,7	36,1	55,7	35	61,3	36,5	53,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,4	10,3	8,5	12,7	7,3	7	10,3
	55-59 ans	9,5	12,4	6,8	25,6	3	9	7,6
	60-64 ans	10,4	10,8	10	6,5	10,5	11,9	9,8
	65-69 ans	6,2	6,8	5,6	11,1	0	6	6,6
	70-74 ans	8,4	6,7	10,8	0	0	7,8	11,9
	50-74 ans	9	9,6	8,3	12,1	6,5	8,7	9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	5,4	4,4	6,5	3,4	5,7	5,8	7,7
	55-59 ans	5,5	5,2	5,9	7,7	3	4,5	6,4
	60-64 ans	4,5	5,9	3,2	4,3	7	6,3	1,8
	65-69 ans	3,7	4,3	3,1	0	0	5,2	3,6
	70-74 ans	2,9	1,7	4,6	0	8,3	2	4,2
	50-74 ans	4,5	4,4	4,7	3,5	5,2	4,7	4,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,3	14,2	10,4	15,3	8,9	12,8	12,8
	55-59 ans	14,3	14,9	13,7	5,1	9,1	17,4	14,5
	60-64 ans	13,8	14,4	13,2	15,2	21,1	14,2	10,4
	65-69 ans	16,5	20,5	12,5	22,2	4,3	20,1	13,9
	70-74 ans	16,8	22,2	9,2	37	0	19,6	10,2
	50-74 ans	14,5	17	12	16,7	10,9	17	12,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,3	18,1	8,5	22	8,1	12,8	9
	55-59 ans	13,3	20,1	6,8	12,8	3	21,9	7,6
	60-64 ans	22,4	27,9	16,8	34,8	12,3	26,1	18,4
	65-69 ans	22,1	26,7	17,5	37	8,7	24,6	19
	70-74 ans	21,9	24,4	18,5	29,6	16,7	23,5	18,6
	50-74 ans	18,4	23,4	13,1	25,3	8,9	22,7	14,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	3,9	1,5	4,2	1,6	3,5	1,3
	55-59 ans	7,3	8,8	5,9	2,6	12,1	10,3	4,7
	60-64 ans	5,2	5,4	5	6,5	5,3	5,1	4,9
	65-69 ans	9,3	11,2	7,5	7,4	8,7	11,9	7,3
	70-74 ans	10,3	13,9	5,4	14,8	16,7	13,7	4,2
	50-74 ans	6,7	8,3	4,9	5,8	5,2	9,2	4,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	0,5	2	0,8	1,6	0	2,6
	55-59 ans	0,8	0	1,5	0	0	0	1,7
	60-64 ans	0,7	0,9	0,5	0	1,8	1,1	0
	65-69 ans	0,9	1,2	0,6	3,7	4,3	0,7	0
	70-74 ans	0,3	0,6	0	3,7	0	0	0
	50-74 ans	0,8	0,6	1	1,2	1,6	0,4	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,2	0	0,5	0	0,8	0	0
	55-59 ans	0,8	0,5	1	0	0	0,6	1,2
	60-64 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,3	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0	0,4	0,7	0,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0,5	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,1	0	0,4	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8	11,6	5,2	13	4,9	9,5	5,5
	55-59 ans	8,1	11,5	5,5	5,4	2,7	13,3	6,2
	60-64 ans	12	16,2	8,7	21,1	15,5	15,1	7,4
	65-69 ans	13,1	17,8	9,2	24,8	4,5	16,6	9,9
	70-74 ans	13,6	21,3	7,4	36,9	3,5	19,1	7,9
	50-74 ans	10,6	15,2	7,1	15,6	6	15	7,4
	50-74 ans **	10,7	14,8	7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	6,5	2,3	7,7	2,4	4,8	2,3
	55-59 ans	3,9	6,6	1,8	3,8	0,7	7,4	2,1
	60-64 ans	7,4	10,6	4,9	14,7	5,7	9,7	4,7
	65-69 ans	7,5	10,1	5,4	15,5	3	9,1	5,7
	70-74 ans	7,7	11,2	4,9	16,4	3,5	10,4	5,1
	50-74 ans	5,9	8,8	3,7	9,4	2,7	8,5	4
	50-74 ans **	6	8,6	3,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,4	0,4	1,5	0,5	1,3	0,3
	55-59 ans	2,1	2,9	1,6	0,8	2,7	3,5	1,3
	60-64 ans	1,7	2,1	1,5	2,7	2,4	1,9	1,3
	65-69 ans	3,2	4,2	2,3	3,1	3	4,4	2,2
	70-74 ans	3,6	6,4	1,4	8,2	3,5	6,1	1,2
	50-74 ans	2,1	3,1	1,4	2,2	1,6	3,5	1,3
	50-74 ans **	2,1	3	1,4
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des