

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	36713	17127	19586	10963	12538	6164	7048
	55-59 ans	33380	15589	17791	3234	3849	12355	13942
	60-64 ans	34227	15923	18304	2844	3186	13079	15118
	65-69 ans	26032	12329	13703	1843	2109	10486	11594
	70-74 ans	20034	9260	10774	1286	1533	7974	9241
	50-74 ans	150386	70228	80158	20170	23215	50058	56943
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	652	336	316	336	316	0	0
	55-59 ans	573	273	300	273	300	0	0
	60-64 ans	542	274	268	274	268	0	0
	65-69 ans	429	200	229	200	229	0	0
	70-74 ans	386	179	207	179	207	0	0
	50-74 ans	2582	1262	1320	1262	1320	0	0
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	652	336	316	336	316	0	0
	55-59 ans	573	273	300	273	300	0	0
	60-64 ans	542	274	268	274	268	0	0
	65-69 ans	429	200	229	200	229	0	0
	70-74 ans	386	179	207	179	207	0	0
	50-74 ans	2582	1262	1320	1262	1320	0	0
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	36010	16759	19251	10595	12203	6164	7048
	55-59 ans	32774	15299	17475	2944	3533	12355	13942
	60-64 ans	33661	15634	18027	2555	2909	13079	15118
	65-69 ans	25589	12118	13471	1632	1877	10486	11594
	70-74 ans	19619	9062	10557	1088	1316	7974	9241
	50-74 ans	147653	68872	78781	18814	21838	50058	56943
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	529	307	222	204	145	103	77
	55-59 ans	539	305	234	70	56	235	178
	60-64 ans	579	319	260	79	43	240	217
	65-69 ans	575	312	263	50	48	262	215
	70-74 ans	490	272	218	46	26	226	192
	50-74 ans	2712	1515	1197	449	318	1066	879
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	529	307	222	204	145	103	77
	55-59 ans	539	305	234	70	56	235	178
	60-64 ans	579	319	260	79	43	240	217
	65-69 ans	575	312	263	50	48	262	215
	70-74 ans	490	272	218	46	26	226	192
	50-74 ans	2712	1515	1197	449	318	1066	879
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	449	263	186	172	116	91	70
	55-59 ans	476	266	210	58	46	208	164
	60-64 ans	514	286	228	69	35	217	193
	65-69 ans	518	282	236	40	41	242	195
	70-74 ans	443	248	195	39	22	209	173
	50-74 ans	2400	1345	1055	378	260	967	795
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	445	260	185	170	115	90	70
	55-59 ans	469	264	205	58	46	206	159
	60-64 ans	505	281	224	68	35	213	189
	65-69 ans	509	279	230	37	40	242	190
	70-74 ans	434	242	192	38	22	204	170

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	2362	1326	1036	371	258	955	778
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	449	263	186	172	116	91	70
	55-59 ans	476	266	210	58	46	208	164
	60-64 ans	513	286	227	69	35	217	192
	65-69 ans	517	282	235	40	41	242	194
	70-74 ans	442	248	194	39	22	209	172
	50-74 ans	2397	1345	1052	378	260	967	792
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	449	263	186	172	116	91	70
	55-59 ans	473	264	209	57	46	207	163
	60-64 ans	513	285	228	69	35	216	193
	65-69 ans	515	279	236	40	41	239	195
	70-74 ans	442	247	195	38	22	209	173
	50-74 ans	2392	1338	1054	376	260	962	794
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	449	263	186	172	116	91	70
	55-59 ans	476	266	210	58	46	208	164
	60-64 ans	514	286	228	69	35	217	193
	65-69 ans	519	283	236	40	41	243	195
	70-74 ans	443	248	195	39	22	209	173
	50-74 ans	2401	1346	1055	378	260	968	795
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	267	145	122	93	76	52	46
	55-59 ans	246	116	130	27	32	89	98
	60-64 ans	253	116	137	27	21	89	116
	65-69 ans	221	94	127	13	22	81	105
	70-74 ans	208	101	107	18	11	83	96
	50-74 ans	1195	572	623	178	162	394	461
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	49	30	19	20	14	10	5	
	55-59 ans	54	33	21	8	1	25	20	
	60-64 ans	51	28	23	5	5	23	18	
	65-69 ans	48	28	20	4	6	24	14	
	70-74 ans	34	20	14	2	3	18	11	
	50-74 ans	236	139	97	39	29	100	68	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	68	44	24	27	13	17	11	
	55-59 ans	74	45	29	6	6	39	23	
	60-64 ans	85	62	23	16	1	46	22	
	65-69 ans	104	66	38	9	7	57	31	
	70-74 ans	85	47	38	4	3	43	35	
	50-74 ans	416	264	152	62	30	202	122	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	48	36	12	28	7	8	5	
	55-59 ans	72	54	18	13	5	41	13	
	60-64 ans	96	60	36	18	6	42	30	
	65-69 ans	100	60	40	8	2	52	38	
	70-74 ans	77	55	22	10	3	45	19	
	50-74 ans	393	265	128	77	23	188	105	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	15	6	9	3	6	3	3	
	55-59 ans	23	12	11	3	2	9	9	
	60-64 ans	24	17	7	2	2	15	5	
	65-69 ans	41	30	11	5	4	25	7	
	70-74 ans	35	23	12	4	2	19	10	
	50-74 ans	138	88	50	17	16	71	34	
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0	
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0	
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2	
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	2	
	50-74 ans	14	10	4	3	0	7	4	
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1	
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0	
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	50-74 ans	9	8	1	2	0	6	1	
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	116	80	36	55	20	25	16	
	55-59 ans	146	99	47	19	11	80	36	
	60-64 ans	181	122	59	34	7	88	52	
	65-69 ans	204	126	78	17	9	109	69	
	70-74 ans	162	102	60	14	6	88	54	
	50-74 ans	809	529	280	139	53	390	227	
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	48	36	12	28	7	8	5	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	72	54	18	13	5	41	13
	60-64 ans	96	60	36	18	6	42	30
	65-69 ans	100	60	40	8	2	52	38
	70-74 ans	77	55	22	10	3	45	19
	50-74 ans	393	265	128	77	23	188	105
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	15	6	9	3	6	3	3
	55-59 ans	23	12	11	3	2	9	9
	60-64 ans	24	17	7	2	2	15	5
	65-69 ans	41	30	11	5	4	25	7
	70-74 ans	35	23	12	4	2	19	10
	50-74 ans	138	88	50	17	16	71	34
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	15	6	9	3	6	3	3
	55-59 ans	23	12	11	3	2	9	9
	60-64 ans	24	17	7	2	2	15	5
	65-69 ans	41	30	11	5	4	25	7
	70-74 ans	35	23	12	4	2	19	10
	50-74 ans	138	88	50	17	16	71	34
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	2	4	1	2	1	2
	55-59 ans	10	8	2	1	1	7	1
	60-64 ans	11	10	1	1	0	9	1
	65-69 ans	12	10	2	2	1	8	1
	70-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
	50-74 ans	51	38	13	7	4	31	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	4	5	2	4	2	1
	55-59 ans	13	4	9	2	1	2	8
	60-64 ans	13	7	6	1	2	6	4
	65-69 ans	29	20	9	3	3	17	6
	70-74 ans	23	15	8	2	2	13	6
	50-74 ans	87	50	37	10	12	40	25
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	4	5	2	4	2	1
	55-59 ans	13	4	9	2	1	2	8
	60-64 ans	13	7	6	1	2	6	4
	65-69 ans	27	20	7	3	3	17	4
	70-74 ans	22	15	7	2	1	13	6
	50-74 ans	84	50	34	10	11	40	23
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	2	5	0	4	2	1
	55-59 ans	6	3	3	2	0	1	3
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	6	5	1	0	1	5	0
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	34	21	13	4	5	17	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	17	9	8	1	1	8	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	9	7	2	1	1	6	1
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	24	13	11	3	5	10	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	6	8	3	6	3	2
	55-59 ans	23	12	11	3	2	9	9
	60-64 ans	23	16	7	2	2	14	5
	65-69 ans	40	29	11	4	4	25	7
	70-74 ans	31	19	12	2	2	17	10
	50-74 ans	131	82	49	14	16	68	33
A40- Perdus de vue	50-54 ans	29	18	11	13	9	5	2
	55-59 ans	14	6	8	3	5	3	3
	60-64 ans	21	13	8	4	3	9	5
	65-69 ans	12	5	7	3	2	2	5
	70-74 ans	11	5	6	2	1	3	5
	50-74 ans	87	47	40	25	20	22	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	1,8	2	1,6	3,1	2,5	0	0	
	55-59 ans	1,7	1,8	1,7	8,4	7,8	0	0	
	60-64 ans	1,6	1,7	1,5	9,6	8,4	0	0	
	65-69 ans	1,6	1,6	1,7	10,9	10,9	0	0	
	70-74 ans	1,9	1,9	1,9	13,9	13,5	0	0	
	50-74 ans	1,7	1,8	1,6	6,3	5,7	0	0	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	2	1,6	3,1	2,5	0	0	
	55-59 ans	1,7	1,8	1,7	8,4	7,8	0	0	
	60-64 ans	1,6	1,7	1,5	9,6	8,4	0	0	
	65-69 ans	1,6	1,6	1,7	10,9	10,9	0	0	
	70-74 ans	1,9	1,9	1,9	13,9	13,5	0	0	
	50-74 ans	1,7	1,8	1,6	6,3	5,7	0	0	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,8	1,2	1,9	1,2	1,7	1,1	
	55-59 ans	1,6	2	1,3	2,4	1,6	1,9	1,3	
	60-64 ans	1,7	2	1,4	3,1	1,5	1,8	1,4	
	65-69 ans	2,2	2,6	2	3,1	2,6	2,5	1,9	
	70-74 ans	2,5	3	2,1	4,2	2	2,8	2,1	
	50-74 ans	1,8	2,2	1,5	2,4	1,5	2,1	1,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,9	85,7	83,8	84,3	80	88,3	90,9	
	55-59 ans	88,3	87,2	89,7	82,9	82,1	88,5	92,1	
	60-64 ans	88,8	89,7	87,7	87,3	81,4	90,4	88,9	
	65-69 ans	90,1	90,4	89,7	80	85,4	92,4	90,7	
	70-74 ans	90,4	91,2	89,4	84,8	84,6	92,5	90,1	
	50-74 ans	88,5	88,8	88,1	84,2	81,8	90,7	90,4	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,1	98,9	99,5	98,8	99,1	98,9	100	
	55-59 ans	98,5	99,2	97,6	100	100	99	97	
	60-64 ans	98,2	98,3	98,2	98,6	100	98,2	97,9	
	65-69 ans	98,3	98,9	97,5	92,5	97,6	100	97,4	
	70-74 ans	98	97,6	98,5	97,4	100	97,6	98,3	
	50-74 ans	98,4	98,6	98,2	98,1	99,2	98,8	97,9	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76	75	78	80	88	65	62	
	55-59 ans	74	78	68	78	58	78	71	
	60-64 ans	72	79	62	88	75	76	60	
	65-69 ans	69	77	59	104	55	72	60	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	70	71	69	97	65	66	69
	50-74 ans	72	76	67	86	74	72	64
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,5	5,9	5	6,4	6,2	4,9	2,6
	55-59 ans	2,6	2	3,4	4,3	8,9	1,3	1,7
	60-64 ans	3,6	4,1	3,1	5,1	7	3,8	2,3
	65-69 ans	2,1	1,6	2,7	6	4,2	0,8	2,3
	70-74 ans	2,2	1,8	2,8	4,3	3,8	1,3	2,6
	50-74 ans	3,2	3,1	3,3	5,6	6,3	2,1	2,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,4	99,2	99,5	98,3	100	99,5	99,4
	60-64 ans	99,8	99,7	100	100	100	99,5	100
	65-69 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,8	100
	70-74 ans	99,8	99,6	100	97,4	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,5	99,9	99,5	100	99,5	99,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,5	55,1	65,6	54,1	65,5	57,1	65,7
	55-59 ans	51,7	43,6	61,9	46,6	69,6	42,8	59,8
	60-64 ans	49,2	40,6	60,1	39,1	60	41	60,1
	65-69 ans	42,6	33,2	53,8	32,5	53,7	33,3	53,8
	70-74 ans	47	40,7	54,9	46,2	50	39,7	55,5
	50-74 ans	49,8	42,5	59,1	47,1	62,3	40,7	58
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	10,9	11,4	10,2	11,6	12,1	11	7,1
	55-59 ans	11,3	12,4	10	13,8	2,2	12	12,2
	60-64 ans	9,9	9,8	10,1	7,2	14,3	10,6	9,3
	65-69 ans	9,2	9,9	8,5	10	14,6	9,9	7,2
	70-74 ans	7,7	8,1	7,2	5,1	13,6	8,6	6,4
	50-74 ans	9,8	10,3	9,2	10,3	11,2	10,3	8,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,1	16,7	12,9	15,7	11,2	18,7	15,7
	55-59 ans	15,5	16,9	13,8	10,3	13	18,8	14
	60-64 ans	16,5	21,7	10,1	23,2	2,9	21,2	11,4
	65-69 ans	20	23,3	16,1	22,5	17,1	23,5	15,9
	70-74 ans	19,2	19	19,5	10,3	13,6	20,6	20,2
	50-74 ans	17,3	19,6	14,4	16,4	11,5	20,9	15,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,7	13,7	6,5	16,3	6	8,8	7,1
	55-59 ans	15,1	20,3	8,6	22,4	10,9	19,7	7,9
	60-64 ans	18,7	21	15,8	26,1	17,1	19,4	15,5
	65-69 ans	19,3	21,2	16,9	20	4,9	21,4	19,5
	70-74 ans	17,4	22,2	11,3	25,6	13,6	21,5	11
	50-74 ans	16,4	19,7	12,1	20,4	8,8	19,4	13,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	2,3	4,8	1,7	5,2	3,3	4,3
	55-59 ans	4,8	4,5	5,2	5,2	4,3	4,3	5,5
	60-64 ans	4,7	5,9	3,1	2,9	5,7	6,9	2,6
	65-69 ans	7,9	10,6	4,7	12,5	9,8	10,3	3,6
	70-74 ans	7,9	9,3	6,2	10,3	9,1	9,1	5,8
	50-74 ans	5,7	6,5	4,7	4,5	6,2	7,3	4,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,8	0	0,6	0	1,1	0
	55-59 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,9	0
	60-64 ans	0,8	0,7	0,9	1,4	0	0,5	1
	65-69 ans	0,2	0,4	0	2,5	0	0	0
	70-74 ans	0,7	0,4	1	0	0	0,5	1,2
	50-74 ans	0,6	0,7	0,4	0,8	0	0,7	0,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0,8	0,5	1,7	0	0,5	0,6
	60-64 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,5	0
	65-69 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,6	0
	70-74 ans	0,2	0,4	0	2,6	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,6	0,1	0,5	0	0,6	0,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,8	1,9	5,2	1,6	4,1	2,3
	55-59 ans	4,5	6,5	2,7	6,5	3,1	6,5	2,6
	60-64 ans	5,4	7,8	3,3	13,3	2,4	6,7	3,4
	65-69 ans	8	10,4	5,8	10,4	4,8	10,4	6
	70-74 ans	8,3	11,3	5,7	12,9	4,6	11	5,8
	50-74 ans	5,5	7,7	3,6	7,4	2,4	7,8	4
	50-74 ans **	5,5	7,6	3,5
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2,1	0,6	2,6	0,6	1,3	0,7
	55-59 ans	2,2	3,5	1	4,4	1,4	3,3	0,9
	60-64 ans	2,9	3,8	2	7	2,1	3,2	2
	65-69 ans	3,9	5	3	4,9	1,1	5	3,3
	70-74 ans	3,9	6,1	2,1	9,2	2,3	5,6	2,1
	50-74 ans	2,7	3,8	1,6	4,1	1,1	3,8	1,8
	50-74 ans **	2,6	3,8	1,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	1	0,6	0,7	0,6
	60-64 ans	0,7	1,1	0,4	0,8	0,7	1,1	0,3
	65-69 ans	1,6	2,5	0,8	3,1	2,1	2,4	0,6
	70-74 ans	1,8	2,5	1,1	3,7	1,5	2,4	1,1
	50-74 ans	0,9	1,3	0,6	0,9	0,7	1,4	0,6
	50-74 ans **	0,9	1,2	0,6
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	40	33,3	44,4	33,3	33,3	33,3	66,7
	55-59 ans	43,5	66,7	18,2	33,3	50	77,8	11,1
	60-64 ans	45,8	58,8	14,3	50	0	60	20
	65-69 ans	29,3	33,3	18,2	40	25	32	14,3
	70-74 ans	34,3	34,8	33,3	50	0	31,6	40
	50-74 ans	37	43,2	26	41,2	25	43,7	26,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des