

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4055	1817	2238	1708	2086	109	152
	55-59 ans	2799	1262	1537	1081	1323	181	214
	60-64 ans	4097	1854	2243	1558	1807	296	436
	65-69 ans	1948	859	1089	722	866	137	223
	70-74 ans	2843	1252	1591	1024	1264	228	327
	50-74 ans	15742	7044	8698	6093	7346	951	1352
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	202	102	100	98	91	4	9
	55-59 ans	155	74	81	61	67	13	14
	60-64 ans	194	110	84	95	73	15	11
	65-69 ans	124	50	74	45	62	5	12
	70-74 ans	221	81	140	72	111	9	29
	50-74 ans	896	417	479	371	404	46	75
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	128	65	63	63	56	2	7
	55-59 ans	119	60	59	50	50	10	9
	60-64 ans	152	84	68	70	58	14	10
	65-69 ans	88	40	48	37	43	3	5
	70-74 ans	159	58	101	51	86	7	15
	50-74 ans	646	307	339	271	293	36	46
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	74	37	37	35	35	2	2
	55-59 ans	36	14	22	11	17	3	5
	60-64 ans	42	26	16	25	15	1	1
	65-69 ans	36	10	26	8	19	2	7
	70-74 ans	62	23	39	21	25	2	14
	50-74 ans	250	110	140	100	111	10	29
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3981	1780	2201	1673	2051	107	150
	55-59 ans	2763	1248	1515	1070	1306	178	209
	60-64 ans	4055	1828	2227	1533	1792	295	435
	65-69 ans	1912	849	1063	714	847	135	216
	70-74 ans	2781	1229	1552	1003	1239	226	313
	50-74 ans	15492	6934	8558	5993	7235	941	1323
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	114	59	55	57	51	2	4
	55-59 ans	86	46	40	42	34	4	6
	60-64 ans	128	61	67	51	58	10	9
	65-69 ans	60	23	37	21	31	2	6
	70-74 ans	129	61	68	56	58	5	10
	50-74 ans	517	250	267	227	232	23	35
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	114	59	55	57	51	2	4
	55-59 ans	86	46	40	42	34	4	6
	60-64 ans	128	61	67	51	58	10	9
	65-69 ans	60	23	37	21	31	2	6
	70-74 ans	128	61	67	56	58	5	9
	50-74 ans	516	250	266	227	232	23	34
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	102	51	51	49	48	2	3
	55-59 ans	78	40	38	37	32	3	6
	60-64 ans	119	56	63	47	54	9	9
	65-69 ans	57	20	37	18	31	2	6
	70-74 ans	120	57	63	52	54	5	9
	50-74 ans	476	224	252	203	219	21	33
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	102	51	51	49	48	2	3
	55-59 ans	76	40	36	37	30	3	6
	60-64 ans	118	56	62	47	53	9	9
	65-69 ans	57	20	37	18	31	2	6
	70-74 ans	119	57	62	52	53	5	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	472	224	248	203	215	21	33
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	102	51	51	49	48	2	3
	55-59 ans	78	40	38	37	32	3	6
	60-64 ans	119	56	63	47	54	9	9
	65-69 ans	57	20	37	18	31	2	6
	70-74 ans	119	57	62	52	53	5	9
	50-74 ans	475	224	251	203	218	21	33
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	102	51	51	49	48	2	3
	55-59 ans	78	40	38	37	32	3	6
	60-64 ans	119	56	63	47	54	9	9
	65-69 ans	57	20	37	18	31	2	6
	70-74 ans	119	57	62	52	53	5	9
	50-74 ans	475	224	251	203	218	21	33
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	102	51	51	49	48	2	3
	55-59 ans	78	40	38	37	32	3	6
	60-64 ans	119	56	63	47	54	9	9
	65-69 ans	58	21	37	19	31	2	6
	70-74 ans	121	57	64	52	54	5	10
	50-74 ans	478	225	253	204	219	21	34
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	22	37	20	36	2	1
	55-59 ans	49	20	29	20	24	0	5
	60-64 ans	57	24	33	19	29	5	4
	65-69 ans	24	6	18	5	15	1	3
	70-74 ans	62	23	39	21	33	2	6
	50-74 ans	251	95	156	85	137	10	19
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	15	11	4	10	3	1	1
	60-64 ans	19	4	15	3	12	1	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	14	8	6	8	6	0	0
	70-74 ans	24	12	12	12	10	0	2
	50-74 ans	82	42	40	40	34	2	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	13	8	5	8	5	0	0
	65-69 ans	9	2	7	2	6	0	1
	70-74 ans	8	7	1	6	0	1	1
	50-74 ans	42	25	17	24	15	1	2
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	11	5	11	4	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	23	17	6	14	6	3	0
	65-69 ans	7	4	3	3	2	1	1
	70-74 ans	18	12	6	10	5	2	1
	50-74 ans	68	46	22	39	19	7	3
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	1	0	2
	65-69 ans	4	1	3	1	2	0	1
	70-74 ans	8	3	5	3	5	0	0
	50-74 ans	24	11	13	11	10	0	3
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	22	16	6	16	5	0	1
	55-59 ans	10	5	5	4	5	1	0
	60-64 ans	36	25	11	22	11	3	0
	65-69 ans	16	6	10	5	8	1	2
	70-74 ans	26	19	7	16	5	3	2
	50-74 ans	110	71	39	63	34	8	5
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	16	11	5	11	4	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	23	17	6	14	6	3	0
	65-69 ans	7	4	3	3	2	1	1
	70-74 ans	18	12	6	10	5	2	1
	50-74 ans	68	46	22	39	19	7	3
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	1	0	2
	65-69 ans	4	1	3	1	2	0	1
	70-74 ans	8	3	5	3	5	0	0
	50-74 ans	25	11	14	11	11	0	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	1	0	2
	65-69 ans	3	0	3	0	2	0	1
	70-74 ans	8	3	5	3	5	0	0
	50-74 ans	23	10	13	10	10	0	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	2	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	1	0	2
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	6	3	3	3	3	0	0
	50-74 ans	20	10	10	10	8	0	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	10	3	7	3	5	0	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	10	7	3	7	3	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	8	3	5	3	5	0	0	0
	50-74 ans	22	10	12	10	10	0	2	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0	0
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	70-74 ans	6	3	3	3	3	0	0	0
	50-74 ans	26	16	10	16	10	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5	5,6	4,5	5,7	4,4	3,7	5,9	
	55-59 ans	5,5	5,9	5,3	5,6	5,1	7,2	6,5	
	60-64 ans	4,7	5,9	3,7	6,1	4	5,1	2,5	
	65-69 ans	6,4	5,8	6,8	6,2	7,2	3,6	5,4	
	70-74 ans	7,8	6,5	8,8	7	8,8	3,9	8,9	
	50-74 ans	5,7	5,9	5,5	6,1	5,5	4,8	5,5	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	2	1,7	2	1,7	1,8	1,3	
	55-59 ans	1,3	1,1	1,4	1	1,3	1,7	2,3	
	60-64 ans	1	1,4	0,7	1,6	0,8	0,3	0,2	
	65-69 ans	1,8	1,2	2,4	1,1	2,2	1,5	3,1	
	70-74 ans	2,2	1,8	2,5	2,1	2	0,9	4,3	
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,1	2,1	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,4	63,7	63	64,3	61,5	50	77,8	
	55-59 ans	76,8	81,1	72,8	82	74,6	76,9	64,3	
	60-64 ans	78,4	76,4	81	73,7	79,5	93,3	90,9	
	65-69 ans	71	80	64,9	82,2	69,4	60	41,7	
	70-74 ans	71,9	71,6	72,1	70,8	77,5	77,8	51,7	
	50-74 ans	72,1	73,6	70,8	73	72,5	78,3	61,3	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,3	2,5	3,4	2,5	1,9	2,7	
	55-59 ans	3,1	3,7	2,6	3,9	2,6	2,2	2,9	
	60-64 ans	3,2	3,3	3	3,3	3,2	3,4	2,1	
	65-69 ans	3,1	2,7	3,5	2,9	3,7	1,5	2,8	
	70-74 ans	4,6	5	4,4	5,6	4,7	2,2	3,2	
	50-74 ans	3,3	3,6	3,1	3,8	3,2	2,4	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	99,2	100	98,5	100	100	100	90	
	50-74 ans	99,8	100	99,6	100	100	100	97,1	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,5	86,4	92,7	86	94,1	100	75	
	55-59 ans	90,7	87	95	88,1	94,1	75	100	
	60-64 ans	93	91,8	94	92,2	93,1	90	100	
	65-69 ans	95	87	100	85,7	100	100	100	
	70-74 ans	93,8	93,4	94	92,9	93,1	100	100	
	50-74 ans	92,2	89,6	94,7	89,4	94,4	91,3	97,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	97,4	100	94,7	100	93,8	100	100	
	60-64 ans	99,2	100	98,4	100	98,1	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	99,2	100	98,4	100	98,1	100	100	
	50-74 ans	99,2	100	98,4	100	98,2	100	100	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	55-59 ans	2	2	2	2	2	3	2	
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	65-69 ans	2	2	2	2	2	3	3	
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2	
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	71	84	72	84	39	82	
	55-59 ans	72	68	77	66	81	84	55	
	60-64 ans	76	68	84	70	91	57	43	
	65-69 ans	89	87	90	87	96	87	55	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	81	91	72	85	67	155	101
	50-74 ans	79	76	81	75	83	85	67
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,4	5,1	3,6	5,3	3,9	0	0
	55-59 ans	7	8,7	5	9,5	5,9	0	0
	60-64 ans	5,5	6,6	4,5	7,8	5,2	0	0
	65-69 ans	3,3	8,7	0	9,5	0	0	0
	70-74 ans	4,7	4,9	4,4	5,4	5,2	0	0
	50-74 ans	5	6,4	3,7	7	4,3	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	100	98,4	100	98,1	100	100
	50-74 ans	99,8	100	99,6	100	99,5	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,8	43,1	72,5	40,8	75	100	33,3
	55-59 ans	62,8	50	76,3	54,1	75	0	83,3
	60-64 ans	47,9	42,9	52,4	40,4	53,7	55,6	44,4
	65-69 ans	41,4	28,6	48,6	26,3	48,4	50	50
	70-74 ans	51,2	40,4	60,9	40,4	61,1	40	60
	50-74 ans	52,5	42,2	61,7	41,7	62,6	47,6	55,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,8	13,7	5,9	14,3	6,3	0	0
	55-59 ans	19,2	27,5	10,5	27	9,4	33,3	16,7
	60-64 ans	16	7,1	23,8	6,4	22,2	11,1	33,3
	65-69 ans	24,1	38,1	16,2	42,1	19,4	0	0
	70-74 ans	19,8	21,1	18,8	23,1	18,5	0	20
	50-74 ans	17,2	18,7	15,8	19,6	15,5	9,5	17,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2	2	2	2	2,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	1,8	1,6	2,1	1,9	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	0	1,6	0	1,9	0	0
	50-74 ans	1	0,9	1,2	1	1,4	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,9	9,8	2	10,2	2,1	0	0
	55-59 ans	7,7	7,5	7,9	8,1	9,4	0	0
	60-64 ans	10,9	14,3	7,9	17	9,3	0	0
	65-69 ans	15,5	9,5	18,9	10,5	19,4	0	16,7
	70-74 ans	6,6	12,3	1,6	11,5	0	20	10
	50-74 ans	8,8	11,1	6,7	11,8	6,8	4,8	5,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,7	21,6	9,8	22,4	8,3	0	33,3
	55-59 ans	5,1	5	5,3	2,7	6,3	33,3	0
	60-64 ans	19,3	30,4	9,5	29,8	11,1	33,3	0
	65-69 ans	12,1	19	8,1	15,8	6,5	50	16,7
	70-74 ans	14,9	21,1	9,4	19,2	9,3	40	10
	50-74 ans	14,2	20,4	8,7	19,1	8,7	33,3	8,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,9	5,9	3,9	6,1	4,2	0	0
	55-59 ans	2,6	5	0	5,4	0	0	0
	60-64 ans	4,2	3,6	4,8	4,3	1,9	0	22,2
	65-69 ans	6,9	4,8	8,1	5,3	6,5	0	16,7
	70-74 ans	6,6	5,3	7,8	5,8	9,3	0	0
	50-74 ans	5	4,9	5,1	5,4	4,6	0	8,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2	3,9	0	4,1	0	0	0
	55-59 ans	1,3	2,5	0	2,7	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1,3	0	1,5	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	3,9	0	2,1	0	33,3
	55-59 ans	1,3	2,5	0	0	0	33,3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,4	0,8	0	0,5	4,8	2,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	9	2,7	9,6	2,4	0	6,7
	55-59 ans	3,6	4	3,3	3,7	3,8	5,6	0
	60-64 ans	8,9	13,7	4,9	14,4	6,1	10,2	0
	65-69 ans	8,4	7,1	9,4	7	9,4	7,4	9,3
	70-74 ans	9,3	15,5	4,5	16	4	13,3	6,4
	50-74 ans	7,1	10,2	4,6	10,5	4,7	8,5	3,8
	50-74 ans **	6,9	9,3	4,6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	6,2	2,3	6,6	2	0	6,7
	55-59 ans	1,4	1,6	1,3	0,9	1,5	5,6	0
	60-64 ans	5,7	9,3	2,7	9,1	3,3	10,2	0
	65-69 ans	3,7	4,7	2,8	4,2	2,4	7,4	4,6
	70-74 ans	6,5	9,8	3,9	10	4	8,8	3,2
	50-74 ans	4,4	6,6	2,6	6,5	2,6	7,4	2,3
	50-74 ans **	4,1	6	2,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,7	1,4	1,8	1,5	0	0
	55-59 ans	0,7	1,6	0	1,9	0	0	0
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	1,3	0,6	0	4,6
	65-69 ans	2,1	1,2	2,8	1,4	2,4	0	4,6
	70-74 ans	2,9	2,4	3,2	3	4	0	0
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	1,8	1,5	0	2,3
	50-74 ans **	1,5	1,6	1,5
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	33,3	0	33,3	0	0	0	100
	70-74 ans	25	0	40	0	40	0	0
	50-74 ans	13	0	23,1	0	20	0	33,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des